

Što trebam znati o lijeku Xarelto?

- ◆ Xarelto razrjeđuje krv i tako štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- ◆ Xarelto morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka.**
- ◆ Ne smijete prestati davati/uzimati Xarelto bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

- ◆ Obavijestite liječnika ako dijete/ Vi trenutno uzima/uzimate bilo koje druge lijekove, ili ih je nedavno uzimalo/ste ih nedavno uzimali ili ih namjerava/namjeravate početi uzimati, prije početka primjene lijeka Xarelto.
- ◆ Obavijestite liječnika da dijete/ Vi uzimate lijek Xarelto prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

Kada trebam potražiti savjet liječnika?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Xarelto, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje

je najčešća nuspojava. Ne započinite davati Xarelto djetetu/uzimati Xarelto bez prethodnog dogovora s liječnikom ako znate da je dijete/ste Vi izloženi riziku od krvarenja. Odmah obavijestite liječnika ako dijete ima/ Vi imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- ◆ bol
- ◆ oticanje ili nelagodu
- ◆ glavobolju, omaglicu ili slabost
- ◆ neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu krvariti
- ◆ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno

- ◆ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvenu ili crnu stolicu
- ◆ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

Kako da dam Xarelto djetetu?/ Kako da uzmem Xarelto?

- ◆ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Xarelto 1 mg/ml mora se davati/uzeti s majčinim mlijekom ili mliječnom formulom ili s obrokom.

Može se primijeniti kroz nazogastričnu sondu ili želučanu sondu za hranjenje.

89605091 HR

Kartica s upozorenjima za bolesnika



Xarelto® 1 mg/ml
granule za oralnu suspenziju

Informacije za skrbnike/bolesnike:

- ◆ Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku.
- ◆ Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja bolesnika.

Pogledajte edukacijski videozapis koji prikazuje kako pripremiti i primijeniti oralnu suspenziju.



go.bayer.com/junior

Bolesnik koji je na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Xarelto (rivaroksaban)

Ime i prezime:

Drugi lijekovi / stanja:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Faksimil liječnika:

Molim također obavijestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

Obavijest za liječnike:

- ◆ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Xarelto.



Bayer

MA-XAR-HR-0089-1; 14 Dec 2023