

Rivaroksaban Teva 20 mg
 Rivaroksaban Teva 15 mg
 Rivaroksaban Teva 10 mg



Rivaroksaban Teva 10 mg
 Rivaroksaban Teva 15 mg
 Rivaroksaban Teva 20 mg

32094793-01

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Rivaroksaban Teva 10 mg
Rivaroksaban Teva 15 mg
Rivaroksaban Teva 20 mg

- ♦ **Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku**
- ♦ **Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja**

Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Rivaroksaban Teva (rivaroksaban)

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

Drugi lijekovi/stanja:

U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Faksimil liječnika:

Molim također obavijestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

Obavijest za liječnike:

- ♦ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Rivaroksaban Teva.

Što trebam znati o lijeku Rivaroksaban Teva?

- ♦ Rivaroksaban Teva razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.

- ♦ Rivaroksaban Teva morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka.**
- ♦ Ne smijete prestati uzimati Rivaroksaban Teva bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- ♦ Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Rivaroksaban Teva.
- ♦ Obavijestite liječnika da uzimate lijek Rivaroksaban Teva prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

Kada trebam potražiti savjet liječnika?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Rivaroksaban Teva važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinite uzimati Rivaroksaban Teva bez prethodnog dogovora s liječnikom ako znate da ste izloženi povećanom riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- ♦ bol
- ♦ oticanje ili nelagodu
- ♦ glavobolju, omaglicu ili slabost
- ♦ neobično stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu krvariti
- ♦ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- ♦ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvena ili crna stolica
- ♦ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

Kako uzimati Rivaroksaban Teva?

- ♦ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Rivaroksaban Teva
 - 10 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
 - 15 mg se mora uzimati s hranom
 - 20 mg se mora uzimati s hranom

teva

120335_s4