


Praćenje funkcije jetre tijekom liječenja s Valdoxan-om

<input type="checkbox"/> Valdoxan 25 mg		<input type="checkbox"/> U slučaju povećanje doze na 50mg , ponovno Započnite s praćenjem.	
<input type="checkbox"/> Prije početka liječenja s 25mg	ALTU/L	<input type="checkbox"/> Povećanje doze	ALTU/L
	ASTU/L		ASTU/L
<input type="checkbox"/> 3. tjedan	ALTU/L	<input type="checkbox"/> 3. tjedan	ALTU/L
	ASTU/L		ASTU/L
<input type="checkbox"/> 6. tjedan	ALTU/L	<input type="checkbox"/> 6. tjedan	ALTU/L
	ASTU/L		ASTU/L
<input type="checkbox"/> 12. tjedan	ALTU/L	<input type="checkbox"/> 12. tjedan	ALTU/L
	ASTU/L		ASTU/L
<input type="checkbox"/> 24. tjedan	ALTU/L	<input type="checkbox"/> 24. tjedan	ALTU/L
	ASTU/L		ASTU/L
Molimo, provedite ispitivanje bilo kada ukoliko je klinički opravdano.		Molimo, provedite ispitivanje bilo kada ukoliko je klinički opravdano.	

Ime pacijenta: _____

Datum početka liječenja: _____



Odmah prekinuti liječenje

- Testovi praćenje jetrene funkcije (uključujući transaminaze) moraju se provesti

Odmah prekinuti liječenje

- Ponovite testove funkcije jetre redovito sve dok se vrijednosti transaminaza vrate na normalu

Nastavite s liječenjem

- Nastavite s praćenjem funkcije jetre u skladu s preporukama

* Kao npr. tamna mokraća, svjetlo obojena stolica, žuta koža / oči, bol u desnom gornjem dijelu trbuha, stalna novo-nastala i neobjašnjiva pojava umora