

VODIČ ZA BOLESNIKE I/ILI NJEGOVATELJE (SULIQUA®, INZULIN GLARGIN/LIKSISENATID)

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Suliqa® u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) pod poveznicom Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

OVAJ EDUKACIJSKI MATERIJAL NAMIJENJEN JE DA SLUŽI SAMO KAO VODIČ. PRIJE KORIŠTENJA LIJEKA SULIQUA®, VAŠ ZDRAVSTVENI RADNIK MORA VAS OBUČITI KAKO PRIMIJENITI SULIQUA® SOLOSTAR BRIZGALICU I MORATE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTU O LIJEKU I UPUTE ZA UPORABU PRILOŽENE UZ BRIZGALICU.

Sačuvajte ovaj vodič. Možda ćete ga trebati ponovno proučiti. Napišite svoje ime na vodič: _____

SULIQUA® napunjene brizgalice istovremeno isporučuju inzulin glargin i liksisenatid u jednoj injekciji koja se primjenjuje jednom dnevno.

SULIQUA® je dostupna u 2 napunjene brizgalice koje sadrže 2 različite jačine liksisenatida i različiti raspon doza inzulina glargina 100 jedinica/ml. Vaš zdravstveni radnik propisao Vam je brizgalicu koja odgovara Vašim potrebama za inzulinom.

SULIQUA® 10-40 BRIZGALICA

SULIQUA® 100 JEDINICA/ml + 50 MIKROGRAMA/ml
OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ BRIZGALICI



SULIQUA® 30-60 BRIZGALICA

SULIQUA® 100 JEDINICA/ml + 33 MIKROGRAMA/ml
OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ BRIZGALICI



- Obje napunjene brizgalice sadrže inzulin glargin jačine 100 jedinica/ml.
- SULIQUA® (10-40) brizgalica omogućuje injiciranje dnevne doze od 10 do 40 odmjernih koraka (jačina: inzulin glargin 100 jedinica/mL i liksisenatid 50 µg/mL; raspon doza: 10 do 40 jedinica inzulina glargina u kombinaciji s 5 do 20 µg liksisenatida). Ova brizgalica je boje breskve s narančastim dugmetom za injiciranje.

VODIČ ZA BOLESNIKE I/ILI NJEGOVATELJE

- SULIQUA® (30-60) brizgalica omogućuje injiciranje dnevne doze od 30 do 60 odmjernih koraka (jačina: inzulin glargin 100 jedinica/mL i liksisenatid 33 µg/mL; raspon doza: 30 do 60 jedinica inzulina glargina u kombinaciji s 10 do 20 µg liksisenatida). Ova brizgalica je maslinaste boje sa smeđim dugmetom za injiciranje.
- Jedan odmjerni korak sadrži jednu jedinicu inzulina glargina 100 jedinica/ml i odgovarajuću količinu liksisenatida. Prije primjene lijeka SULIQUA®, budite sigurni u to koliko odmjernih koraka Vam je potrebno. Liječnik će Vam dati taj podatak.
- Pokazivač doze na napunjenoj brizgalici pokazuje broj odmjernih koraka koji se trebaju injicirati.
- Na receptu treba biti navedena vrsta napunjene brizgalice koja Vam je potrebna (SULIQUA® [10-40] brizgalica ili SULIQUA® [30-60] brizgalica) i broj odmjernih koraka koji se injiciraju.
- Ljekarnik treba razjasniti s Vašim liječnikom svaki nepotpuni recept.

OBRATITE POZORNOST NA SLJEDEĆE:

- **Lijek Suliqua™ je dostupan u obliku napunjene brizgalice i smije se koristiti samo s tom brizgalicom. Bolesnici, njegovatelji i zdravstveni radnici ne smiju nikada koristiti štrcaljku za izvlačenje inzulina glargina/liksisenatida iz napunjene brizgalice jer to može dovesti do pogreške u doziranju i uzrokovati ozbiljnu opasnost za bolesnike. Prije svake uporabe mora se pričvrstiti nova igla. Igle se ne smiju ponovno upotrebljavati.**
- Jedan odmjerni korak lijeka SULIQUA® uvijek sadrži jednu jedinicu inzulin glargina 100 jedinica/mL, neovisno koja SULIQUA® napunjena brizgalica se koristi (SULIQUA® [10-40] brizgalica ili SULIQUA® [30-60] brizgalica).
- Vaš liječnik će Vam objasniti dizajn i značajke SULIQUA® SoloStar® brizgalice, uključujući i način kako brojač doza na brizgalici pokazuje broj odmjernih koraka koji se trebaju injicirati.
- Tijekom prijelaza na ovu kombinaciju lijekova i u tjednima nakon prijelaza trebate češće mjeriti svoju razinu šećera u krvi.
- Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi liječenja, obratite se svom liječniku.

PRIJE INJICIRANJA LIJEKA SULIQUA®



Pažljivo pročitajte upute za uporabu i uputu o lijeku koje su priložene uz brizgalicu.



Ako ne slijedite sve navedene upute, može se dogoditi da primijenite previše ili premalo lijeka.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestruru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.