

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Gribero kapsule

dabigatraneteksilat

- Vi/njegovatelj morate u svakom trenutku imati ovu karticu sa sobom
- Budite sigurni da koristite najnoviju verziju

Poštovani bolesniče/njegovatelju pedijatrijskog bolesnika,

Vaš liječnik/liječnik Vašeg djeteta počeo je liječenje lijekom Gribero. U cilju sigurne primjene lijeka Gribero, molimo uzmite u obzir važne informacije koje se nalaze u uputi o lijeku. S obzirom da ova Kartica s upozorenjima za bolesnika sadrži važne informacije o Vašem liječenju/liječenju Vašeg djeteta, ona mora uvijek biti s Vama/Vašim djetetom kako biste Vi/Vaše dijete mogli informirati zdravstvene radnike da uzimate lijek Gribero.

Gribero Informacije za bolesnike/njegovatelje pedijatrijskih bolesnika

O Vašem liječenju/liječenju Vašeg djeteta

- Gribero razrjeđuje krv. Koristi se za liječenje postojećih krvnih ugrušaka ili za sprječavanje stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Slijedite upute svog liječnika/liječnika svog djeteta tijekom primjene lijeka Gribero. Nikada ne propuštajte uzeti dozu ili ne prekidajte uzimanje lijeka Gribero bez savjetovanja sa svojim liječnikom/liječnikom svog djeteta.
- Obavijestite svog liječnika/liječnika svog djeteta o svim lijekovima koje Vi/Vaše dijete trenutno uzimate.
- Obavijestite svog liječnika/liječnika svog djeteta o uzimanju lijeka Gribero prije svakog kirurškog/invazivnog zahvata.
- Gribero kapsule se mogu uzimati sa hranom ili bez nje. Kapsulu je potrebno progutati cijelu s čašom vode. Kapsule se ne smiju lomiti ili žvakati, a sadržaj kapsule se ne smiju prazniti iz kapsule.

Kada potražiti liječnički savjet

- Uzimanje lijeka Gribero može povećati rizik od krvarenja. Odmah se obratite svom liječniku/liječniku svog djeteta ako se u Vas/Vašeg djeteta javi znakovi i simptomi krvarenja poput: oticanja, nelagode, neobične боли ili glavobolje, omaglice, bljedila, slabosti, neobičnih modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja desni, neobično dugotrajnog krvarenja iz posjekotina, abnormalnog menstruacijskog ili vaginalnog krvarenja, krvi u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvene/crne stolice, iskašljavanja krvi, povraćanja krvi ili sadržaja nalik talogu kave.
- U slučaju pada ili ozljede, osobito udarca u glavu, hitno potražite liječnički savjet.
- Ne prekidajte uzimanje lijeka Gribero bez savjetovanja sa svojim liječnikom/liječnikom svog djeteta ako Vi/Vaše dijete osjetite žgaravicu, mučninu, povraćate, imate nelagodu u trbuhi, nadutost ili bol u gornjem dijelu trbuha.

Gribero Informacije za zdravstvene radnike

- Gribero je oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina).

- Primjena lijeka Gribero možda se mora prekinuti prije kirurškog ili drugog invazivnog postupka.
- U slučaju velikih krvarenja, primjena lijeka Gribero se mora odmah prekinuti.
- Specifičan antagonist (idarucizumab) dostupan je za odrasle bolesnike. Nije ustanovljena djelotvornost i sigurnost specifičnog antagonista idarucizumaba u pedijatrijskih bolesnika. Za detalje i više savjeta antagoniziranju antikoagulacijskog učinka lijeka Gribero pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka za Gribero i idarucizumab.
- Gribero se uglavnom eliminira putem bubrega; odgovarajuća diureza se mora održavati. Gribero se može dijalizirati.

Molimo da Vi/Vaše dijete ispunite ovaj dio ili zamolite liječnika da to učini.

Podaci o bolesniku

Ime bolesnika

Datum rođenja

Indikacija za antikoagulaciju

Doza lijeka Gribero