

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

KRKA

Daxanlo tvrde kapsule (dabigatraneteksilat)

- ◆ **Vi / njegovatelj morate u svakom trenutku imati ovu karticu sa sobom**
- ◆ **Budite sigurni da koristite najnoviju verziju**

Poštovani bolesniče / njegovatelju pedijatrijskog bolesnika,

Vaš liječnik / liječnik Vašeg djeteta počeo je liječenje lijekom Daxanlo. U cilju sigurne primjene lijeka Daxanlo, molimo uzmete u obzir važne informacije koje se nalaze u uputi o lijeku.

S obzirom da ova Kartica s upozorenjima za bolesnika sadrži važne informacije o Vašem liječenju / liječenju Vašeg djeteta, ona mora uvijek biti s Vama / Vašim djetetom kako biste Vi / Vaše dijete mogli informirati zdravstvene radnike da primjenjujete lijek Daxanlo.

Daxanlo Informacije za bolesnike / njegovatelje pedijatrijskih bolesnika

O Vašem liječenju / liječenju Vašeg djeteta

- ◆ Daxanlo razrjeđuje krv. Koristi se za liječenje postojećih krvnih ugrušaka ili za sprječavanje stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- ◆ Slijedite upute svog liječnika / liječnika svog djeteta tijekom primjene lijeka Daxanlo. Ne propuštajte uzeti dozu i ne prekidajte uzimanje lijeka Daxanlo bez savjetovanja sa svojim liječnikom / liječnikom svog djeteta.
- ◆ Obavijestite svog liječnika / liječnika svog djeteta o svim lijekovima koje Vi / Vaše dijete trenutno uzimate.
- ◆ Obavijestite svog liječnika / liječnika svog djeteta o uzimanju lijeka Daxanlo prije svakog kirurškog/invazivnog zahvata.
- ◆ Daxanlo kapsule se mogu uzimati sa hranom ili bez nje. Kapsulu je potrebno progutati cijelu s čašom vode. Kapsule se ne smiju lomiti ili žvakati, a peleti se ne smiju prazniti iz kapsule.

Kada potražiti liječnički savjet

- ◆ Uzimanje lijeka Daxanlo može povećati rizik od krvarenja. Odmah se obratite svom liječniku / liječniku svog djeteta ako se u Vas / Vašeg djeteta jave znakovi i simptomi krvarenja poput: oticanja, nelagode, neobične boli ili glavobolje, omaglice, bljedila, slabosti, neobičnih modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja desni, neobično dugotrajnog krvarenja iz posjekotina, abnormalnog menstruacijskog ili vaginalnog krvarenja, krvi u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvene/crne stolice, iskašljavanja krvi, povraćanja krvi ili sadržaja nalik talogu kave.
- ◆ U slučaju pada ili ozljede, osobito udara u glavu, hitno potražite liječnički savjet.
- ◆ Ne prekidajte uzimanje lijeka Daxanlo bez savjetovanja sa svojim liječnikom / liječnikom svog djeteta ako Vi / Vaše dijete osjetite žgaravicu, mučninu, povraćate, imate nelagodu u truhu, nadutost ili bol u gornjem dijelu trbuha.

Daxanlo Informacije za zdravstvene radnike

- ◆ Daxanlo je oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina).
- ◆ Primjena lijeka Daxanlo možda se mora prekinuti prije kirurškog ili drugog invazivnog postupka.
- ◆ U slučaju velikih krvarenja, primjena lijeka Daxanlo se mora odmah prekinuti.
- ◆ Specifičan antagonist (idarucizumab) dostupan je za odrasle bolesnike. Nije ustanovljena djelotvornost i sigurnost specifičnog antagonista idarucizumaba u pedijatrijskih bolesnika. Za detalje i više savjeta o antagoniziranju antikoagulacijskog učinka lijeka Daxanlo pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka za Daxanlo i idarucizumab.
- ◆ Daxanlo se uglavnom eliminira putem bubrega; odgovarajuća diureza se mora održavati. Daxanlo se može dijalizirati.

Molimo da Vi / Vaše dijete ispunite ovaj dio ili zamolite liječnika da to učini.
Podaci o bolesniku

Ime bolesnika

Datum rođenja

Indikacija za antikoagulaciju

Doza lijeka Daxanlo