

OPOZORILNA KARTICA ZA BOLNIKA

Pradaxa obložena zrnca
dabigatraneteksilat



- To kartico mora imeti bolnik ali skrbnik vedno pri sebi.
- Pazite, da boste uporabili najnovejšo različico.

01/2021

Spoštovani skrbnik,

SL

zdravnik je vašemu otroku predpisal zdravljenje z zdravilom Pradaxa. Prosimo, da zaradi varne uporabe zdravila upoštevate pomembne informacije v priloženem navodilu za uporabo. Opozorilna kartica za bolnika vsebuje pomembne podatke o zdravljenju vašega otroka, zato jo morate/jo mora vaš otrok imeti vedno pri sebi, da boste lahko zdravstvene delavce obvestili, da vaš otrok jemlje zdravilo Pradaxa.



1

Informacije o zdravilu za skrbnike

O zdravljenju vašega otroka

- Zdravilo Pradaxa redči kri. Uporablja se za zdravljenje obstoječih krvnih strdkov ali za preprečevanje nastajanja nevarnih krvnih strdkov.
- Zdravilo je treba uporabljati, kot je naročil zdravnik vašega otroka. Vedno dajte predpisani odmerek in nikoli ne izpustite odmerka ali prenehajte dajati zdravila, ne da bi se o tem pogovorili z otrokovim zdravnikom.
- Obvestite otrokovega zdravnika o vseh zdravilih, ki jih trenutno jemljeva vaš otrok.

2

- Obvestite otrokovega zdravnika o jemanju zdravila Pradaxa pred vsakršnim kirurškim/invazivnim posegom.
- Obložena zrnca zdravila je treba dajati z mehko hrano ali jabolčnim sokom v skladu z napotki za uporabo v priloženem navodilu. Ne uporabite mehke hrane, ki vsebuje mlečne izdelke. Obloženih zrnec zdravila ne dajajte z brizgami ali cevkami za hranjenje.

493017

3

Kada potražiti liječnički savjet

- Uzmanje Pradaxe® može povečati rizik od krvarenja. Odmah se обратите liječniku svog djeteta ako se u Vašeg djeteta javi znakovi i simptomi krvarenja poput: oticanja, nelagode, neobične boli ili glavobolje, omaglice, blijedila, slabosti, neobičnih modrica, krvarenja iz nosa, krvarenja desni, neobično dugotrajnog krvarenja iz posjekotina, abnormalnog menstruacijskog ili vaginalnog krvarenja, krvi u mokrači koja može biti ružičasta ili smeda, crvene/crne stolice, iskašljavanja krvi, povraćanja krvi ili sadržaja nalik talogu kave.
- Ako Vaše dijete padne ili se ozlijedi, osobito ako udari glavom, hitno potražite liječnički savjet.

HR

4

- Ne prekidajte davanje Pradaxe® bez savjetovanja s liječnikom svog djeteta ako Vaše dijete osjeti žgaravicu, mučninu, povraća, ima nelagodu u trbuhi, nadutost ili bol u gornjem dijelu trbuha.

Pradaxa® Informacije za zdravstvene radnike

- Pradaxa® je oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina).
- Primjena Pradaxe® možda se mora prekinuti prije kirurškog ili drugog invazivnog postupka.
- U slučaju velikih krvarenja, primjena Pradaxe® se mora odmah prekinuti.

5

- Pradaxa® se uglavnom eliminira putem bubrega; mora se održavati odgovarajuća diureza. Pradaxa® se može dijalizirati. Pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka.

Molimo, ispunite ovaj dio ili zamolite liječnika svog djeteta da to učini.

Podaci o bolesniku

6

Ime bolesnika

Datum rođenja

Indikacija za antikoagulaciju

Doza Pradaxe®

7

File information

	Mandatory in	
	TD	Printfile
Issue date of TD:	Yes	Yes
PPM SKU:	No	Yes
PPM SKU version:	No	Yes
Issue date of artwork:	No	Yes
Print colors:	No	Yes
Mat. No. Pack. Site:	No	Yes
Min. font size:		
Legend case version:		

Technical colours - not for printing

BI-Diecut-Legendcase	Free area	Gluepoints
Additional Requirements of Packaging site		
Template name: 9954-TD-PAC-LX-PX-190x217,5_2lingual-V4		
Dimensions: 190 x 217,5 mm		
Created by pack2edit		

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Pradaxa® obložene granule
dabigatraneteksilat



- Njegovatelj ili bolesnik mora u svakom trenutku imati ovu karticu sa sobom
- Budite sigurni da koristite najnoviju verziju

01/2021

Poštovani njegovatelju,

HR

Liječnik Vašeg djeteta počeo je liječenje Pradaxom®. U cilju sigurne primjene Pradaxe®, molimo uzmite u obzir važne informacije koje se nalaze u uputi o lijeku.
S obzirom da ova Kartica s upozorenjima za bolesnika sadrži važne informacije o liječenju Vašeg djeteta, ova kartica mora uvijek biti s Vama / Vašim djetetom kako biste mogli informirati zdravstvene radnike da Vaše dijete primjenjuje Pradaxu®.



1

Pradaxa® Informacije za njegovatelje

O liječenju Vašeg djeteta

- Pradaxa® razrjeđuje krv. Koristi se za liječenje postojećih krvnih ugrušaka ili za sprječavanje stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Slijedite upute liječnika svog djeteta za primjenu Pradaxe®. Uvijek primjenite propisanu dozu, ne propušljajte dozu i ne prekidaјte primjenu Pradaxe® bez savjetovanja s liječnikom svog djeteta.
- Obavijestite liječnika svog djeteta o svim lijekovima koje Vaše dijete trenutno uzima.
- Prije svakog kirurškog/invazivnog zahvata obavijestite liječnika svog djeteta da Vaše dijete uzima Pradaxu®.

2

- Pradaxa® obložene granule smiju se primjeniti samo s kašastom hranom ili sokom od jabuke sukladno uputama za primjenu u uputi o lijeku. Nemojte koristiti kašastu hranu koja sadrži mliječne proizvode. Nemojte primjenjivati Pradaxa® obložene granule putem štrcaljki ili sondi za hranjenje.

3

Kdaj morate poiskati zdravniško pomoč

SL

- Jemanje zdravila Pradaxa lahko poveča tveganje za pojav krvavitev. Takoj se posvetujte z otrokovim zdravnikom, če se pri otroku pojavijo znaki in simptomi krvavitev, kot so: oteklini, neprijeten občutek, nenavadna bolečina ali glavobol, omotica, bledica, oslabelost, nenavadno pojavljanje modric, krvavitve iz nosu, krvavenje dlesni, neobičajno dolgotrajno krvavenje iz ureznin, nenormalen menstrualni tok ali krvavenje iz vagine, kri in urinu, ki je lahko rožnata ali rjava, rdeče/črno blato, izkašljevanje krvi, bruhanje krvi ali vsebine, videza kavne usedline.
- Če vaš otrok pada ali se poškoduje, zlasti če se udari v glavo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

4

- Zdravila Pradaxa ne prenehajte dajati, ne da bi se o tem pogovorili z otrokovim zdravnikom, če se pri vašem otroku pojavi zgaga, slabost, bruhanje, neprijeten občutek v želodcu, napenjanje ali bolečine v zgornjem delu trebuha.

Informacije o zdravilu za zdravstvene delavce

- Zdravilo Pradaxa je peroralni antikoagulant (neposredni zaviralec trombina).
- Zdravljenje s tem zdravilom bo morda treba ukiniti pred operacijami in drugimi invazivnimi postopki.
- Pri večjih krvavitvah je treba zdravilo Pradaxa nemudoma ukiniti.

5

- Zdravilo Pradaxa se izloča predvsem skozi ledvice; zagotovljena mora biti zadostna diureza. Zdravilo se izloča med dializo. Glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila.

Prosimo, izpolnite ta del ali zaprosite otrokovega zdravnika, naj ga izpolni.

Podatki o bolniku

6

ime bolnika

datum rojstva

indikacija za antikoagulacijo

odmerek zdravila Pradaxa

7