

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Uvijek nosite ovu karticu sa sobom i pokažite je zdravstvenim radnicima kod kojih se liječite.

Važne informacije o sigurnosti lijeka Forxiga (dapagliflozin) – samo za šećernu bolest tipa 1

Znakovi dijabetičke ketoacidoze (DKA) uključuju:

Usta i trbuh: osjećaj mučnine ili povraćanje, bol u trbuhu, izrazita žeđ/suhoća usta (znakovi dehidracije), slatki ili metalni okus u ustima.

Dah, disanje i miris: brzo i duboko disanje, zadah slatkog mirisa, promijenjen miris mokraće ili znoja.

Drugi znakovi: povišena razina ketona u mokraći ili krvi, nagli gubitak tjelesne težine, smetenost, neuobičajena pospanost ili umor.

Ako imate znakove/simptome DKA, obratite se liječniku ili odmah otiđite u bolnicu i odmah prestanite uzimati lijek Forxiga.

Zapamtite: U bolesnika koji uzimaju lijek Forxiga može doći do razvoja DKA čak i kad su razine šećera u krvi ispod 14 mmol/l (250 mg/dl). To se stanje zove „euglikemijska DKA“.

**Vaši kontakt podaci i
kontakt podaci Vašeg
liječnika**



Vaše ime:

Liječnikovo ime:

Liječnikov broj telefona:

Datum početka liječenja lijekom Forxiga:

Član obitelji ili prijatelj kojeg treba
kontaktirati u hitnim slučajevima:

Broj telefona člana obitelji ili prijatelja:



Ovaj bolesnik uzima lijek Forxiga (dapagliflozin) za šećernu bolest tipa 1

- On je dodatak liječenju inzulinom.
- To je lijek iz skupine „inhibitora SGLT-2“.
- Liječenje dapagliflozinom treba privremeno prekinuti prije kirurških zahvata ili u slučaju hospitalizacije zbog akutne ozbiljne bolesti.

Ako bolesnik pokazuje znakove dijabetičke ketoacidoze (DKA), odmah ocijenite ima li DKA

- Ocijenite ima li bolesnik DKA neovisno o razini glukoze u krvi.
- U bolesnika koji uzimaju lijek Forxiga može doći do razvoja DKA čak i kad su razine šećera u krvi ispod 14 mmol/l (250 mg/dl). To se stanje zove „euglikemijska DKA“.

Liječenje DKA

- **Ako posumnjate na DKA:** pružite bolesniku hitnu medicinsku pomoć i odmah prekinite liječenje lijekom Forxiga.
- **Liječenje euglikemijske DKA može zahtijevati:** dodatni unos ugljikohidrata uz primjenu inzulina i unos tekućine.

Ni u kojem slučaju nemojte privremeno ni trajno prekinuti inzulinsku terapiju.

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Ovaj materijal, Vodič za bolesnike i njegovatelje i uputa o lijeku dostupni su na internetskoj adresi: <http://pwa.ltd/frx.pat.hr>

AstraZeneca 

Verzija broj 1, 05/2019


forxiga.
(dapagliflozin)

Veeva ID HR-0373