

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

XELJANZ[®]
(tofacitinibcitrat)

U ovoj kartici navedene su važne sigurnosne informacije o kojima trebate voditi računa prije početka i tijekom liječenja lijekom XELJANZ. Ako ne razumijete ove informacije, molimo obratite se liječniku/ljekarniku za savjet.

- Ovu karticu nosite sa sobom i pokažite je svakom liječniku ili ljekarniku koji o Vama skrbe.
- Pogledajte uputu o lijeku XELJANZ za više informacija. XELJANZ trebate koristiti sukladno uputi o lijeku.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o SVIM drugim lijekovima koje uzimate, uključujući one na recept i bezreceptne lijekove, vitamine i biljne dodatke prehrani.

Ne preporučuje se XELJANZ primjenjivati s biološkim lijekovima koji modificiraju tijek bolesti u reumatoidnom ili psorijatičnom artritisu, biološkim lijekovima za ulcerozni kolitis ili nekim drugim lijekovima koji potiskuju Vaš imunološki sustav (poput azatioprina, merkaptopurina, takrolimusa ili ciklosporina). Uzimanje lijeka XELJANZ s tim lijekovima može povećati Vaš rizik od imunosupresije i infekcije.

Tijekom liječenja lijekom XELJANZ

Liječenje lijekom XELJANZ može povećati rizik od nemelanomskog raka kože i infekcija koje mogu postati ozbiljne ako se ne liječe.

Odmah se obratite svom liječniku, ako:

- Razvijete simptome infekcije poput vrućice, ustrajnog kašlja, gubitka tjelesne težine ili prekomjernog umora. Možete biti u većem riziku od infekcije ako imate 65 ili više godina, šećernu bolest, kroničnu bolest pluća ili uzimate kortikosteroide. Vaš liječnik može prekinuti Vaše liječenje lijekom XELJANZ.

- Vam se na koži pojave simptomi herpesa zostera poput bolnog osipa ili mjehura.
- Ste u bliskom kontaktu s osobom koja ima tuberkulozu.
- Primijetite bilo kakve nove izrasline na koži ili promjene postojećih madeža ili mrlja na koži.
- Vam se jave bilo kakvi simptomi intersticijske bolesti pluća, poput nedostatka zraka.

- Vam se jave znakovi i simptomi vezani uz trbuh, poput boli u želucu, boli u trbuhu, krvi u stolici ili bilo kakvi znakovi promjene crijevnih navika praćeni vrućicom.
- Vam koža poprimi žutu boju, osjećate mučninu ili povraćate.
- Trebate primiti bilo koje cjepivo. Tijekom liječenja lijekom XELJANZ ne smijete primiti određene vrste cjepiva.

- Trudni ste ili planirate trudnoću. XELJANZ se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće. Žene reproduktivne dobi treba savjetovati da koriste učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja lijekom XELJANZ i još najmanje 4 tjedna nakon posljednje doze.
- Žene ne bi smjele dojiti dok se liječe lijekom XELJANZ.

Ostale informacije (molim popuniti)

Ime i prezime bolesnika: _____

Ime i prezime liječnika: _____

Telefonski broj liječnika: _____

Faks liječničke ordinacije: _____

Ako prekinete primjenjivati lijek XELJANZ, ovu karticu nosite sa sobom najmanje 2 mjeseca od primitka zadnje doze lijeka XELJANZ.

