

KEYTRUDA

pembrolizumab

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Može uzrokovati neke ozbiljne nuspojave koje mogu ponekad biti opasne po život i dovesti do smrti. Mogu se javiti bilo kada tijekom liječenja ili čak i nakon što je Vaše liječenje završilo. Možete imati više od jedne nuspojave u isto vrijeme.

Odmah se obratite svom liječniku ako se pojavi bilo koji znak ili simptom uključujući i one koji nisu navedeni u ovoj kartici. Vaš liječnik Vam može dati druge lijekove kako bi se spriječile teže komplikacije i smanjili simptomi. Vaš liječnik može odgoditi slijedeću dozu lijeka KEYTRUDA ili prekinuti liječenje lijekom KEYTRUDA.

Za više informacija pročitajte Uputu o lijeku KEYTRUDA, koja sadrži informacije za bolesnika, na adresi: www.ema.europa.eu ili www.halmed.hr

VAŽNO

- Nemojte pokušavati sami dijagnosticirati ili liječiti nuspojave.
- **Uvijek nosite ovu karticu sa sobom, osobito kada putujete, kad god odlazite u hitnu službu ili kada morate posjetiti nekog drugog liječnika.**
- Obavezno recite svakom zdravstvenom radniku kojeg posjetite da se liječite lijekom KEYTRUDA i pokažite mu ovu karticu.

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.

Upala pluća

- nedostatak zraka
- bol u prsnom košu
- kašalj

Upala crijeva

- proljev ili učestalije pražnjenje crijeva nego inače
- crne, katranaste i ljepljive stolice ili stolice koje sadrže krv ili sluz
- jaki bolovi u truhu ili osjetljivost trbuha na dodir
- mučnina ili povraćanje

Upala jetre

- mučnina ili povraćanje
- smanjen osjećaj gladi
- bol s desne strane trbuha
- žuta boja kože ili bjeloočnica
- tamna mokraća
- povećana sklonost krvarenju ili nastanku modrica

Upala bubrega

- promjene u količini ili boji mokraće

Šećerna bolest tipa 1

- pojačan osjećaj gladi ili žeđi
- češća potreba za mokrenjem
- gubitak tjelesne težine

Upala hormonskih žlijezda

- ubrzani otkucaji srca
- gubitak ili povećanje tjelesne težine
- pojačano znojenje
- gubitak kose
- osjećaj hladnoće
- zatvor
- dublji glas
- bolovi u mišićima
- omaglica ili nesvjestica
- glavobolje koje ne prolaze ili neuobičajena glavobolja

Komplikacije u osoba podvrgnutih presađivanju koštane srži (matičnih stanica) kod kojeg se koriste matične stanice davatelja (alogeno presađivanje)

- kožni osip
- upala jetre
- bol u truhu
- proljev

Ovaj se bolesnik liječi lijekom KEYTRUDA (pembrolizumab), koji može izazvati imunološki uzrokovane nuspojave koje se mogu javiti bilo kada tijekom liječenja ili čak i nakon završetka liječenja. Pregledajte bolesnika kako biste uočili moguće znakove i simptome imunološki uzrokovanih nuspojava. Rano dijagnosticiranje i odgovarajuće zbrinjavanje ključni su u umanjivanju svih posljedica imunološki uzrokovanih nuspojava.

Za više informacija pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka KEYTRUDA na stranici www.ema.europa.eu ili www.halmed.hr.

U slučaju sumnje na imunološki uzrokovane nuspojave, potrebno je osigurati odgovarajuću procjenu radi potvrde etiologije ili isključivanja drugih uzroka. Ovisno o težini nuspojave, potrebno je odgoditi primjenu lijeka KEYTRUDA i primijeniti kortikosteroide. Specifične smjernice za zbrinjavanje imunološki uzrokovanih nuspojava nalaze se u Sažetku opisa svojstava lijeka KEYTRUDA. Savjetovanje s onkologom ili drugim specijalistom može pomoći kod zbrinjavanja imunološki posredovanih nuspojava vezanih uz određeni organ.



Verzija 6, rujan 2019.

KEYTRUDA

pembrolizumab

Važni kontaktni podaci

Ime liječnika _____

Telefonski broj ordinacije _____

Telefonski broj izvan radnog vremena _____

Moje ime _____

Moj telefonski broj _____

Kontakt za hitne slučajeve (ime i tel. broj) _____