

(eliglustat) ▲

LJEKOM CERDELGA

ZA BOLESNIKE KOJI SE LIJECE

KARTICA S UPOZORENJIMA

KARTICA S UPOZORENJIMA
ZA BOLESNIKE



Informacije za bolesnike

Molimo nosite ovu karticu uvijek sa sobom i pokažite je svakom zdravstvenom radniku s kojim dođete u doticaj kako biste ga informirali o Vašoj trenutnoj terapiji lijekom CERDELGA

- ▶ Nemojte uzimati nove lijekove propisane na recept, lijekove koji se mogu kupiti bez recepta, niti biljne lijekove, a da o tome niste prethodno razgovarali s Vašim liječnikom ili ljekarnikom
- ▶ Nemojte konzumirati proizvode koji sadrže grejp



▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestruru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED mobilnu aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljinjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Informacije za zdravstvene radnike

Lijek CERDELGA indiciran je za dugotrajno liječenje odraslih bolesnika s Gaucherovom bolešću tipa 1 koji su spori metabolizatori (SM), intermedijarni metabolizatori (IM) ili ekstenzivni metabolizatori (EM) CYP2D6.

Za više informacija molimo pročitajte zadnji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka

Bolesnici koji spadaju u skupinu ekstenzivnih (EM) i intermedijarnih metabolizatora (IM)

- ▶ CERDELGA se ne smije uzimati u kombinaciji sa jakim ili umjerenim inhibitorom CYP2D6 istovremeno sa jakim ili umjerenim inhibitorom CYP3A
- ▶ Lijek CERDELGA ne smiju uzimati bolesnici koji spadaju u skupinu ekstenzivnih metabolizatora (EM):
 - s teškim oštećenjem funkcije jetre
 - s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije jetre koje se liječi jakim ili umjerenim inhibitorom CYP2D6
- ▶ Ne preporučuje se primjena lijeka CERDELGA:
 - u bolesnika koji su ekstenzivni metabolizatori (EM) s umjerenim oštećenjem funkcije jetre
 - u bolesnika koji su intermedijarni metabolizatori (IM) s bilo kojim stupnjem oštećenja funkcije jetre
- ▶ Ne preporučuje se primjena lijeka CERDELGA u kombinaciji sa snažnim induktorom CYP3A
- ▶ CERDELGA se treba uzimati s oprezom u kombinaciji s:
 - umjerenim inhibitorom CYP2D6
 - snažnim ili umjerenim inhibitorom CYP3A
 - supstratima P-gp ili CYP2D6 (možda će biti potrebno sniziti doze takvih lijekova)
- ▶ Ne preporučuje se primjena lijeka CERDELGA u bolesnika koji su ekstenzivni (EM) ili intermedijarni metabolizatori (IM) s bolešću bubrega u završnom stadiju niti u bolesnika koji su intermedijarni metabolizatori (IM) s blagim, umjerenim ili teškim oštećenjem funkcije bubrega
- ▶ Doza lijeka CERDELGA mora se smanjiti na 84 mg JEDNOM na dan:
 - u bolesnika koji su ekstenzivni (EM) ili intermedijarni metabolizatori (IM) istovremeno liječeni jakim inhibitorom CYP2D6
 - u bolesnika koji su ekstenzivni metabolizatori (EM) s blagim oštećenjem funkcije jetre, liječenih slabim inhibitorom CYP2D6 ili bilo kojim inhibitorom CYP3A

Bolesnici koji spadaju u skupinu sporih metabolizatora (SM):

- ▶ CERDELGA se ne smije uzimati istovremeno sa snažnim inhibitorom CYP3A
- ▶ Ne preporučuje se primjena lijeka CERDELGA u bolesnika koji su spori metabolizatori (SM) s bilo kojim stupnjem oštećenja funkcije jetre
- ▶ Ne preporučuje se uzimati lijek CERDELGA u kombinaciji s:
 - jakim induktorom CYP3A
 - umjerenim inhibitorom CYP3A
- ▶ Ne preporučuje se primjena lijeka CERDELGA u bolesnika koji su spori metabolizatori (SM) s bolešću bubrega u završnom stadiju ili s blagim, umjerenim ili teškim oštećenjem funkcije bubrega
- ▶ CERDELGA se treba uzimati s oprezom u kombinaciji sa:
 - slabim inhibitorom CYP3A
 - supstratima P-gp ili CYP2D6 (možda će biti potrebno sniziti doze takvih lijekova)