

3. PODSJETNIK ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Podsjetnik za zdravstvene djelatnike o lijeku Erivedge ▼

Bolesnice reproduktivne dobi:

- moraju svaki mjesec napraviti test na trudnoću, čak i ako imaju amenoreju.
- moraju uvijek koristiti preporučenu kontracepciju tijekom liječenja lijekom Erivedge i još 24 mjeseca nakon uzimanja posljednje doze lijeka
- ne smiju dobiti tijekom liječenja ni 24 mjeseca nakon uzimanja posljednje doze lijeka.

Bolesnici muškog spola:

- moraju koristiti prezervativ (po mogućnosti sa spermicidom) pri spolnom odnosu s partnericom tijekom liječenja lijekom Erivedge i još 2 mjeseca nakon uzimanja posljednje doze lijeka
- ne smiju donirati sjeme tijekom liječenja ni 2 mjeseca nakon uzimanja posljednje doze ovog lijeka

Bolesnici Vas moraju hitno kontaktirati ako se sumnja na trudnoću u bolesnice ili u partnerice bolesnika muškog spola.

Morate:

- ocijeniti status trudnoće, savjetovati bolesnike o rizicima od teratogenih učinaka te uputiti bolesnika i njegovu partnericu specijalisti
- prijaviti sve potvrđene trudnoće Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
- navesti tražene podatke na web portalu o sprječavanju trudnoće (www.erivedge-ppp.net)

Svi bolesnici:

- nikada ne smiju ovaj lijek davati drugim osobama
- moraju vratiti neupotrijebljene kapsule na kraju liječenja (*odlaganje ovisi o lokalnim propisima*)
- ne smiju darovati krv tijekom liječenja ni 24 mjeseca nakon uzimanja posljednje doze lijeka.

Dodatne informacije o nuspojavama i sprječavanju trudnoće kod primjene lijeka Erivedge možete pronaći u Sažetku opisa svojstava lijeka i Uputi o lijeku.

Sve nuspojave kao i sumnju na neispravnost u kakvoći lijeka potrebno je prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem:

- obrasca dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. Prijave je moguće poslati poštom (Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb), telefaksom (01/4884-119) ili elektronskom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr).

Ili

- on-line prijave nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći.