

Paracetamol Kabi


10 mg/ml otopina za infuziju

Rizik od predoziranja kod novorođenčadi, dojenčadi i odraslih s manjom tjelesnom težinom uzrokovan pogreškom u primjeni paracetamola za intravensku primjenu.

Terapijske indikacije: kratkotrajno liječenje umjereno jake boli, posebice boli nakon kirurških zahvata; kratkotrajno liječenje vrućice, u slučajevima kada je intravenska primjena klinički opravdana uslijed hitne potrebe za liječenjem boli ili hipertermije i/ili ukoliko nije moguć drugi put primjene.⁽¹⁾

DOZIRANJE OVISI O TJELESNOJ TEŽINI BOLESNIKA. PRIMJENJENI VOLUMENI MOGU BITI VRLO MALI.


Doziranje se temelji na tjelesnoj težini bolesnika⁽¹⁾

	Novorođenčad, dojenčad i djeca do 10 kg	Djeca iznad 10 kg, adolescenti i odrasli do 50 kg
Za operacijsku salu	7.5 mg/kg što odgovara 0.75 ml/kg	15 mg/kg što odgovara 1.5 ml/kg
 <p>Najmanji vremenski razmak između dvije primjene: 4 sata</p>	7.5 mg/kg	15 mg/kg
	Primjenjeni volumen ne smije biti veći od 4x7.5 mg/kg paracetamola, pri čemu se ne smije prijeći 30 mg/kg/24 sata	1 intravenska infuzija od 15 mg/kg/4-6 sati, pri čemu se ne smije prijeći 60 mg/kg/24 sata

(Doziranje je izraženo u mg paracetamola po kg tjelesne težine)

Paracetamol Kabi
10 mg/ml, 50 ml
1 ml = 10 mg

Primjena bočice od 50 ml ograničena je na novorođenčad rođenu u terminu (donošenu), dojenčad i djecu tjelesne težine do 33 kg.⁽¹⁾



- **Novorođenčad, dojenčad i djeca do 10 kg (cca. jedna godina starosti):**
7.5 mg/kg, što odgovara 0.75ml/kg po primjeni, do 4 puta na dan.
- **Djeca tjelesne težine iznad 10 kg (cca. jedna godina starosti) i do 33 kg:**
15 mg/kg, što odgovara 1.5 ml/kg po primjeni, do 4 puta na dan.

Primjeri doziranja	
Tjelesna težina djeteta	Volumen za primjenu
2 kg	1.5 ml
2.5 kg	1.8 ml
3 kg	2.25 ml

Paracetamol Kabi
10 mg/ml, 100 ml
1 ml = 10 mg

Primjena bočice od 100 ml ograničena je na odrasle osobe, adolescente i djecu tjelesne težine iznad 33 kg.⁽¹⁾



- Odrasli i adolescenti tjelesne težine iznad 50 kg:
Pogledati Sažetak opisa svojstava lijeka
- Djeca tjelesne težine iznad 33 kg (cca. 11 godina starosti), adolescenti i odrasli do 50 kg:
15 ml/kg što odgovara 1.5 ml/kg po primjeni, do 4 puta na dan.

- Kod djece s manjom tjelesnom težinom, Paracetamol Kabi se može razrijediti u 0,9% otopini natrijevog klorida ili u 5% otopini glukoze do jedne desetine.
- Kako biste izbjegli rizik od predoziranja, provjerite da drugi lijekovi koji se primjenjuju ne sadrže paracetamol ili propacetamol hidroklorid.
- U slučaju predoziranja uzmite u obzir sljedeće (za detaljan postupak pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka i savjetujte se s toksikologom): hospitalizacija, simptomatsko liječenje, primjena N-acetilcisteina (protuotrov), uzorci krvi (testovi funkcije jetre, test razine paracetamola u plazmi). Učinci hemodijalize su ograničeni. Teški slučajevi mogu zahtijevati transplantaciju jetre.

⁽¹⁾ Sažetak opisa svojstava lijeka Paracetamol Kabi