


Vaša Xyrem® kutija sadrži jednu bocu Xyrem® oralne otopine, nastavak koji se utisne u bocu, odmjernu štrcaljku, dvije dozirne čaše sa sigurnosnim zatvaračima za djecu za pripremu i čuvanje Vaših dviju noćnih doza te Xyrem® Uputu o lijeku.




Slika 1

Prije uzimanja Vaših prvih doza Xyrema® molimo pročitajte Uputu o lijeku za dodatne važne informacije. Uvijek uzmite Xyrem® točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja ili zabrinutosti o Xyremu®, obratite se svom liječniku.


Trebat ćete pripremiti obje doze prije odlaska u krevet.

1. Uklonite zatvarač na boci okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (ulijevo) i pritiskom prema dolje. Nakon što ste odstranili zatvarač, stavite bocu uspravno na stol. Na vrhu boce je plastična zaštitna folija koja se mora odstraniti prije prvog korištenja. Dok držite bocu u uspravnom položaju, utisnite nastavak koji se utisne u bocu u vrat boce. Ovaj postupak treba napraviti samo prvi put kad otvarate bocu. Nastavak može ostati u boci za naredna korištenja (vidjeti sliku 2).




Slika 2

2. Umetnite vrh odmjerne štrcaljke u središte otvora boce i čvrsto pritisnite prema dolje (vidjeti sliku 3).




Slika 3

3. Dok držite bocu i odmjernu štrcaljku jednom rukom, drugom rukom povlačeći klip izvucite propisanu dozu. **NAPOMENA:** Lijek neće teći u štrcaljku ako bocu ne držite u uspravnom položaju (vidjeti sliku 4).



Slika 4

4. Odstranite štrcaljku iz središnjeg otvora boce. Ispraznite lijek iz štrcaljke u jednu dozirnu čašu pritišćući klip štrcaljke. Ponovite isti postupak za drugu dozirnu čašu. Zatim dodajte oko 60 ml vode u svaku dozirnu čašu – 60 ml je otprilike 4 jušne žlice (vidjeti sliku 5).




Slika 5

5. Postavite priložene zatvarače na dozirne čaše i okrenite svaki zatvarač u smjeru kazaljke na satu (udesno) dok se ne čuje klik i dok se ne zaključa u položaj siguran za djecu (vidjeti sliku 6). Isperite štrcaljku vodom.



Slika 6

6. Neposredno prije odlaska na spavanje postavite drugu dozu uz svoj krevet. Možda ćete morati namjestiti alarm za buđenje kako biste svoju drugu dozu uzeli ne prije 2,5 sata niti kasnije od 4 sata nakon prve doze. Odstranite zatvarač s prve dozirne čaše (vidjeti sliku 7) tako da pritisnete prema dolje sigurnosni zatvarač za djecu i okrenete ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (ulijevo). Popijte sav sadržaj prve doze dok sjedite u krevetu, zatvorite čašu i odmah legnite na spavanje.



Slika 7

7. Kada se probudite 2,5 do 4 sata kasnije, odstranite zatvarač s druge dozirne čaše. Dok sjedite u krevetu, popijte sav sadržaj iz druge čaše te ponovno legnite i nastavite spavati. Zatvorite drugu čašu.

Za više detalja o informacijama koje se nalaze u ovoj uputi, pogledajte Uputu o lijeku u Xyrem® kutiji te se obratite svom liječniku ili ljekarniku. O svim sumnjama na nuspojave lijeka trebate obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim ste u stupili u kontakt. O sumnji na nuspojavu možete izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem

- on-line prijave nuspojave dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr ili
- pisano putem obrasca za prijavu nuspojave za pacijenta/korisnika dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. Nuspojavu može prijaviti korisnik lijeka, roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik poštom na adresu Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb, telefaksom (01/4884-119) ili elektronskom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr).