

Vodič za bolesnike i njihove njegovatelje za doziranje i praćenje pedijatrijske primjene lijeka Caprelsa (vandetanib)

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Caprelsa u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka.

Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika

Što je Caprelsa i što se njome liječi?

Caprelsa je lijek koji sadrži djelatnu tvar vandetanib.

Dostupna je u obliku filmom obloženih tableta (100 mg i 300 mg).

Koristi se za liječenje medularnog karcinoma štitnjače koji se naziva medularni karcinom štitnjače s mutacijom protoonkogena RET (engl. *Rearranged during Transfection*, RET) i koji se ne može odstraniti operacijom ili se proširio na druge dijelove tijela.

Caprelsa djeluje tako da usporava rast novih krvnih žila u tumoru (raku). Time se prekida opskrba tumora hranom i kisikom. Caprelsa također može djelovati izravno na stanice raka, da ih uništi ili uspori njihov rast.

Kako se izračunava doza lijeka Caprelsa?

Dozu vandetaniba izračunava nadležni liječnik na temelju tjelesne površine djeteta/adolescenta, koja ovisi o bolesnikovoj tjelesnoj težini i visini.

Ovisno o izračunatoj tjelesnoj površini, liječnik će Vašem djetetu propisati **početnu dozu**, koja se zatim može zamijeniti (prilagodba doze):

- **povećanom dozom**, ako bolesnik dobro podnosi vandetanib nakon 8 tjedana liječenja početnom dozom
- **smanjenom dozom**, u slučaju neželjenih nuspojava, nakon privremenog prekida liječenja (u trajanju od najmanje tjedan dana) i potpunog oporavka od nuspojava

Doza se može promijeniti i ako se tjelesna površina promijeni tijekom liječenja. Ukupna dnevna doza u djece ne smije biti veća od 300 mg.

Raspored liječenja odgovarat će jednoj od sljedeće 3 sheme:

- * **raspored primjene „svaki dan“** (ista doza svaki dan)
- * **raspored primjene „svaki drugi dan“** (ista doza svaki drugi dan)
- * **„7 dnevni“ raspored primjene** (lijek se uzima svakodnevno, ali u dvije različite doze naizmjence)

Imajte na umu da se raspored doziranja može promijeniti tijekom liječenja.

Primjerice, tijekom početnog razdoblja možda ćete slijediti raspored primjene *svaki dan*, a zatim prijeći na *7 dnevni* raspored nakon prilagodbe doze.

Svaku uzetu dozu morat ćete zabilježiti u dnevniku za svakodnevno praćenje (pogledajte u nastavku).

Kako se Caprelsa uzima?

Propisanu izračunatu dozu treba uzimati:

- u približno isto vrijeme
- s hranom ili bez nje

Ako je djjetetu teško progutati tabletu, možete je pomiješati s vodom na sljedeći način:

- Uzmite pola čaše obične (negazirane) vode. Koristite samo vodu, ne koristite nikakve druge tekućine.
- Stavite tabletu u vodu.
- Miješajte tabletu dok se ne rastopi u vodi. To može potrajati oko 10 minuta.
- Neka dijete zatim odmah popije otopinu.

Kako biste bili sigurni da je dijete popilo sav lijek, čašu još jednom dopola napunite vodom i dajte djjetetu da je popije.

Koje su nuspojave povezane s primjenom lijeka Caprelsa? Koje su kontrole potrebne?

Liječnik će Vas upozoriti na glavne rizike primjene vandetaniba. Za više informacija o lijeku Caprelsa, pažljivo pročitajte i uputu o lijeku.

Najčešće prijavljene nuspojave kod primjene vandetaniba su proljev, osip ili neka druga kožna reakcija, mučnina, hipertenzija (visok krvni tlak) i glavobolja.

Odmah obavijestite liječnika ako se pojavi neka od sljedećih nuspojava – možda će biti potrebna hitna medicinska pomoć:

- nesvjestica, omaglica ili osjećaj nepravilnog kucanja srca. To mogu biti znakovi promjene u električnoj aktivnosti srca povezani s produljenjem QTc intervala i *torsade de pointes*.
- teške kožne reakcije koje zahvaćaju velike površine tijela. Znakovi mogu obuhvaćati crvenilo, bol, čireve, mjehuriće i ljuštenje kože. Mogu biti zahvaćene usne, nos, oči i spolovila.
- težak proljev.
- ozbiljan nedostatak zraka ili nedostatak zraka koji se iznenada pogoršava, uz mogući kašalj ili visoku temperaturu (vrućicu). To može značiti da Vaše dijete ima upalu pluća koja se zove ‘intersticijska bolest pluća’ koja može biti opasna po život.
- epileptički napadaji, glavobolja, smetenost ili poteškoće s koncentracijom. To mogu biti znakovi stanja koje se zove RPLS (sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije). Oni obično nestaju kada se prekine liječenje lijekom Caprelsa.

PRIJE i redovito TIJEKOM liječenja vandetanibom (1, 3, 6 i 12 tjedana nakon početka liječenja a zatim svaka 3 mjeseca) morat će se kontrolirati krvna slika i rad srca, osobito:

- razine kalija, kalcija, magnezija i hormona koji stimulira štitnjaču (TSH) u krvi
- električna aktivnost srca pretragom koja se zove elektrokardiogram (EKG)

Potrebno je dobro zaštititi kožu (odjećom, kremom za zaštitu od sunca), osobito ako je Vaše dijete osjetljivo na sunce.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima, nedavno je uzelo ili bi moglo uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući one koji se mogu nabaviti bez recepta i biljne lijekove. Oni bi mogli utjecati na djelovanje vandetaniba i tako smanjiti njegovu djelotvornost ili povećati nuspojave.

Sve nuspojave prijavite liječniku. On će možda propisati i druge lijekove koji će pomoći kontrolirati nuspojave. Možda će biti potrebno i privremeno prekinuti liječenje te smanjiti dozu.

Kako koristiti dnevnik praćenja?

Kada liječnik propiše početnu dozu, u dnevniku praćenja će ispuniti „dio za propisivača“ i objasniti Vam kako ćete ga koristiti. Dnevnik za svakodnevno praćenje pomoći će Vam:

- da se sjetite kada dati novu dozu Vašem djetetu i koju dozu dati. Morate ju unijeti u dnevnik nakon svake doze koju Vaše dijete uzme.
- prijaviti nuspojave i pratiti prilagodbe doze.

Dnevnik praćenja **prilagođen je svim režimima doziranja**. U slučaju promjene doze kao i pri svakoj kontroli u razdoblju od 3 mjeseca, liječnik će Vam dati novi primjerak Vodiča zajedno sa dnevnikom praćenja.

Uz primjere ispunjenih tablica možete pronaći priložene prazne tablice za svakodnevno praćenje koje pokrivaju period od 8 tjedana nakon čega ćete dobiti novi primjerak, a popunjene tablice bit će pohranjene u Vaš medicinski karton.

Obavezno dnevnik praćenja nosite sa sobom pri svakoj posjeti liječniku.

Dnevnik praćenja - osnovna 14-dnevna tablica za svakodnevno praćenje

Dio za propisivača		Dnevnik praćenja za bolesnika					
Težina:	_____	Ime i prezime bolesnika:	_____	Datum rođenja:	_____	Ako dijetet zaboravi uzeti lijek Caprelsa:	_____
Visina:	_____					- Ako je do slijedeće doze ostalo 12 sati ili više: Uzeti propuštenu tabletu čim se sjetite. Zatim uzeti sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.	
Površina tijela:	_____ m ²	Datum propisivanja:	_____			- Ako je do slijedeće doze ostalo manje od 12 sati: Preskočiti propuštenu dozu. Zatim uzeti sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.	
Datum propisivanja:	_____					NEMOJ TE uzeti dvostruku dozu (dvije doze u isto vrijeme) kako biste nadoknadiili zaboravljenu tabletu.	
<input type="checkbox"/> početna doza						1. - 2. tjedan Početak:	3. - 4. tjedan Početak:
<input type="checkbox"/> povećana doza							5. - 6. tjedan Početak:
<input type="checkbox"/> smanjena doza							7. - 8. tjedan Početak:
(vidjeti preporuke za doziranje)							
Dan u tjednu	Propisana doza						
Ponedjeljak 1. dan							
Utorak 2. dan							
Srijeda 3. dan							
Četvrtak 4. dan							
Petak 5. dan							
Subota 6. dan							
Nedjelja 7. dan							

Dan u tjednu	Propisana doza	1. – 2. tjedan Početak:	3. – 4. tjedan Početak:	5. – 6. tjedan Početak:	7. – 8. tjedan Početak:
Ponedjeljak 8. dan					
Utorak 9. dan					
Srijeda 10. dan					
Četvrtak 11. dan					
Petak 12. dan					
Subota 13. dan					
Nedjelja 14. dan					

Dostupne doze	Napomene bolesnika i/ili bolesnikovog njegovačelja (nuspojave, druge terapije ili važne informacije)
100 mg =	
200 mg =	
300 mg =	

Dnevnik praćenja - osnovna 14-dnevna tablica za svakodnevno praćenje

Dio za propisivača		Dnevnik praćenja za bolesnika					
Težina:	_____	Ime i prezime bolesnika:	_____	Datum rođenja:	_____	Ako dijetet zaboravi uzeti lijek Caprelsa:	_____
Visina:	_____					- Ako je do slijedeće doze ostalo 12 sati ili više: Uzeti propuštenu tabletu čim se sjetite. Zatim uzeti sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.	
Površina tijela:	_____ m ²	Datum propisivanja:	_____			- Ako je do slijedeće doze ostalo manje od 12 sati: Preskočiti propuštenu dozu. Zatim uzeti sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.	
Datum propisivanja:	_____					NEMOJ TE uzeti dvostruku dozu (dvije doze u isto vrijeme) kako biste nadoknadiili zaboravljenu tabletu.	
<input type="checkbox"/> početna doza		Propisana doza	9. – 10. tjedan Početak:	11. – 12. tjedan Početak:	13. – 14. tjedan Početak:	15. – 16. tjedan Početak:	
<input type="checkbox"/> povećana doza							
<input type="checkbox"/> smanjena doza							
(Vidjeti preporuke za doziranje)		Dan u tjednu					
		Ponedjeljak 1. dan					
		Utorak 2. dan					
		Srijeda 3. dan					
		Četvrtak 4. dan					
		Petak 5. dan					
		Subota 6. dan					
		Nedjelja 7. dan					

Dan u tjednu	Propisana doza	9. – 10. tjedan Početak:	11. – 12. tjedan Početak:	13. – 14. tjedan Početak:	15. – 16. tjedan Početak:
Ponedjeljak 8. dan					
Utorak 9. dan					
Srijeda 10. dan					
Četvrtak 11. dan					
Petak 12. dan					
Subota 13. dan					
Nedjelja 14. dan					
Dostupne doze		Napomene bolesnika i/ili bolesnikovog njegovačelja (nuspojave, druge terapije ili važne informacije)			
100 mg =					
200 mg =					
300 mg =					

Dnevnik praćenja - osnovna 14-dnevna tablica za svakodnevno praćenje

Dio za propisivača		Dnevnik praćenja za bolesnika					
Težina:	_____	Ime i prezime bolesnika:	_____	Datum rođenja:	_____	Ako dijetet zaboravi uzeti lijek Caprelsa:	_____
Visina:	_____					- Ako je do slijedeće doze ostalo 12 sati ili više: Uzeti propuštenu tabletu čim se sjetite. Zatim uzeti sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.	
Površina tijela:	_____ m ²	Datum propisivanja:	_____			- Ako je do slijedeće doze ostalo manje od 12 sati: Preskočiti propuštenu dozu. Zatim uzeti sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.	
Datum propisivanja:	_____					NEMOJ TE uzeti dvostruku dozu (dvije doze u isto vrijeme) kako biste nadoknadiili zaboravljenu tabletu.	
<input type="checkbox"/> početna doza		Propisana doza	17. - 18. tjedan Početak:	19. - 20. tjedan Početak:	21. - 22. tjedan Početak:	23. - 24. tjedan Početak:	
<input type="checkbox"/> povećana doza							
<input type="checkbox"/> smanjena doza							
(Vidjeti preporuke za doziranje)		Dan u tjednu					
		Ponedjeljak 1. dan					
		Utorak 2. dan					
		Srijeda 3. dan					
		Četvrtak 4. dan					
		Petak 5. dan					
		Subota 6. dan					
		Nedjelja 7. dan					

Dan u tjednu	Propisana doza	17. – 18. tjedan Početak:	19. – 20. tjedan Početak:	21. – 22. tjedan Početak:	23. – 24. tjedan Početak:
Ponedjeljak 8. dan					
Utorak 9. dan					
Srijeda 10. dan					
Četvrtak 11. dan					
Petak 12. dan					
Subota 13. dan					
Nedjelja 14. dan					
Dostupne doze		Napomene bolesnika i/ili bolesnikovog njegovačelja (nuspojave, druge terapije ili važne informacije)			
100 mg =					
200 mg =					
300 mg =					

Primjer za početnu dozu za dijete čija je tjelesna površina od $0,7 \text{ m}^2$ do $<0,9 \text{ m}^2$ (raspored primjene „svaki drugi dan“: 1. dan \neq 8. dan)

Dio za propisivača	Dnevnik praćenja za bolesnika					
Težina: _____ Visina: _____ Površina tijela: <u>0,8</u> m^2 Datum propisivanja: <u>12.09.2016.</u>	Ime i prezime bolesnika: _____ Datum rođenja: _____ Ako dijete zaboravi uzeti lijek Capreksa:	<ul style="list-style-type: none">- Ako je do sljedeće doze ostalo 12 sati ili više: Uzmite propuštenu tabletu čim se sjetite.- Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.- Ako je do sljedeće doze ostalo manje od 12 sati: Preskočite propuštenu dozu. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. <p>NEMOJTE uzeti dvostruku dozu (dvije doze u isto vrijeme) kako biste nadoknadjili zaboravljenu tabletu.</p>				
<input checked="" type="checkbox"/> početna doza <input type="checkbox"/> povećana doza <input type="checkbox"/> smanjena doza (vidjeti preporuke za doziranje)	Propisana doza	1. - 2. tjedan Početak: <u>12.09.2016.</u>	3. - 4. tjedan Početak: <u>26.09.2016.</u>	5. - 6. tjedan Početak: <u>10.10.2016.</u>	7. - 8. tjedan Početak: <u>24.10.2016.</u>	
Dan u tjednu						
Ponedjeljak 1. dan	-	0	0	0	0	0
Utorak 2. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
Srijeda 3. dan	-	0	0	0	0	0
Četvrtak 4. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
Petak 5. dan	-	0	0	0	0	0
Subota 6. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
Nedjelja 7. dan	-	0	0	0	0	0

Dan u tjednu	Propisana doza	1. – 2. tjedan Početak: 12.09.2016.	3. – 4. tjedan Početak: 26.09.2016.	5. – 6. tjedan Početak: 10.10.2016.	7. – 8. tjedan Početak: 24.10.2016.
Ponedjeljak 8. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
Utorak 9. dan	–	0	0	0	0
Srijeda 10. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
Četvrtak 11. dan	–	0	0	0	0
Petak 12. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
Subota 13. dan	–	0	0	0	0
Nedjelja 14. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg

Dostupne doze	Napomene bolesnika i/ili bolesnikov njegovatelja (nuspojave, druge terapije ili važne informacije)	Dobro se podnosi nakon 8 tjedana, nori recept za veću dозу (100 mg na dan) -> Nova tablica za snakodarenvo pranje
100 mg =	Nuspojavi: mala kožna reakcija. Poziv liječniku, bez prekida primijene lijeka. Operarnik uz potrebanu zaštitu od sunca.	
200 mg =		
300 mg =		

Primjer za povećanu dozu za dijete čija je tjelesna površina od 0,9 m² do <1,2 m² („7-dnevni“ raspored primjene: 1. dan = 8. dan)

Dio za propisivača	Dnevnik praćenja za bolesnika				
Težina: <u>35 kg</u> Visina: <u>125 cm</u> Površina tijela: <u>1,1 m²</u> Datum propisivanja: <u>12.09.2016.</u>	Ime i prezime bolesnika: _____ Datum rođenja: _____ Ako dijete zaboravi uzeti lijek Capreksa: <ul style="list-style-type: none">- Ako je do slijedeće doze ostalo 12 sati ili više: Uzmite propuštenu tabletu čim se sjetite. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.- Ako je do slijedeće doze ostalo manje od 12 sati: Preskočite propuštenu dozu. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. <p>NEMOJTE uzeti dvostruku dozu (dvije doze u isto vrijeme) kako biste nadoknadjili zaboravljenu tabletu.</p>	1. - 2. tjedan Početak: <u>12.09.2016.</u>	3. - 4. tjedan Početak: <u>26.09.2016.</u>	5. - 6. tjedan Početak: <u>10.10.2016.</u>	7. - 8. tjedan Početak: <u>24.10.2016.</u>
<input type="checkbox"/> početna doza <input checked="" type="checkbox"/> povećana doza <input type="checkbox"/> smanjena doza (vidjeti preporuke za doziranje)	Dan u tjednu	Propisana doza			
	Ponedjeljak 1. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
	Utorak 2. dan	200 mg	2 X 100 mg	2 X 100 mg	2 X 100 mg
	Srijeda 3. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg
	Četvrtak 4. dan	200 mg	2 X 100 mg	2 X 100 mg	2 X 100 mg
	Petak 5. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	privremeni prekid primjene
	Subota 6. dan	200 mg	2 X 100 mg	2 X 100 mg	privremeni prekid primjene
	Nedjelja 7. dan	100 mg	1 x 100 mg	1 x 100 mg	privremeni prekid primjene

Dan u tjednu	Propisana doza	1. – 2. tjedan Početak: 12.09.2016.	3. – 4. tjedan Početak: 26.09.2016.	5. – 6. tjedan Početak: 10.10.2016.	7. – 8. tjedan Početak: 24.10.2016.
Ponedjeljak 8. dan	100 mg	1 X 100 mg	1 X 100 mg	prvremenim prekid primjene	
Utorak 9. dan	200 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	prvremenim prekid primjene	
Srijeda 10. dan	100 mg	1 X 100 mg	1 X 100 mg	prvremenim prekid primjene	
Četvrtak 11. dan	200 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	prvremenim prekid primjene	
Petak 12. dan	100 mg	1 X 100 mg	1 X 100 mg	prvremenim prekid primjene	
Subota 13. dan	200 mg	2 x 100 mg	2 x 100 mg	povrno uvodjenje liječenja smanjenom dozom	
Nedjelja 14. dan	100 mg	1 X 100 mg	1 X 100 mg		

Dostupne doze	Napomene bolesnika i/ili bolesnikovog njegovatelja (nuspjave, druge terapije ili važne informacije)		
100 mg =	Povećanje doze nakon 8 tjedana liječenja dozom od 100 mg na dan Umor (slabost)	Tonzilitis : amoxicilin	Četvrtak-5. tjedan: pogoršanje kožne reakcije. Prvremeni prekid liječenja Četvrtak-4. tjedan: mala kožna reakcija, poziv liječniku -> pratiti stanjem i ne izlagati se suncu

Primjer za povećanu dozu za dijete čija je tjelesna površina

> 1,6 m² (raspored primjene „svaki dan“: 1. dan = x. dan)

Dio za propisivača	Dnevnik praćenja za bolesnika					
Težina: _____ Visina: _____	Ime i prezime bolesnika: _____ Datum rođenja: _____	Ako dijete zaboravi uzeti lijek Capreksa: - Ako je do slijedeće doze ostalo 12 sati ili više: Uzmite propuštenu tabletu čim se sjetite. - Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. - Ako je do slijedeće doze ostalo manje od 12 sati: Preskočite propuštenu dozu. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. NEMOJTE uzeti dvostruku dozu (dvije doze u isto vrijeme) kako biste nadoknadjili zaboravljenu tabletu.	1. - 2. tjedan Početak: <u>12.09.2016.</u>	3. - 4. tjedan Početak: <u>26.09.2016.</u>	5. - 6. tjedan Početak: <u>10.10.2016.</u>	7. - 8. tjedan Početak: <u>24.10.2016.</u>
Površina tijela: <u>1,68</u> m ² Datum propisivanja: <u>12.09.2016.</u> <input type="checkbox"/> početna doza <input checked="" type="checkbox"/> povećana doza <input type="checkbox"/> smanjena doza (vidjeti preporuke za doziranje)	Dan u tjednu	Propisana doza				
	Ponedjeljak 1. dan	<u>300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>		
	Utorak 2. dan	<u>300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>		
	Srijeda 3. dan	<u>300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>		
	Četvrtak 4. dan	<u>300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>		
	Petak 5. dan	<u>300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>		
	Subota 6. dan	<u>300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>		
	Nedjelja 7. dan	<u>300 mg</u>	<u>1 x 300 mg</u>		<u>Htz.</u>	

Dan u tjednu	Propisana doza	1. - 2. tjedan Početak: 12.09.2016.	3. - 4. tjedan Početak: 26.09.2016.	5. - 6. tjedan Početak: 10.10.2016.	7. - 8. tjedan Početak: 24.10.2016.
Ponedjeljak 8. dan	300 mg	1 x 300 mg			
Utorak 9. dan	300 mg	1 x 300 mg			
Srijeda 10. dan	300 mg	1 x 300 mg			
Četvrtak 11. dan	300 mg	1 x 300 mg			
Petak 12. dan	300 mg	1 x 300 mg			
Sубота 13. dan	300 mg	1 x 300 mg			
Nedjelja 14. dan	300 mg	1 x 300 mg			

Dostupne doze	Napomene bolesnika i/ili bolesnikovog njegovatelja (nuspojave, druge terapije ili važne informacije)
100 mg =  	Ponećanje doze nakon 8 tjedana liječenja dozom od 200 mg na dan

Uz ovaj vodič treba pročitati i uputu o lijeku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED mobilnu aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

sanofi

 Caprelsa™
vandetanib