

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Matrifen 12 mikrograma/h transdermalni flaster
Matrifen 25 mikrograma/h transdermalni flaster
Matrifen 50 mikrograma/h transdermalni flaster
Matrifen 75 mikrograma/h transdermalni flaster
Matrifen 100 mikrograma/h transdermalni flaster

fentanil

Važne informacije koje trebate znati o Matrifen transdermalnim flasterima

- Ovi flasteri sadrže jaki analgetik (lijek protiv boli)
- Prije primjene novog flastera, budite sigurni da ste uklonili stari
- Flasteri se ne smiju rezati
- Nemojte izlagati flastere izvoru topline (kao npr. termoforima)
- Ako dobijete temperaturu odmah obavijestite svog liječnika
- Pažljivo se držite uputa o doziranju i flaster mijenjajte isključivo svaka 3 dana (72 sata)
- Ako počnete plitko i slabo disati uklonite flaster i potražite medicinsku pomoć

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama (ili Vašem djetetu). Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Matrifen i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Matrifen?
3. Kako primjenjivati Matrifen?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Matrifen?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Matrifen i za što se koristi?

Naziv Vašeg lijeka je Matrifen.

Flasteri pomažu ublažiti vrlo jaku i dugotrajnu bol:

- kod odraslih kojima je potrebno neprekidno liječenje boli
- kod djece starije od 2 godine koja već koriste opioidne lijekove i kojoj je potrebno neprekidno liječenje boli

Matrifen sadrži lijek koji se zove fentanil. On pripada skupini jakih analgetika koji se zovu opioidi.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Matrifen?

Nemojte primjenjivati Matrifen

- ako ste alergični na fentanil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

- ako bol koju osjećate traje kratko, poput iznenadne boli ili boli poslije operacije
- ako teško dišete, uz spore ili plitke udisaje i izdisaje

Nemojte primijeniti ovaj lijek ako se bilo što od navedenoga odnosi na Vas ili Vaše dijete. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Matrifen.

Upozorenja i mjere opreza

- Matrifen može izazvati po život opasne nuspojave kod osoba koje već redovito ne uzimaju propisane im opioidne lijekove.
- Matrifen je lijek koji može biti po život opasan za djecu, čak i ako su se flasteri već koristili. Imajte na umu da ljepljiv flaster (upotrijebljen ili neupotrijebljen) može biti primamljiv za djecu, a ako se zalijepi za djetetovu kožu ili ga dijete stavi u usta, posljedice mogu biti smrtonosne.

Prijenos flastera na drugu osobu

Flaster se smije zalijepiti samo na kožu osobe kojoj je propisan. Prijavljeni su slučajevi slučajnog prijenosa flastera na člana obitelji tijekom bliskog fizičkog kontakta ili spavanja u istom krevetu s osobom koja nosi flaster. Ako se flaster slučajno zalijepi na kožu druge osobe (osobito djeteta), može se dogoditi da lijek u flasteru prođe kroz kožu te druge osobe i uzrokuje ozbiljne nuspojave, kao što je otežano disanje uz spore ili plitke udisaje i izdisaje, koje može biti smrtonosno. Ako se flaster zalijepi za kožu druge osobe, odmah ga skinite i potražite liječničku pomoć.

Budite posebno oprezni s lijekom Matrifen

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite ovaj lijek ako se bilo što od navedenoga odnosi na Vas – liječnik će Vas možda morati pažljivije kontrolirati:

- ako ste ikada imali tegobe s plućima ili disanjem
- ako ste ikada imali tegoba sa srcem, jetrom, bubrezima ili niskim krvnim tlakom
- ako ste ikada imali moždani tumor
- ako ste ikada imali dugotrajne glavobolje ili ozljedu glave
- ako ste starije dobi – možete biti osjetljiviji na učinke ovog lijeka
- ako imate bolest koja se zove „miastenija gravis“, kod koje mišići slabe i lako se umaraju
- ako ste ikada zlorabili ili bili ovisni o alkoholu, lijekovima koji se izdaju na recept ili ilegalnim drogama

Ako se bilo što od navedenoga odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Matrifen.

Nuspojave i Matrifen

- Matrifen može izazvati neuobičajenu omamljenost te sporije ili pliće disanje. Vrlo rijetko te dišne tegobe mogu biti opasne po život ili čak imati smrtni ishod, osobito kod ljudi koji prije nisu uzimali jake opioidne lijekove protiv bolova (poput lijeka Matrifen ili morfina). Ako Vi, Vaš partner ili njegovatelj primijetite da je osoba koja nosi flaster neuobičajeno omamljena i da diše sporo ili plitko:

- skinite flaster
- odmah pozovite liječnika ili se uputite u najbližu bolnicu
- pobrinite se da se osoba što više kreće i govori

- Ako tijekom primjene lijeka Matrifen dobijete vrućicu, obavijestite o tome svog liječnika – to može povećati količinu lijeka koja prolazi kroz kožu

- Matrifen može izazvati zatvor, pa upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet o tome kako spriječiti ili ublažiti zatvor.

- Ponavljana, dugotrajna primjena flastera može smanjiti djelotvornost lijeka (postajete „tolerantni“ na njegove učinke) ili uzrokovati ovisnost o lijeku.

Pogledajte dio 4. za cjeloviti popis mogućih nuspojava.

Kada nosite flaster, nemojte ga izlagati izravnim izvorima topline kao što su jastučići za zagrijavanje,

električni pokrivači, termofori, zagrijani vodeni kreveti te lampe za grijanje ili sunčanje. Izbjegavajte sunčanje, dugotrajne tople kupke, saune ili vruće hidromasažne kade jer u protivnom se može povećati količina lijeka koja se otpušta iz flastera.

Drugi lijekovi i Matrifen

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koje ste kupili bez recepta i biljne lijekove. Također biste trebali obavijestiti svog ljekarnika da koristite lijek Matrifen ako kupujete bilo koje lijekove u ljekarni.

Vaš će liječnik znati koje je lijekove sigurno uzimati s lijekom Matrifen. Možda će Vas biti potrebno pažljivo nadzirati ako uzimate neke vrste lijekova navedenih u nastavku ili ako prestanete uzimati neke vrste lijekova navedene u nastavku, jer mogu utjecati na jačinu lijeka Matrifen koja Vam je potrebna.

Osobito obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate:

- druge lijekove za bol, kao što su drugi opioidni lijekovi protiv boli (npr. buprenorfin, nalbufin ili pentazocin)
- lijekove koji Vam pomažu zaspati (npr. temazepam, zaleplon ili zolpidem)
- lijekove koji Vam pomažu da se smirite (trankvilizatore, kao što su alprazolam, klonazepam, diazepam, hidroksizin ili lorazepam) i lijekove za psihička stanja (antipsihotike, kao što su aripiprazol, haloperidol, olanzapin, risperidon ili fenotiazini)
- lijekove za opuštanje mišića (npr. ciklobenzaprin ili diazepam)
- neke lijekove koji se koriste za liječenje depresije, a zovu se SSRI (selektivni inhibitori ponovnog unosa serotonina) ili SNRI (inhibitori ponovnog unosa serotonina i noradrenalina) (npr. citalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin ili venlafaksin)
 - pogledajte detaljnije informacije u nastavku
- neke lijekove koji se koriste za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti i zovu se MAO inhibitori (npr. izokarboksazid, fenelzin, selegilin ili tranilcipromin). Ne smijete uzimati Matrifen unutar 14 dana nakon završetka liječenja ovim lijekovima – pogledajte detaljnije informacije u nastavku
- neke lijekove protiv alergija (antihistaminike), posebice one koji Vas uspavljaju (npr. klorfeniramin, klemastin, ciproheptadin, difenhidramin ili hidroksizin)
- neke antibiotike koji se koriste za liječenje infekcije (npr. eritromicin ili klaritromicin)
- lijekove koji se koriste za liječenje gljivične infekcije (npr. itrakonazol, flukonazol ili vorikonazol)
- lijekove koji se koriste za liječenje HIV infekcije (npr. ritonavir)
- lijekove koji se koriste za liječenje nepravilnih otkucaja srca (npr. amiodaron, diltiazem ili verapamil)
- lijekove koji se koriste za liječenje tuberkuloze (npr. rifampicin)
- neke lijekove koji se koriste za liječenje epilepsije (npr. karbamazepin, fenobarbital ili fenitoin)
- neke lijekove koji se koriste za liječenje mučnine ili bolesti vožnje (npr. fenotiazine)
- neke lijekove koji se koriste za liječenje žgaravice ili želučanog vrieda (npr. cimetidin)
- neke lijekove koji se koriste za liječenje angine (bol u prsnom košu) ili visokog krvnog tlaka (npr. nikardipin).
- neke lijekove koji se koriste za liječenje raka krvi (npr. idelalisib).

Matrifen i antidepresivi

Rizik od nuspojava povećava se ako uzimate lijekove kao što su određeni antidepresivi. Matrifen može imati djelovati na te lijekove i može doći do promjena psihičkog stanja kao što su uznemirenost, halucinacije (kada vidite, osjećate, čujete ili možete namirisati stvari koje nisu prisutne) i drugih učinaka poput promjena krvnog tlaka, ubrzanog rada srca, povišene tjelesne temperature, pojačanih refleksa, nedostatka koordinacije, ukočenosti mišića, mučnine, povraćanja i proljeva.

Operacije

Obavijestite svog liječnika ili stomatologa da uzimate Matrifen ako mislite da ćete primiti anesteziju.

Matrifen i alkohol

Nemojte piti alkohol dok primjenjujete Matrifen ako o tome prethodno niste razgovarali sa svojim liječnikom.

Matrifen može izazvati omamljenost ili usporiti disanje. Uzimanje alkohola može pogoršati te učinke.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Matrifen se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće ako o tome prethodno niste razgovarali sa svojim liječnikom.

Matrifen se ne smije primjenjivati tijekom poroda jer ovaj lijek može utjecati na disanje novorođenčeta.

Nemojte primjenjivati Matrifen ako dojite. Ne smijete dojiti 3 dana nakon uklanjanja Matrifen flastera. To je zbog toga što lijek može proći u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Matrifen može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada s alatima jer može izazvati pospanost ili omaglicu. Ako se to dogodi, nemojte voziti ni raditi s alatima ili strojevima. Nemojte voziti tijekom korištenja ovog lijeka, dok ne znate kako on utječe na Vas.

Ako niste sigurni je li za Vas sigurno voziti dok primjenjujete ovaj lijek, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

3. Kako primjenjivati Matrifen

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš će liječnik odlučiti koja jačina lijeka Matrifen je najprikladnija za Vas, uzimajući u obzir jačinu boli, Vaše opće stanje i dosadašnju vrstu liječenja boli.

Upotreba i mijenjanje flastera

- U svakom pojedinom flasteru ima dovoljno lijeka za **3 dana (72 sata)**.
- Morate promijeniti flaster svaki treći dan, osim ako Vam liječnik nije rekao drugačije.
- Uvijek uklonite stari flaster **prije** nego primijenite novi.
- Flaster uvijek promijenite **u isto doba dana**, svaka 3 dana (72 sata).
- Ako primjenjujete više od jednog flastera, sve flastere promijenite u isto vrijeme.
- Zabilježite dan, datum i vrijeme kada ste stavili flaster, kako biste se podsjetili kada ga morate promijeniti
- Sljedeća tablica pokazuje kada morate promijeniti flaster:

Zalijepite flaster u		Zamijenite flaster u
Ponedjeljak	➡	Četvrtak
Utorak	➡	Petak
Srijedu	➡	Subotu
Četvrtak	➡	Nedjelju
Petak	➡	Ponedjeljak
Subotu	➡	Utorak
Nedjelju	➡	Srijedu

Na koje mjesto treba primijeniti flaster **Odrasli**

- stavite flaster na ravnu površinu na trupu ili nadlaktici (ne preko zgloba)

Djeca

- uvijek stavite flaster na gornji dio leđa kako bi ga Vaše dijete teško doseglo ili skinulo
- provjeravajte češće je li flaster i dalje prilijepljen na kožu
- važno je da dijete ne ukloni flaster i da ga ne stavi u usta jer to može biti opasno po život ili čak smrtonosno
- pomno nadzirite svoje dijete tijekom 48 sati:
 - nakon što se primijeni prvi flaster
 - nakon što se primijeni flaster s većom dozom lijeka
- možda će biti potrebno neko vrijeme da flasteri postignu puni učinak. Stoga će Vaše dijete možda trebati uzimati dodatne lijekove protiv boli dok flasteri ne počnu djelovati. Liječnik će razgovarati s Vama o tome.

Odrasli i djeca:

Nemojte primijeniti flaster:

- dvaput za redom na isto mjesto
- na područja koja se često pokreću (zglobove), na kojima je koža nadražena ili ima posjekotina
- na kožu koja je jako dlakava. Ako ima dlaka, nemojte ih brijati (brijanje iritira kožu). Umjesto toga, podšišajte dlake što bliže površini kože.


Kako staviti flaster

1. korak: Priprema kože

- Uvjerite se da je koža potpuno suha, čista i hladna prije nego stavite flaster
- Ako trebate očistiti kožu, koristite samo hladnu vodu
- Ne koristite sapun ili drugo sredstvo za čišćenje, kreme, ovlaživače, ulja ili puder prije primjene flastera
- Nemojte stavljati flaster odmah nakon vruće kupke ili tuširanja

2. korak: Otvorite vrećicu

- Svaki flaster zatvoren je u posebnoj vrećici
- Otrgnite ili odrežite vrećicu na mjestu zarezata duž ruba, na koji pokazuje strelica
- Nježno otrgnite ili odrežite rub vrećice do kraja (ako koristite škare, odrežite blizu zapečaćenog ruba vrećice da ne oštetite flaster)



- Uхватite obje strane otvorene vrećice i razdvojite ih
- Izvadite flaster i odmah ga primijenite
- Čuvajte praznu vrećicu do odlaganja iskorištenog flastera
- Svaki flaster koristite samo jedanput
- Nemojte vaditi flaster iz vrećice sve dok niste spremni za njegovu primjenu
- Provjerite da flaster nije oštećen
- Nemojte koristiti flaster ako je raspolavljen, zarezan ili se čini da je oštećen
- Nikada nemojte raspolavljati ili rezati flaster

3. korak: Odljepite i pritisnite

- Pobrinite se da flaster bude pokriven širokom odjećom i nemojte ga pokrivati tijesnim ili elastičnim trakama
- Pažljivo odljepite prvu polovicu sjajne plastične zaštitne folije sa sredine flastera. Pokušajte ne dodirnuti ljepljivu stranu flastera
- Pritisnite ljepljivi dio flastera na kožu
- Uklonite drugu polovicu zaštitne folije i dlanom pritisnite cijeli flaster na kožu
- Držite pritisnutim najmanje 30 sekundi. Provjerite da dobro priliježe, posebno uz rubove

4. korak: Odlaganje flastera

- Odmah nakon što skinete flaster, presavinite ga čvrsto popola tako da ljepljive strane naliježu jedna na drugu
- Vratite ga u pripadajuću originalnu vrećicu i odložite sukladno uputama koje ste dobili od ljekarnika
- Čuvajte upotrijebljene flastere izvan pogleda i dohvata djece - čak i upotrijebljeni flasteri sadrže izvjesnu količinu lijeka koji bi mogao naštetiti djeci, pa čak uzrokovati smrt

5. korak: Pranje

- Nakon rukovanja flasterima uvijek operite ruke samo čistom vodom

Više informacija o uporabi lijeka Matrifen

Svakodnevne aktivnosti tijekom korištenja flastera

- Flasteri su vodootporni
- Možete se tuširati ili kupati dok nosite flaster, ali nemojte izravno trljati flaster
- Ako je Vaš liječnik suglasan, možete vježbati ili se baviti sportom dok nosite flaster
- Možete i plivati dok nosite flaster, ali:
 - nemojte koristiti vruće hidromasažne kade
 - nemojte stavljati tijesnu ili elastičnu traku preko flastera
- Dok nosite flaster, nemojte ga izlagati izravnim izvorima topline kao što su jastučići za zagrijavanje, električni pokrivači, termofori, zagrijani vodeni kreveti, lampe za grijanje ili sunčanje. Nemojte se sunčati, dugo se kupati u vrućoj vodi ni odlaziti u saunu. U protivnom možete povećati količinu lijeka koja se otpušta iz flastera.

Koliko brzo djeluju flasteri?

- Možda će trebati neko vrijeme prije nego prvi flaster postigne maksimalan učinak
- Liječnik će Vam možda propisati dodatne lijekove protiv boli za prvi dan
- Nakon toga, flaster bi trebao kontinuirano ublažavati bol, tako da možete prestati uzimati druge lijekove protiv boli. Međutim, liječnik Vam i dalje može povremeno propisati dodatne lijekove protiv boli.

Koliko dugo ćete primjenjivati flastere?

- Matrifen flasteri namijenjeni su za liječenje dugotrajne boli. Liječnik će Vam moći reći koliko dugo se očekuje da ćete primjenjivati flastere.

Ako se bol pogorša

- Ako se bol pogorša tijekom primjene ovih flastera, Vaš liječnik može pokušati s primjenom veće jačine flastera ili Vam dati dodatne lijekove protiv boli (ili oboje).
- Ako povećanje jačine flastera ne pomogne, liječnik može odlučiti da prestanete primjenjivati flastere.

Ako primijenite previše flastera ili pogrešnu jačinu flastera

Ako ste zalijepili previše flastera ili pogrešnu jačinu flastera, skinite flastere i odmah se javite liječniku.

Znakovi predoziranja uključuju otežano ili plitko disanje, umor, iznimnu pospanost, nemogućnost jasnog mišljenja, hodanja ili normalnog govora te osjećaj nesvjestice, omaglice ili smetenosti.

Ako ste zaboravili promijeniti flaster

- Ako zaboravite, promijenite flaster čim se sjetite i zabilježite dan i sat. Promijenite flaster ponovno nakon **3 dana (72 sata)**, kao i obično.
- Ako jako kasnite s promjenom flastera, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom jer će Vam možda biti potrebni dodatni lijekovi protiv boli, ali **nemojte** primijeniti dodatni flaster.

Ako se flaster odlijepi

- Ako se flaster odlijepi prije nego što ga treba promijeniti, stavite odmah novi i zabilježite dan i sat. Iskoristite novo područje kože na:
- gornjem dijelu tijela ili nadlaktici
- gornjem dijelu leđa Vašeg djeteta
- Obavijestite svog liječnika da se to dogodilo i ostavite flaster još **3 dana (72 sata)**, ili onoliko dugo koliko Vam kaže liječnik, prije uobičajene zamjene novim flasterom

Ako se flaster nastavi odljepljivati, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako želite prestati primjenjivati flastere

- Obratite se svom liječniku prije nego što prestanete primjenjivati ove flastere
- Ako ste ih koristili neko vrijeme, Vaše se tijelo možda naviklo na njih. Ako iznenadno prestanete primjenjivati flastere, možete se osjećati loše

Ako prestanete primjenjivati flastere, nemojte ih početi ponovno primjenjivati, a da se najprije ne posavjetujete sa svojim liječnikom. Kod ponovnog početka primjene možda ćete trebati drugu jačinu flastera. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako Vi, Vaš partner ili njegovatelj primijetite kod osobe koja nosi flaster bilo što od sljedećeg, skinite flaster i odmah pozovite liječnika ili se uputite u najbližu bolnicu. Možda će biti potrebno hitno liječenje.

- neuobičajenu omamljenost, sporije ili pliće disanje nego što se očekuje. Slijedite gore navedene savjete i pobrinite se da se osoba koja nosi flaster što više kreće i govori. Vrlo rijetko ove poteškoće disanja mogu biti opasne po život, pa čak i smrtonosne, pogotovo kod osoba koje prije nisu koristile jake opioidne lijekove protiv boli (kao što su Matrifen ili morfin). (manje često, može se javiti u manje od 1 na 100 osoba)
- iznenadno oticanje lica ili grla, teška nadraženost, crvenilo ili pojava mjehurića na koži. To mogu biti znakovi teške alergijske reakcije. (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)
- napadaje. (manje često, može se javiti u manje od 1 na 100 osoba)
- sniženu razinu svijesti ili gubitak svijesti. (manje često, može se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

Prijavljene su i sljedeće nuspojave:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- mučnina, povraćanje, zatvor
- pospanost
- omaglica
- glavobolja

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- alergijska reakcija
- gubitak teka
- poteškoće sa spavanjem
- depresija
- tjeskoba ili smetenost

- halucinacije (kada vidite, osjećate, čujete ili možete namirisati stvari kojih nema)
- nevoljno drhtanje ili grčenje mišića
- neuobičajeni osjeti po koži, kao što su trnci ili mravinjanje (parestezija)
- osjećaj da se sve vrti oko Vas (vrtoglavica)
- ubrzani ili neravnomjerni otkucaji srca (palpitacije, tahikardija)
- visok krvni tlak
- nedostatak zraka (dispneja)
- proljev
- suha usta
- bolovi u trbuhu ili probavne tegobe
- prekomjerno znojenje
- svrbež, osip ili crvenilo kože
- nemogućnost mokrenja ili nepotpuno pražnjenje mjehura
- izrazit umor, slabost ili opće loše osjećanje
- osjećaj hladnoće
- oticanje šaka, gležnjeva ili stopala (periferni edem)

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- osjećaj uznemirenosti ili dezorijentiranosti
- osjećaj iznimne sreće (euforija)
- smanjeni osjeti, pogotovo na koži (hipoestezija) gubitak pamćenja
- zamagljen vid
- usporeni otkucaji srca (bradikardija) ili nizak krvni tlak
- plavičasta boja kože zbog niske razine kisika u krvi (cijanoza)
- zastoj rada crijeva (ileus)
- osip kože praćen svrbežom (ekcem), alergijska reakcija ili drugi kožni poremećaji na mjestu postavljanja flastera
- bolest nalik gripi
- osjećaj promjene temperature tijela
- vrućica
- mišićni trzaji
- poteškoće s postizanjem i održavanjem erekcije (impotencija) ili poteškoće sa spolnim odnosom

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- sužene zjenice (mioza)
- povremen prestanak disanja (apneja)

Možda ćete primijetiti osip, crvenilo ili blagi svrbež kože na mjestu primjene flastera. Ove su nuspojave obično blage i nestaju nakon što uklonite flaster. Ako se to ne dogodi, ili ako flaster jako nadražuje kožu, obavijestite svog liječnika.

Opetovana primjena flastera može smanjiti učinkovitost lijeka (postajete „tolerantni“ na njega) ili uzrokovati ovisnost o lijeku.

Ako prijedete s drugog lijeka protiv boli na Matrifen ili ako naglo prestanete primjenjivati Matrifen, možda ćete primijetiti simptome ustezanja kao što su povraćanje, mučnina, proljev, tjeskoba ili drhtanje. Obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koji od ovih učinaka.

Prijavljeni su slučajevi pojave simptoma ustezanja i kod novorođenčadi, nakon što su njihove majke koristile Matrifen dulje vrijeme tijekom trudnoće.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Matrifen?

Gdje trebate čuvati flastere?

Sve flastere (upotrijebljene i neupotrijebljene) čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Koliko dugo treba čuvati Matrifen?

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i vrećici iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Ako je rok valjanosti flastera istekao, vratite ih u ljekarnu.

Kako zbrinuti upotrijebljene flastere ili flastere koje više ne koristite?

Ako se upotrijebljeni i neupotrijebljeni flaster slučajno zalijepi na drugu osobu, osobito dijete, to može dovesti do smrtnog ishoda.

Upotrebljeni flasteri moraju se čvrsto presavinuti popola i to tako da ljepljiva strana naliježe sama na sebe. Zatim ih treba odložiti na siguran način, tako da ih vratite u originalnu vrećicu i čuvate izvan pogleda i dohvata drugih ljudi, osobito djece, do trajnog sigurnog zbrinjavanja. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Matrifen sadrži?

Djelatna tvar u Matrifen flasterima je fentanil.

Flasteri su dostupni u 5 različitih jačina (vidjeti tablicu).

Ime flastera	Jedan flaster sadrži	Doza u jednom flasteru	Aktivna površina jednog flastera je
Matrifen 12 mikrograma/h transdermalni flaster	1,38 miligrama (mg) fentanila	12 mikrograma fentanila po satu	4,2 cm ²
Matrifen 25 mikrograma/h transdermalni flaster	2,75 miligrama (mg) fentanila	25 mikrograma fentanila po satu	8,4 cm ²
Matrifen 50 mikrograma/h transdermalni flaster	5,50 miligrama (mg) fentanila	50 mikrograma fentanila po satu	16,8 cm ²
Matrifen 75 mikrograma/h transdermalni flaster	8,25 miligrama (mg) fentanila	75 mikrograma fentanila po satu	25,2 cm ²
Matrifen 100 mikrograma/h transdermalni flaster	11,00 miligrama (mg) fentanila	100 mikrograma fentanila po satu	33,6 cm ²

Drugi sastojci su: dipropilenglikol, hidroksipropilceluloza, dimetikon, silikonski adheziv (otporan na amine), etilenvinilacetat (EVA, otpuštajuća membrana), polietilentereftalat (PET, pokrovna folija), poliesterski sloj prevučeni fluoropolimerom (odstranjivi zaštitni film), tinta za označavanje.

Kako Matrifen izgleda i sadržaj pakiranja?

Matrifen je četvrtasti, prozirni flaster na odstranjivoj zaštitnoj foliji. Zaštitna folija je veća od flastera.

Svaki flaster je pakiran u termo-zaštitnu vrećicu od papira, aluminijska i poliakrilonitrilna (PAN).

Na flasterima su naziv i jačina proizvoda otisnuti različitim bojama:

Matrifen 12 mikrograma/h transdermalni flaster: smeđi otisak

Matrifen 25 mikrograma/h transdermalni flaster: crveni otisak

Matrifen 50 mikrograma/h transdermalni flaster: zeleni otisak

Matrifen 75 mikrograma/h transdermalni flaster: svijetloplavi otisak
Matrifen 100 mikrograma/h transdermalni flaster: sivi otisak

Jedno pakiranje sadrži 5 flastera.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. Zadarska 80, Zagreb

Proizvođač:

Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
Danska

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Strasse 8
78224 Singen
Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2018.