

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Peptoran 150 mg filmom obložene tablete ranitidin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Peptoran i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Peptoran?
3. Kako uzimati Peptoran?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Peptoran?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Peptoran i za što se koristi?

Peptoran sadrži djelatnu tvar pod nazivom ranitidin. On pripada skupini lijekova koje nazivamo antagonisti H₂ receptora i djeluje tako da snižava količinu kiseline u želucu.

U odraslih (uključujući i starije osobe) Peptoran se primjenjuje za:

- liječenje čira na želucu ili čira na početnom dijelu crijeva koji se nalazi odmah ispod želuca i u koji se sadržaj želuca prazni (taj dio crijeva nazivamo dvanaesnik)
- liječenje infekcije izazvane bakterijom *Helicobacter pylori*, istodobno s primjenom antibiotika (lijekova za liječenje bakterijskih infekcija)
- liječenje čira na želucu koji je posljedica primjene određenih lijekova
- zaustavljanje krvarenja iz čira
- ublažavanje problema uzrokovanih prisustvom kiseline u jednjaku ili prevelikom količinom kiseline u želucu, što oboje može uzrokovati bol ili nelagodu, poznatu kao „loša probava“, „dispepsija“ ili „žgaravica“
- sprečavanje vraćanja kiseline iz želuka u jednjak dok je bolesnik pod anestezijom tijekom operacije.

U djece (starosti od 3 do 18 godina) Peptoran se primjenjuje za:

- liječenje čira na želucu ili čira na početnom dijelu crijeva koji se nalazi odmah ispod želuca i u koji se sadržaj želuca prazni (taj dio crijeva nazivamo dvanaesnik)
- ublažavanje i liječenje problema uzrokovanih kiselinom u jednjaku ili prevelikom količinom kiseline u želucu, što oboje može uzrokovati bol ili nelagodu, poznatu kao „loša probava“, „dispepsija“ ili „žgaravica“

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Peptoran?

Nemojte uzimati Peptoran:

- ako ste alergični na ranitidin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Peptoran.

Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što počnete uzimati lijek ako:

H A L M E D
25 - 01 - 2019
O D O B R E N O

- imate rak na želucu
- imate problema s bubrežima; u tom slučaju morat ćete uzimati drugačiju dozu ovog lijeka
- ste prije imali čir na želucu, a sada uzimate vrstu lijekova protiv bolova i upale koji se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi
- imate rijetku bolest koja se zove akutna porfirija
- ste stariji od 65 godina a simptomi loše probave su Vam se nedavno pojavili, ili su drugačiji nego prije
- imate bolest pluća
- imate šećernu bolest
- imate problema s imunološkim sustavom.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od prije navedenog na Vas, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Djeca

Ovaj lijek se u određenim indikacijama primjenjuje u djece, starosti od 3 do 18 godina (vidjeti dio 1. Što je Peptoran i za što se koristi?).

Drugi lijekovi i Peptoran

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Peptoran može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova. Isto tako, i ti drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje Peptorana.

Posebno morate reći liječniku ili ljekarniku ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

- nesteroidne protuupalne lijekove – lijekove protiv bolova i upale
- lidokain - lokalni anestetik
- propranolol, prokainamid ili n-acetylprokainamid - za srčane probleme
- diazepam - za tjeskobu
- fenitoin - za epilepsiju
- teofilin - za poteškoće s disanjem (astmu)
- varfarin - za razrjeđivanje krvi
- glipizid - za snižavanje razina šećera u krvi
- atazanavir ili delaviridin - za liječenje infekcije HIV-om
- triazolam - za nesanicu
- gefitinib - za rak pluća
- ketokonazol - lijek protiv gljivica koji se ponekad primjenjuje u liječenju gljivične infekcije vagine (vaginalna kandidijaza)
- sukralfat, za liječenje čira želuca.

Midazolam je lijek koji možete dobiti neposredno prije operacije. Obavijestite liječnika da uzimate Peptoran u slučaju da Vam želi dati midazolam.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od prije navedenog na Vas, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego počnete uzimati Peptoran.

Trudnoća, dojenje i plodost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ranitidin ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Peptoran sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tabletii, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Peptoran?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza u odraslih (uključujući i starije bolesnike):

- ili 150 mg ujutro i 150 mg uvečer
- ili 300 mg prije spavanja.

Budući da točna doza koju ćete uzeti ovisi o stanju Vašeg želuca, liječnik će Vam reći koju dozu trebate uzimati.

Primjena u djece i adolescenata

Djeca od 12 godina i više:

Primjenjuje se doza namijenjena za odrasle.

Djeca teža od 30 kg i u dobi od 3 do 11 godina:

Liječnik će odrediti točnu dozu na osnovi tjelesne težine djeteta.

Liječenje čira na želucu ili dvanaesniku (tankom crijevu) kod djece:

Uobičajena doza je 2 mg po kilogramu tjelesne težine, dva puta dnevno tijekom četiri tjedna. Ta se doza može povećati na 4 mg po kilogramu, dva puta dnevno. Lijek treba uzimati s razmakom od 12 sati. Trajanje liječenja može se prodlužiti na 8 tjedana.

Liječenje žgaravice uzrokovane viškom kiseline kod djece:

Uobičajena doza je 2,5 mg po kilogramu tjelesne težine, dva puta dnevno tijekom dva tjedna. Ta se doza može povećati na 5 mg po kilogramu tjelesne težine, dva puta dnevno. Lijek treba uzimati s razmakom od 12 sati.

Način primjene

- Lijek se primjenjuje kroz usta.
- Svaku tabletu treba progutati cijelu s čašom vode.

Ako uzmete više lijeka Peptoran nego što ste trebali

Peptoran obično nije štetan ako se uzme u dozi većoj od potrebne, osim ako niste uzeli previše tableta odjednom. Ako ste Vi, odnosno netko drugi tko uzima lijek, uzeli preveliku dozu, **odmah se morate javiti na odjel hitne pomoći najbliže bolnice**. Ponesite pakiranje lijeka ili preostale tablete kako bi liječnik mogao znati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Peptoran

Ako ste zaboravili uzeti lijek, uzmite ga čim se sjetite osim ako već nije vrijeme za sljedeću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Peptoran

Nekoliko dana nakon primjene lijeka trebali biste se osjećati puno bolje. Nemojte prestati uzimati lijek bez prethodnog razgovora s liječnikom ili ljekarnikom jer se u protivnom mogu ponovno javiti bol i nelagoda.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojavit u svakoga.

- **Prestanite uzimati Peptoran i odmah se javite liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava jer ćete možda trebati hitnu liječničku pomoć (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):**
- alergijske reakcije, čiji simptomi mogu uključivati:

H A L M E D
25 - 01 - 2019
O D O B R E N O

- osip, svrbež ili koprivnjaču
- oticanje lica, usana, jezika ili drugih dijelova tijela
- bol u grudima, kratkoću dah, zviždanje u prsima ili teškoće pri disanju
- neobjašnjivu vrućicu i osjećaj slabosti, posebno u stojećem položaju
- problemi s bubrežima, koji mogu uzrokovati bol u leđima, vrućicu, bol pri mokrenju, krv u mokraći i promjene u vrijednostima krvnih pretraga jaka bol u želucu jer to može upućivati na upalu gušterače
- usporeni ili nepravilni puls.

Prilikom sljedećeg posjeta liječniku obavijestite ga ako primijetite sljedeće nuspojave:

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- bol u želucu
- zatvor
- mučnina

Rijetko (mogu se javiti manje od 1 na 1000 osoba)

- kožni osip
- nuspojave koje se mogu otkriti krvnim pretragama: porast kreatinina u krvnom serumu (pretraga funkcije bubrega) i promjene u jetrenoj funkciji

O sljedećim nuspojavama obavijestite svog liječnika **čim je prije moguće**:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

- moguće promjene u koncentracijama određenih tvari u krvi, što može uzrokovati osjećaj neuobičajenog umora, kratkoću dah te veću sklonost infekcijama ili stvaranju modrica
- osjećaj depresije ili zbunjenosti; osjećaj da čujete ili vidite neobjašnjive stvari (halucinacije)
- glavobolja (ponekad jaka)
- osjećaj omaglice ili zamućeni vid
- bol u zglobovima ili mišićima ili njihovo oticanje
- nemogućnost kontrole pokreta
- upala i oticanje malih krvnih žila (vaskulitis), čiji znakovi mogu uključivati osip, oticanje zglobova ili probleme s bubrežima
- oticanje jetre, što može dovesti do mučnine ili povraćanja, gubitka apetita ili općenitog lošeg osjećanja, povišene temperature, svrbeža, vrućice, žute boje kože i očiju ili tamno obojene mokraće
- crvenilo ili točke na koži koje izgledaju kao mete
- neobjašnjivi gubitak kose
- proljev
- impotencija
- osjetljivost i/ili rast dojki
- iscjadak iz dojki
- svjesno doživljavanje otkucaja srca ili ubrzani otkucaji srca.

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- kratak dah.

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Peptoran?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP.

Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Peptoran sadrži?

- Djelatna tvar Peptorana je ranitidin.
Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg ranitidina u obliku ranitidinklorida.
- Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat vrste A, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), talk, lecitin, ksantanska guma.

Kako Peptoran izgleda i sadržaj pakiranja?

Bijele, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete ukošenih rubova.

Peptoran 150 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakiranju od 20 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2019.