

Uputa o lijeku; Informacije za korisnika

Peptoran 75 mg filmom obložene tablete

Ranitidin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 dana

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Peptoran i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Peptoran?
3. Kako uzimati Peptoran?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Peptoran?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Peptoran i za što se koristi?

Peptoran pripada skupini lijekova koji se nazivaju antagonistima H₂-receptora. Antagonisti H₂-receptora smanjuju lučenje želučane kiseline.

Želučana kiselina je potrebna u procesu probave, ali ukoliko se luči prekomjerno može izazvati niz neugodnih simptoma u probavnom traktu poput žgaravice i loše probave.

Peptoran smanjuje prekomjernu kiselost u Vašem želucu, te se stoga koristi za ublažavanje simptoma žgaravice, loše probave, te loše probave uslijed povećane kiselosti u želucu.

Peptoran djelotvorno uklanja navedene simptome u trajanju do 12 sati.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Peptoran?

Nemojte uzimati Peptoran ako:

- ste alergični na djelatnu tvar (ranitidin) ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ste mlađi od 16 godina

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Peptoran:

- ako imate poteškoća s gutanjem
- ako imate bolest koja se zove porfirija (previše pigmenta pod imenom porfirin koji može obezbojiti urin)
- ako nenamjerno gubite tjelesnu težinu

- ako ste u srednjim godinama ili stariji a simptomi loše probave su Vam se nedavno pojavili, ili su drugačiji nego prije
- ako imate neprestane bolove u želucu
- ako imate problema s jetrom i/ili bubrežima
- ako ste zbog bilo kojeg drugog razloga pod redovitim liječničkim nadzorom
- ako ste prije imali čir na želucu
- ako ste starije dobi
- ako imate poteškoća s disanjem
- ako imate problema s imunološkim sustavom.
- ako imate šećernu bolest

Djeca i adolescenti

U djece mlađe od 16 godina ne preporučuje se primjena ovog lijeka.

Drugi lijekovi i Peptoran

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ako ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebno morate reći liječniku ili ljekarniku ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

- lijekovi koji preveniraju zgrušavanje krvi (npr. varfarin)
- lijekovi za liječenje nesanice (npr. triazolam, midazolam)
- lijekovi za snižavanje razina šećera (glukoze) u krvi (npr. glipizid)
- lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol)
- lijekovi za liječenje HIV infekcija (npr. atazanavir ili delaviridin)
- lijekovi za liječenje raka pluća (npr. gefitinib)
- nesteroidni protuupalni lijekovi za bol i upalu (npr. acetilsalicilatna kiselina , ibuprofen). Ovaj savjet je osobito bitan ukoliko se starija osoba.

Peptoran 75 mg s hranom i pićem

Peptoran se može uzimati za vrijeme ili između obroka, jer na njegov učinak ne utječe prisutnost hrane u želucu.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upavljanje vozilima i strojevima

Nema poznatog učinka.

3. Kako uzimati Peptoran?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca starija u dobi od 16 godina i starija:

Kod pojave prvih simptoma progutati odmah 1 tabletu uz čašu vode.

Potraju li simptomi dulje od jednoga sata ili se javе ponovno, uzmite još jednu tabletu.

Preporučena doza

- Tijekom 24 sata ne smijete uzeti više od 2 tablete.
- Ne uzimajte neprekidno dulje od 6 dana.
- Ne uzimajte više tableta od preporučene doze.
- Ne davati djeci mlađoj od 16 godina

Ovaj je lijek namijenjen za primjenu kroz usta.

Ako uzmete više Peptoran 75 mg tableta nego što ste trebali

Pridržavajte se preporučenog doziranja Vašeg lijeka. Iako Peptoran djeluje na vrlo specifičan način i stoga se pri predoziranju ne očekuju nikakvi posebni problemi, obratite se liječniku ako ste uzeli više tableta od preporučene doze.

Ako ste zaboravili uzeti Peptoran

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljeni tabletu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite uzimati ovaj lijek odmah se обратите Vašem liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

- Alergijske reakcije, One su vrlo rijetke, ali mogu uključivati pojavu osipa praćenog svrbežom, oticanje kapaka, lica ili usana (s ili bez kožnog osipa s promjenama iznad razine kože po drugim dijelovima tijela), neobjašnjivu vrućicu, poteškoće s disanjem, omaglicu (osobito prilikom ustajanja) i bol ili stezanje u prsima.
- Pojavu neočekivanih modrica ili krvarenja, bol u grlu, čireve u ustima,vrućicu, ekstremno bljedilo, slabost ili iscrpljenost. Ovo mogu biti znakovi poremećaja krvne slike kao što su anemija, smanjenje broja bijelih krvnih stanica, smanjenje broja krvnih pločica, supresije koštane srži ili smanjenog broja agranulocita (vrsta bijelih krvnih stanica).

Ostale nuspojave koje se mogu pojaviti dok uzimate lijek. Ukoliko ih dobijete obavijestite o tome svog liječnika:

- smetenost, depresija, omamljenost ili halucinacije
- glavobolja, omaglica ili iznenadni spazmatični pokreti
- promjene srčanog ritma
- upala krvnih žila
- akutna upala gušterače (uz jaku bol u trbuhu) i proljev
- bol u trbuhu, zatvor, mučnina
- upala jetre koja može uzrokovati nešto od sljedećeg: mučninu, povraćanje, vrućicu, svrbež, žutilo kože i očiju, tamno obojenje mokraće. To može izazvati promjene nalaza pretraga funkcije jetre
- ispadanje kose, nejasan (zamagljen) vid.
- bolovi u mišićima i zglobovima
- akutna upala bubrega

- povиšena razina kreatinina u plazmi (test funkcije bubrega)
- pojava krvi u urinu ili promjene normalne količine urina
- impotencija
- poremećaj dojki (npr. povećanje dojki u muškaraca, pojava mlječnog iscjetka iz dojke)

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Peptoran?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, iza „Rok valjanosti“, Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Peptoran 75 mg filmom obložene tablete sadrže?

Djelatna tvar je ranitidin.

Svaka Peptoran 75 mg filmom obložena tableta sadrži 75 mg ranitidina (u obliku ranitidinklorida).

Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), talk, lecitin, ksantanska guma.

Kako Peptoran 75 mg filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Peptoran 75 mg filmom obložene tablete su bijele, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete, s urezom s jedne strane i utisnutim natpisom PLIVA s druge strane, promjera 7 mm. Urez nije namijenjen za lomljenje tablete

Peptoran 75 mg tablete dostupne su u pakiranju od po 10 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarnama i u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

Ova uputa je zadnji put revidirana u rujnu 2016.