

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Peptoran MAX 150 mg filmom obložene tablete ranitidin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 dana ili ako se nakon 14 dana znakovi Vaše bolesti potpuno ne povuku ili se ponovno pojave.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Peptoran MAX i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Peptoran MAX?
3. Kako uzimati Peptoran MAX?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Peptoran MAX?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Peptoran MAX i za što se koristi?

Peptoran MAX sadrži djelatnu tvar ranitidin. Ranitidin pripada skupini lijekova koji se nazivaju antagonisti H₂-receptora, a koji smanjuju izlučivanje želučane kiseline.

Želudac normalno izlučuje želučanu kiselinu koja sudjeluje u probavi hrane. Međutim, uslijed različitih uzroka želudac može izlučivati preveliku količinu kiseline, što izaziva žareću bol u predjelu želuca (loša probava, hiperaciditet). Ujedno, kiseli se želučani sadržaj može vraćati u jednjak, što se osjeća kao žgaravica (žareća bol u žličici, iza prsne kosti ili prema vratu).

Peptoran MAX se primjenjuje u odraslih i adolescenata starijih od 16 godina za:

ublažavanje i sprečavanje simptoma žgaravice, loše probave i loše probave uzrokovane prekomjernim lučenjem želučane kiseline.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Peptoran MAX?

Nemojte uzimati Peptoran MAX:

- ako ste alergični na ranitidin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6).
- ako uzimate i druge lijekove za smanjivanje lučenja želučane kiseline, osim ako Vam je liječnik tako propisao
- ako ste mlađi od 16 godina

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Peptoran MAX ako:

H A L M E D
12-09-2016
O D O B R E N O

- ako imate problema s bubrežima i/ili jetrom
- ako imate porfiriju (previše pigmenta koji se zove porfirin koji može promijeniti boju urina)
- ako neplanirano mršavite, a to je povezano s probavnim smetnjama koje osjećate
- ako ste srednjih godina ili stariji i ako su se probavne tegobe radi kojih želite uzimati ovaj lijek pojavile prvi put ili su se nedavno promijenilo
- ako imate perzistirajući (upornu) bol u želucu
- ako ste pod redovitim liječničkim nadzorom
- ako ste stariji od 65 godina
- ako imate problema s disanjem
- ako Vam je imunološki sustav oslabljen
- ako imate šećernu bolest
- ako bolujete od nekih drugih bolesti ili uzimate druge lijekove koje Vam je propisao Vaš liječnik (osobito nesteroidne protuupalne lijekove- za bol i upalu) ili ste sami nabavili bez recepta.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od iznad navedenog na Vas, obratite se liječniku ili ljekarniku prije uzimanja ovog lijeka.

Djeca i adolescenti

U djece mlađe od 16 godeina ne preporučuje se primjena ovog lijeka.

Drugi lijekovi i Peptoran MAX

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta i biljne lijekove. To je iz razloga što Peptoran MAX može utjecati na djelovanje određenih drugih lijekova, kao što i ti drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Peptoran MAX.

Posebno morate reći liječniku ili ljekarniku ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

- nesteroidne protuupalne lijekove za bol i upalu
- lidokain - lokalni anestetik
- propranolol, prokainamid ili n-acetilprokainamid - za srčane probleme
- diazepam - za tjeskobu
- fenitojn - za epilepsiju
- teofilin - za poteškoće s disanjem (astmu)
- varfarin - za razrjeđivanje krvi
- glipizid - za snižavanje razina šećera (glukoze) u krvi
- atazanavir ili delaviridin - za liječenje infekcije HIV-om
- triazolam - za nesanicu
- gefitinib - za rak pluća
- ketokonazol - protugljivični lijek koji se ponekad primjenjuje u liječenju gljivične infekcije vagine (vaginalna kandidija)
- sukralfat (lijek za liječenje čira na želucu) – uzmite ga u vremenskom razmaku od 2 sata nakon ovog lijeka

Midazolam je lijek koji možete dobiti neposredno prije operacije. Obavijestite liječnika da uzimate Peptoran MAX prije operacije u slučaju da Vam želi dati midazolam.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od prije navedenog na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što počnete uzimati Peptoran MAX.

Peptoran MAX s hranom, pićem i alkoholom

Lijek možete uzimati uz hranu ili bez nje. Tijekom liječenja ranitidinom savjetujemo Vam da ne pijete alkohol.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Možete uzimati Peptoran MAX samo iznimno i to samo u osobito nužnim slučajevima po odluci liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Peptoran MAX ne utječe na smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Peptoran MAX ?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.Uzimanje lijeka Peptoran MAX:

- lijek se primjenjuje kroz usta
- svaku tabletu progutajte cijelu s čašom vode.

Odrasli i adolescenti stariji od 16 godina

Progutati jednu tabletu odmah kod pojave prvih simptoma. Tablet treba progutati cijelu, s čašom vode, neovisno o obroku.

Nemojte uzeti više od 2 tablete (300 mg ranitidina) unutar 24 sata.

Djeca mlađa od 16 godina

Ne preporučuje se primjena lijeka u djece mlađe od 16 godina.

Nemojte uzimati lijek dulje od 14 dana.

Ako se znakovi Vaše bolesti ne ublaže nakon 6 dana primjene ovog lijeka, ukoliko se potpuno ne povuku nakon 14 dana liječenja ili se pak ponovno pojave, kontaktirajte svoga liječnika.

Nemojte uzeti više doze od preporučenih.

Ako uzmete više lijeka Peptoran MAX nego što ste trebali

Ako ste Vi, odnosno netko drugi tko uzima lijek, uzeli preveliku dozu, **odmah se morate javiti na odjel hitne pomoći najbliže bolnice**. Ponesite pakiranje lijeka ili preostale tablete kako bi liječnik mogao znati što ste uzeli.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite uzimati Peptoran MAX i odmah se javite liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava jer ćete možda trebati hitnu liječničku pomoć:

- alergijske reakcije, čiji simptomi mogu uključivati:
 - osip, svrbež ili koprivnjaču

- oticanje lica, usana, jezika ili drugih dijelova tijela
- bol u prsim, kratkoću dah, piskanje pri disanju ili poteškoće pri disanju
- neobjašnjivu vrućicu i osjećaj slabosti, posebno u stojećem položaju
- problemi s bubrežima, koji mogu uzrokovati bol u leđima, vrućicu, bol pri mokrenju, krv u mokraći i promjene u vrijednostima krvnih pretraga
- jaka bol u želucu jer to može upućivati na upalu gušterača eusporen ili nepravilni puls.

Ostale nuspojave koje se mogu pojaviti dok uzimate lijek. Ukoliko ih dobijete obavijestite o tome svog liječnika:

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- bol u želucu
- zatvor
- mučnina

Rijetko (mogu se javiti manje od 1 na 1000 osoba)

- kožni osip
- nuspojave koje se mogu otkriti krvnim pretragama: porast kreatinina u krvnom serumu (pretraga funkcije bubrega) i promjene u jetrenoj funkciji

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

- moguće promjene u razini određenih tvari u krvi, što može uzrokovati osjećaj neuobičajenog umora, kratkoću dah te veću sklonost infekcijama ili stvaranju modrica
- osjećaj depresije ili zbuđenosti; osjećaj da čujete ili vidite neobjašnjive stvari (haluzinacije)
- glavobolja (ponekad jaka)
- osjećaj omaglice ili zamućeni vid
- bol u zglobovima ili mišićima ili njihovo oticanje, nemogućnost kontrole pokreta
- upala i oticanje malih krvnih žila (vaskulitis), čiji znakovi mogu uključivati osip, oticanje zglobova ili probleme s bubrežima
- oticanje jetre, što može dovesti do mučnine ili povraćanja, gubitka apetita ili općenitog lošeg osjećanja, povišene temperature, svrbeža, vrućice, žute boje kože i očiju ili tamno obojene mokraće
- crvenilo ili točke na koži koje izgledaju kao mete
- neobjašnjivi gubitak kose
- proljev
- impotencija
- osjetljivost i/ili povećanje dojki
- iscijedak iz dojki
- svjesno doživljavanje otkucanja srca ili ubrzani otkuci srca.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- kratkoća dah

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Peptoran MAX?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Peptoran MAX sadrži?

- Djelatna tvar je ranitidin.
Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg ranitidina u obliku ranitidinklorida.
- Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, natrijev skroboglikolat, vrste A, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, poli(vinilni alkohol), hidrolizirani, titanijev dioksid (E171), talk, lecitin, ksantanska guma.

Kako Peptoran MAX izgleda i sadržaj pakiranja?

Bijele, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete ukošenih rubova, promjera 10 mm.

Peptoran MAX 150 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakiranju od 10 tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2016.