

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Carbomed 150 mg tablete za oralnu suspenziju

aktivirani ugljen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4-7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Carbomed tablete i za što se koriste?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Carbomed tablete?
3. Kako uzimati Carbomed tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Carbomed tablete?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Carbomed tablete i za što se koriste?

Djelatna tvar u Carbomed tabletama je aktivirani medicinski ugljen. Pripada skupini lijekova koji se zovu crijevni adsorbensi. Aktivirani medicinski ugljen djeluje tako što na svoju površinu privlači i zadržava plinove u probavnom sustavu te otrovne tvari koje stvaraju uzročnici proljeva. Na taj način pomaže se njihovo odstranjenje iz organizma.

Carbomed tablete koriste se u liječenju proljeva i nadutosti.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4-7 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Carbomed tablete?

Nemojte uzimati Carbomed tablete

- ako ste alergični na aktivirani ugljen ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Carbomed tablete.

Tijekom primjene suspenzije Carbomed tableta potrebno je paziti da ne dođe do udisanja čestica aktiviranog ugljena. Osoba kojoj dajemo ovaj lijek mora biti pri svijesti.

Dugotrajno liječenje aktiviranim medicinskim ugljenom može izazvati probavne poremećaje zbog vezanja enzima i vitamina iz hrane.

Carbomed boji stolicu u crno što je medicinski beznačajno.

Prisutnost aktiviranog ugljena u probavnom sustavu može ometati eventualnu potrebu za hitnom pretragom probavnog sustava (endoskopijom) te otežati otkrivanje parazita u stolici pa u slučaju sumnje na parazitima uzrokovan proljev valja prije liječenja aktiviranim medicinskim ugljenom pregledati stolicu.

U slučaju akutne dizenterije s krvavom stolicom i povišenom temperaturom primjerenije je umjesto aktiviranoga medicinskog ugljena primijeniti odgovarajući antibiotik.

Djeca

Davanje ovog lijeka djeci mlađoj od 3 godine se ne preporučuje zbog toga što nije pouzdano siguran u primjeni.

Drugi lijekovi i Carbomed tablete

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Aktivirani medicinski ugljen smanjuje učinak većine istodobno oralno primijenjenih lijekova. Uzrok je tomu njihovo vezanje na čestice ugljena. Zbog toga, pri istodobnoj primjeni, trebate paziti da razmak između njihova uzimanja bude najmanje dva sata.

Ženama koje primjenjuju oralne kontraceptive preporučuje se primjena drugih oblika kontracepcije za vrijeme uzimanja Carbomed tableta.

Istodobna primjena sorbitola i aktiviranoga medicinskog ugljena može dovesti do dehidracije.

Carbomed tablete s hranom i pićem

Mlijeko, sladoled i slični proizvodi smanjuju djelovanje aktiviranoga medicinskog ugljena.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

U trudnoća i dojlja nisu zabilježeni problemi vezani uz primjenu aktiviranoga medicinskog ugljena. Medicinski ugljen se ne resorbira iz probavnog trakta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Carbomed tablete sadrže saharozu i laktoza hidrat

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Carbomed tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tablete treba razmrviti i razmutiti u čaši (200 ml) vode ili čaja i dobivenu suspenziju popiti. Lijek se ne smije koristiti s mlijekom.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Preporučena doza je 4-7 tableta razmućenih u vodi ili čaju, 3-4 puta na dan nakon jela.

Djeca od 3-12 godina

Preporučena doza je 2-4 tablete razmućene u vodi ili čaju, 1-2 puta na dan nakon jela.

Ne preporučuje se davanje Carbomed tableta djeci mlađoj od 3 godine.

Trajanje liječenja

Aktivirani medicinski ugljen u slučaju proljeva treba uzimati tako dugo dok se stolica ne normalizira, ali najdulje 4 dana.

U slučaju nadutosti može se uzimati do 7 dana.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4-7 dana.

Ako uzmete više Carbomed tableta nego što ste trebali

S obzirom na način djelovanja aktiviranoga medicinskog ugljena, nema opasnosti od predoziranja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Aktivirani medicinski ugljen boji stolicu u crno.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- zatvor.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

- povraćanje, bol u trbuhu;
- smanjena razina kalija u krvi (hipokalemija), povećana kiselost krvi (acidoza);
- udisanje čestica ugljena (aspiracija), otežano disanje, poremećaj disanja sa zatajenjem;
- blagi nadražaj kože i/ili sluznice, alergijska reakcija.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- stvaranje bezoara (nakupina neprobavljenih tvari u probavnom sustavu), začepljenje crijeva (zastoj prolaska crijevnog sadržaja), puknuće crijeva.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Carbomed tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju, na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Carbomed tablete sadrže?

Djelatna tvar je aktivirani ugljen. 1 tableta sadrži 150 mg aktiviranog ugljena.

Pomoćne tvari su: karmelozanatrij; magnezijev stearat; laktoza hidrat; saharoza.

Kako Carbomed tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Tablete za oralnu suspenziju.

Carbomed 150 mg tablete za oralnu suspenziju su crne tablete jednoličnog oblika, veličine i boje, promjera $10,5 \pm 0,5$ mm.

Dostupne su u pakiranjima od 30 tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN–GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2016.