

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Naftifinklorid JGL 10 mg/ml otopina za kožu naftifinklorid

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, pogledajte dio 4.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je Naftifinklorid JGL i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Naftifinklorid JGL?
3. Kako primjenjivati Naftifinklorid JGL?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Naftifinklorid JGL?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što je Naftifinklorid JGL i za što se koristi?**

Naftifinklorid JGL otopina za kožu namijenjena je za liječenje gljivičnih infekcija na koži, a sadrži djelatnu tvar naftifinklorid. Naftifinklorid JGL otopina za kožu učinkovito djeluje na kožne gljivice, kvasnice, plijesni i druge gljivice. Također djeluje na različite bakterije koje su često prisutne kod gljivičnih infekcija.

Naftifinklorid JGL otopina za kožu koristi se za liječenje:

- gljivičnih infekcija kože stopala, pogotovo kože između prstiju i na tabanima (praćene crvenilom, ljuštenjem i oteklinom ili pojavom svrbeža i mjehurića).

#### **2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Naftifinklorid JGL?**

##### **Nemojte primjenjivati Naftifinklorid JGL:**

- ako ste alergični na naftifinklorid, propilenglikol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

##### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Naftifinklorid JGL.

Kod prvih znakova nuspojava, javite se svom liječniku.

Naftifinklorid JGL otopina za kožu je namijenjena samo za primjenu na površini kože i ne smije doći u doticaj s očima. Ako Vam otopina slučajno dođe u doticaj s očima, temeljito ih isperite mlazom vode.

Otopinu nemojte nanositi na ozlijeđenu kožu, jer alkohol koji sadrži može izazvati bolno pečenje.

Ako su simptomi i dalje prisutni, ili ako liječenje nije uspješno kako se očekivalo, posavjetujte se s liječnikom.

### **Drugi lijekovi i Naftifinklorid JGL**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Pri pravilnoj primjeni lijeka tijekom trudnoće ili dojenja ne očekuju se štetni učinci na plod ili dojenče. Međutim, kao mjera opreza, njegova primjena se ne preporučuje tijekom trudnoće i dojenja.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Ne očekuje se utjecaj Naftifinklorid JGL otopine za kožu na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

### **Naftifinklorid JGL sadrži propilenglikol**

Propilenglikol može nadražiti kožu.

## **3. Kako primjenjivati Naftifinklorid JGL?**

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Naftifinklorid JGL otopinu za kožu treba nanijeti jedanput na dan na očišćeni i pažljivo osušeni bolesni dio kože i okolnu površinu. Otopinu možete nanijeti na kožu izravno iz bočice ili koristiti jastučice vate natopljene otopinom.

### **Primjena u djece i adolescenata**

Sigurnost i djelotvornost Naftifinklorid JGL otopine nije ispitana u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

### **Način primjene**

Pažljivo slijedite navedene upute:

- očistite i osušite oboljele dijelove kože i okolna područja te operite ruke
- na oboljelo i okolno područje kože nanosite dovoljno otopine da bi bilo potpuno vlažno
- nakon nanošenja otopine dobro operite ruke kako ne biste proširili infekciju na sebi i na druge.

Naftifinklorid JGL otopina za kožu ne smije se razrjeđivati ili miješati s drugim pripravcima za primjenu na koži.

### **Trajanje liječenja**

Kod liječenja kožnih gljivičnih infekcija, važno je nastaviti liječenje najmanje 2 tjedna nakon nestanka svih znakova bolesti, čak i slučaju brzog poboljšanja simptoma (svrbeža, žarenja i sl.) kako bi se održao dugotrajni učinak liječenja.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 4 tjedna primjene lijeka obavezno se obratite liječniku.

Pažljivo se pridržavajte sljedećih preporuka za što brže izlječenje gljivičnih infekcija (medicinski izraz: mikoze):

1. Mikroorganizmi odgovorni za pojavu gljivičnih infekcija mogu prijanjati za odjeću koja je u doticaju s oboljelim kožom, zbog čega je treba svakodnevno mijenjati.

2. Zdrava i prije svega suha površina kože najbolja je zaštita od gljivičnih infekcija. Zbog toga, treba izbjegavati tijesnu odjeću koja sprječava cirkulaciju zraka (npr. čarape od sintetičkog materijala u tijesnoj obući). Nakon pranja pažljivo osušite područje oboljele kože. Krpice za pranje i ručnike mijenjajte svakodnevno.

3. Ako imate gljivičnu infekciju na stopalima, ne hodajte bosu u prostorima koje dijelite s drugim osobama. To će spriječiti dalje širenje mikroorganizama, a nadasve ponovnu pojavu infekcije.

4. Ne posjećujte saune ili javne kupelji prije nego što izliječite gljivičnu infekciju.

#### **Ako primijenite više Naftifinklorid JGL otopine nego što ste trebali**

Ne očekuje se štetan utjecaj prevelike količine lijeka primijenjene na kožu. Kod slučajnog gutanja lijeka potražite liječničku pomoć jer može biti potrebno odgovarajuće liječenje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

#### **4.      **Moguće nuspojave****

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U pojedinačnim slučajevima može se pojaviti lokalna nadraženost kože kao što su osjećaj suhoće, crvenilo i žarenje. Ipak, to je rijetko razlog za prekid liječenja. Ove nuspojave nestaju nakon završetka liječenja.

#### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

#### **5.      **Kako čuvati Naftifinklorid JGL?****

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza kratice EXP.

#### **Napomena o roku valjanosti nakon otvaranja**

Nakon prvog otvaranja bočice, rok valjanosti lijeka je 2 mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Naftifinklorid JGL sadrži?**

Djelatna tvar je naftifinklorid.

1 ml otopine za kožu sadrži 10 mg naftifinklorida.

Pomoćne tvari: etanol 96%-tni; voda, pročišćena; propilenglikol.

1 ml otopine za kožu sadrži 50 mg propilenglikola.

### **Kako Naftifinklorid JGL izgleda i sadržaj pakiranja?**

Bistra, bezbojna do blijedožuta otopina za kožu.

20 ml otopine za kožu u smeđoj staklenoj bočici s polietilenskim (HDPE) zatvaračem i polietilenskim (LDPE) nastavkom za kapanje, u kutiji.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2017.**