

UPUTA O LIJEKU**LAMISIL 250 mg tablete**
*terbinafinum***ŠTO TREBATE ZNATI O LAMISIL TABLETAMA (terbinafin)**

Molimo da pažljivo pročitate ovu uputu o lijeku prije nego počnete uzimati ovaj lijek, iako ste LAMISIL tablete već uzimali. Ako imate dodatnih pitanja ili niste sigurni u vaše liječenje, molimo da se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

ZAŠTO VAŠ LIJEČNIK ŽELI DA KORISTITE LAMISIL TABLETE?

Lamisil se koristi za liječenje bolesnika s gljivičnim infekcijama kože i noktiju. On napada i ubija gljivu koja uzrokuje vašu infekciju.

PRIJE UZIMANJA VAŠEG LIJEKA

Prije nego započnete uzimati Lamisil tablete, obavijestite svog liječnika ako imate potvrdni odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja:

- Sumnjate li da ste imali alergijsku reakciju ili vam je bilo loše na bilo koji sastojak Lamisila (navedeni u odjeljku "ŠTO SADRŽI VAŠ LIJEK")?
- Imate li problema s jetrom ili ste imali bilo koju bolest koja je mogla utjecati na vašu jetru?
- Imate li psorijazu?
- Imate li problema s bubrežima?
- Jeste li trudni ili planirate zatrudniti? Ako zatrudnite tijekom uzimanja Lamisila, o tome obavijestite svog liječnika.
- Dojite li?
- Uzimate li bilo koji drugi lijek (kupljen bez recepta ili dobiven na recept)?


Neki lijekovi mogu utjecati na vaše liječenje, stoga tu informaciju svakako provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji drugi lijek. Obvezno obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

- rifampicin
- cimetidin
- oralni kontraceptivi (budući da se u nekih bolesnica mogu javiti nepravilni ciklusi i iznenadna krvarenja)
- antidepresivi
- beta-blokatori.

Lamisil se ne preporučuje za djecu.


UZIMANJE VAŠEG LIJEKA

Vaš će liječnik odrediti točnu dozu Lamisila i reći koliko dugo trebate uzimati vaš lijek. Točno slijedite upute vašeg liječnika i nikad nemojte sami mijenjati dozu. Obratite se vašem liječniku ili ljekarniku ako niste sigurni koliko lijeka trebate uzeti ili kada ga trebate uzeti.



Uobičajena doza iznosi 250 mg na dan. Za kožne infekcije Lamisil se uglavnom uzima od 2 do 6 tjedana. Za infekcije noktiju liječenje uglavnom traje od 6 tjedana do 3 mjeseca, iako neke bolesnike s infekcijama noktiju noge može biti potrebno liječiti 6 mjeseci ili dulje.

Izvadite tabletu iz blistera, kao što je prikazano na slici.



Progutajte vašu tabletu cijelu s čašom vode. Ako zaboravite uzeti vašu tabletu, uzmite ju čim se sjetite, ili pričekajte da dođe vrijeme za vašu sljedeću dozu. Zatim nastavite kao i prije.

PREDOZIRANJE

Ako slučajno uzmete previše lijeka, odmah obavijestite vašeg liječnika ili otidite u najbližu bolnicu.

NAKON UZIMANJA VAŠEG LIJEKA

Kao i ostali lijekovi, i Lamisil tablete mogu u nekih ljudi ponekad izazvati nuspojave. One su obično blage do umjerene i mogu nestati nakon nekog vremena.

Najčešće nuspojave su:

Glavobolja

Slabi apetit ili blaga mučnina

Probavne smetnje

Blagi bolovi u trbuhu ili osjećaj nadutosti

Proljev

Svrbež, osip ili oteklina

Bolovi u mišićima i zglobovima, što se može javiti kao dio reakcije preosjetljivosti (alergije) zajedno s alergijskim kožnim reakcijama (osip, oteklina).

Manje česte nuspojave, zabilježene kod jedne u 100 do jedne u 1.000 osoba, uključuju:

Gubitak okusa i poremećaj okusa (što se obično povuče nakon prekida liječenja). Vrlo mali broj bolesnika je prijavio produljeni poremećaj okusa. Kao rezultat, u vrlo malom broju teških slučajeva, smanjenje količine pojedene hrane dovelo je do značajnog gubitka tjelesne težine.

Rijetke nuspojave, zabilježene kod jedne u 1.000 do jedne u 10.000 osoba, uključuju:

Osjećaj slabosti, umora ili omaglice

Utrnulost ili osjećaj trnaca.

Ako primijetite bilo koji od sljedećih rijetkih simptoma prestanite uzimati vaš lijek i odmah se obratite vašem liječniku:

Žutilo kože ili očiju (to može ukazivati na probleme s jetrom)

Teški kožni osip (oteklina, plikovi ili urtike).

Vrlo rijetke nuspojave, zabilježene kod manje od jedne u 10.000 osoba, uključuju:

Smanjenje broja nekih krvnih stanica


Depresija i tjeskoba

Pogoršanje simptoma psorijaze

Vrtoglavica

Nastanak ili pogoršanje stanja zvanog lupus (dugotrajna bolest sa simptomima koji uključuju kožni osip i bolove u mišićima i zglobovima).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.



ČUVANJE VAŠEG LIJEKA

Rok valjanosti: lijek nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakovanju. Tablete čuvajte u blisterima. Izvadite ih samo kad je vrijeme za uzimanje vašeg lijeka.

Tablete čuvajte na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Lijek čuvajte na sigurnom mjestu izvan dohvata djece. Vaš im lijek može škoditi.

Ukoliko vaš liječnik odluči prekinuti liječenje, vratite sav neiskorišteni lijek u ljekarnu. Zadržite ga samo ako vam to kaže liječnik.

ŠTO SADRŽI VAŠ LIJEK

Naziv vašeg lijeka je Lamisil. Lamisil pripada skupini lijekova koji se zovu antimikotici. Koristi se za liječenje raznih gljivičnih infekcija kože i noktiju.

Djelatna tvar u Lamisilu je terbinafin. Jedna tableta sadržava 250 mg terbinafina (u obliku terbinafinklorida).

Tablete također sadrže sljedeće pomoćne tvari: magnezijev stearat, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, hipromeloza, natrijev škroboglikolat i celuloza, mikrokristalična.

Lamisil tablete su dostupne u pakovanjima s po 14 tableta. One su bjelkaste do žućkasto-bijele, okrugle, bikonveksne tablete s kosim rubovima, s urezom na jednoj i kružno utisnutim "Lamisil 250 mg" na drugoj strani.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Novartis Hrvatska d.o.o.

Iblerov trg 9

10 000 Zagreb

Proizvođač

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd

Wimblehurst Road, Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velika Britanija

Datum revizije upute

Studeni, 2007.

OSTALE INFORMACIJE

Zapamtite: Ovaj lijek je propisan samo vama. Samo vam ga liječnik može propisati. Nikada ga nemojte davati nikom drugom. Drugim osobama lijek može štetiti, iako imaju simptome jednake vašima.

Ako imate dodatnih pitanja o lijeku ili u nešto niste sigurni, molimo da se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

