

## UPUTA O LIJEKU

### AZOPT 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija brinzolamid

**Pažljivo pročitajte uputu** prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

- **Uputu sačuvajte.** Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Budete li imali pitanja, pitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika.
  - Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Lijek može naškoditi drugoj osobi čak i ako ima simptome jednake Vašima.
  - Ako primijetite bilo koju nuspojavu potreбno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

#### U ovoj uputi

- 1 Sto je AZOPT i za što se koristi
- 2 Prije nego počnete uzimati AZOPT
- 3 Kako uzimati AZOPT
- 4 Moguće nuspojave
- 5 Kako čuvati AZOPT
- 6 Ostale informacije

#### 1. ŠTO JE AZOPT I ZA ŠTO SE KORISTI

**AZOPT sadrži brinzolamid koji pripada skupini lijekova** koja se naziva inhibitori karboanhidraze. On smanjuje tlak u oku.

**AZOPT kapi za oko se koriste za liječenje povišenog očnog tlaka.** Povišeni tlak u oku može dovesti do bolesti koja se naziva **glaukom**.

Ukoliko je tlak u oku previše visok, može dovesti do oštećenja vida.

#### 2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI AZOPT

##### Ne koristite AZOPT

- **ukoliko imate teže probleme sa bubrežima**
- **ukoliko ste alergični** na bilo koji sastojak lijeka. Za cijeloviti popis sastojaka molimo pogledajte dio 6.
- **ukoliko ste alergični na lijekove koje nazivamo sulfonamidi.** Primjerice lijekove za liječenje dijabetesa i infekcija kao i diuretike (tablete protiv viška vode u tijelu). AZOPT može uzrokovati istu alergiju.
- **ukoliko imate previsoku kiselost krvi** (stanje nazvano hiperkloremična acidoza)

Ukoliko imate dodatnih pitanja, potražite savjet liječnika.

##### Budite posebno pažljivi prilikom primjene lijeka AZOPT

##### Potražite savjet svog liječnika

- **ukoliko imate problema s jetrom.**
- **ukoliko imate suhe oči ili probleme s rožnicom**
- **ukoliko uzimate druge lijekove na bazi sulfonamida**

AZOPT kapi za oko ne smiju koristiti osobe mlađe od 18 godina osim ukoliko je to preporučio Vaš liječnik.

## **Primjena drugih lijekova**

Molimo da kažete liječniku ili ljekarniku ako uzimate, ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključivši one nabavljene bez recepta.

Ukoliko istovremeno uzimate neki drugi inhibitor karboanhidraze (acetazolamid ili dorzolamid, pogledajte dio 1. ŠTO JE AZOPT I ZA ŠTO SE KORISTI), posavjetujte se sa liječnikom.

## **Trudnoća i dojenje**

**Nemojte koristiti AZOPT ukoliko ste trudni ili postoji mogućnost da zatrudnите.** Posavjetujte se s liječnikom prije nego uzmete lijek.

**Ukoliko dojite,** potražite savjet liječnika.

Potražite savjet liječnika ili ljekarnika prije primjene bilo kojeg lijeka.

## **Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima**

**Nemojte upravljati vozilima ni strojevima** sve dok Vam se vid ne razbistri. Može se dogoditi da Vam se vid zamuti na neko vrijeme odmah nakon primjene AZOPT kapi.

AZOPT može umanjiti sposobnost starijih osoba da obavljaju zadaće koje zahtijevaju duševnu pribranost i/ili tjelesnu koordinaciju. Dogodi li Vam se to, budite oprezni pri upravljanju vozilima i strojevima.

## **Važne informacije o nekim od sastojaka AZOPT kapi**

**Ukoliko nosite meke kontaktne leće.** AZOPT sadrži benzalkonijev klorid koji može uzrokovati iritacije oka i promijeniti boju mekih kontaktnih leća. Treba izbjegavati dodir sa mekim kontaktnim lećama. Kontaktne leće treba izvaditi prije ukapavanja lijeka AZOPT, i pričekati najmanje 15 minuta nakon ukapavanja doze lijeka prije njihovog ponovnog vraćanja.

## **3. KAKO UZIMATI AZOPT**

Pridržavajte se uvijek uputa o primjeni AZOPTA koje Vam je dao Vaš liječnik. **U slučaju bilo kakvih nejasnoća u vezi s primjenom lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.**

**Uobičajeno doziranje je jedna kap u oboljelo oko ili oči dva puta na dan,** odnosno ujutro i navečer.

Pridržavajte se ovih uputa ukoliko Vaš liječnik nije odredio drugačije.

Lijek primijenite u oba oka samo ukoliko Vam je to savjetovao liječnik. Uzimajte lijek onoliko dugo koliko Vam je to odredio Vaš liječnik.


AZOPT kapi primjenjujte **samo** za oči.

Okrenite stranicu za dodatne informacije.


### 3. KAKO UZIMATI AZOPT (nastavak)



1



2



3

Koliko kapi primjeniti  
(vidjeti stranicu 1)

- Uzmite bočicu lijeka AZOPT i ogledalo.
- Dobro operite ruke.
- Dobro protresite bočicu i otvorite poklopac.
- Bočicu držite okrenuto naopako, između palca i srednjeg prsta
- Zabacite glavu prema natrag. Donju vjeđu lagano povucite prema dolje s čistim prstom, tako da nastane spojnični džep između očne jabučice i donje vjeđe (slika 1). Tu se nanosi kap (slika 1).
- Vrh kapaljke približite oku. Ukoliko Vam pomaže, koristite ogledalo.
- **Izbjegavajte dodir kapaljke s okom ili vjeđom, okolnim područjima oka ili drugim površinama.** Može doći do inficiranja kapi.
- Laganim pritiskom kažiprsta na dno okrenute boćice istisnite po jednu kapljicu lijeka AZOPT
- **Ne tiskajte bočicu** - napravljena je tako da je dovoljan samo lagani pritisak na njeno dno (slika 2)
- Nakon ukapanja, pritisnite prstom kut oka blizu nosa (slika 3). Tako ćete sprječiti da AZOPT prijeđe u ostatak tijela.
- Ako primjenjujete kapljice na oba oka, ponovite ove korake na drugom oku.
- Bočicu dobro zatvorite kapicom nakon primjene.
- Prije nego otvorite novu bočicu, do kraja iskoristite prvu.

**Ako kap promaši oko**, pokušajte ponovno.

**Ako ste ukapali previše** isperite oko s topлом vodom. Ponovno ukapajte tek kad bude vrijeme za sljedeću redovnu dozu.

**Ako ste zaboravili ukapati** AZOPT, ukapajte jednu kap čim se sjetite i nastavite sa uobičajenom rutinom primjene. Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ukoliko ste prekinuli primjenu AZOPT kapi bez dogovora sa Vašim liječnikom, očni tlak neće biti pod kontrolom što može dovesti do gubitka vida.

**Ako istovremeno koristite druge lijekove za oči**, pričekajte najmanje 5 minuta između primjene AZOPT kapi i ostalih kapi za oko.

### 4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i ostali lijekovi, i AZOPT može izazvati nuspojave, premda se one ne moraju javiti u svakoga.

Obično možete nastaviti s primjenom kapi, osim ako nuspojava nije ozbiljna.

## **Česte nuspojave**

(Mogu se javiti u 1 do 10 bolesnika na 100)

**Nuspojave na oku:** zamućenje vida, iritacija oka, bol u oku, iscijedak iz oka, osjećaj probadanja u oku, suho oko, neprirodan osjećaj u oku, crvenilo oka, svrbež vjeđa, crvenilo ili oticanje.

**Opće nuspojave:** loš okus u ustima, glavobolja, suhoća usta.

## **Manje česte nuspojave**

(Mogu se javiti u 1 do 10 bolesnika na 1000)

**Nuspojave na oku:** povišeni tlak u oku, oštećenje očnog živca, neprirodan, dvostruki ili smanjeni vid, osjetljivost na svjetlo, upala ili infekcija konjunktive, alergija oka, otečenost oka, poremećaj rožnice, upala žljezda na vjeđama, smanjena osjetljivost oka, depoziti na površini oka, pojačana pigmentacija oka, umorne oči, krustanje vjeđa ili pojačana produkcija suza.

**Opće nuspojave:** smanjen ili nepravilan broj otkucanja srca, smanjena srčana funkcija, lutanje srca, bol u prsima, astma, otežano disanje, kratak dah, smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, povećanje klorida u krvi, omaglica, pospanost, problemi sa pamćenjem, depresija, problemi sa spavanjem, nervozna, osjetljivost, umor, opća slabost, neprirodan osjećaj, bol, drhtavica, zvonjava u ušima, smanjeni seksualni nagon, spolna disfunkcija kod muškaraca, simptomi prehlade, kongestija prsnog koša, kašalj, upala sinusa, iritacija grla, neprirodna ili smanjena osjetljivost u ustima, upala sluznice jednjaka, bol u abdomenu, mučnina, povraćanje, smetnje u želucu, povećana aktivnost crijeva, dijareja, plinovi u crijevima, probavni poremećaj, bol u bubrežima, bol u mišićima, grčevi u mišićima, bol u leđima, krvarenje iz nosa, suhoća nosa, curenje iz nosa, začepljenost nosa, kihanje, osip, neprirodan osjećaj na koži, svrbež, gubitak kose.

Dodatno zabilježene nuspojave uključuju:

**Nuspojave na oku:** nepravilnost vjeđa, smanjen rast ili broj trepavica

**Opće nuspojave:** pojačani simptomi alergije, povećani krvni tlak, povećan broj otkucanja srca, patološki nalaz funkcije jetre, učestalo mokrenje, oticanje udova, smanjena osjetljivost, smanjena okusna osjetljivost, bol u zglobovima, bol u udovima, crvenilo kože, upala ili svrbež.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

## **5. KAKO ČUVATI AZOPT**

**Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece.**

**Ne koristite AZOPT nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na bočici i kutiji. Navedeni datum odnosi se na zadnji dan u mjesecu.**

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne mjere čuvanja.

**Kapi za oko ne smiju se koristiti dulje od 4 tjedna nakon prvog otvaranja.**

Na crtici ispod i na naljepnici bočice i kutije zapišite datum kada ste otvorili bočicu.

Otvoreno: \_\_\_\_\_

Lijekove nemojte odlagati u kanalizaciju ili kućni otpad. Potražite savjet ljekarnika kako odložiti lijek koji Vam više nije potreban. Ove mjere pomažu očuvanju okoliša.

## **6. OSTALE INFORMACIJE**

**Što sadrži AZOPT**

H A L M E D  
18<sup>4</sup> 07 - 2011  
O D O B R E N O

**Djelatna tvar** je brinzolamid 10 mg/ml.

**Ostali sastojci su:** benzalkonijev klorid, karbomer 974P, dinatrijev edetat, manitol (E421), pročišćena voda, natrijev klorid, tiloksapol.

Lijeku se dodaju manje količine kloridne kiseline i/ili natrijevog hidroksida za održavanje normalne kiselosti (vrijednosti pH).

**Kako izgleda AZOPT i sadržaj pakovanja**

**AZOPT** je mlijeko bijela tekućina (suspenzija), dostupna na tržištu u 5 ml plastičnoj bočici-kapaljki (droptainer) s navojnom kapicom.

**Nositelj odobrenja** je ALCON FARMACEUTIKA d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, Zagreb.

**Proizvođač** je SA ALCON-COUPREUR NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija ili ALCON CUSI, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Španjolska.

Način i mjesto izdavanja lijeka: Lijek se izdaje na recept, u ljekarnama.

Datum revizije upute: Srpanj, 2011.

H A L M E D  
18<sup>5</sup> 07 - 2011  
O D O B R E N O