

UPUTA O LIJEKU

ESCONTRAL 0,5 mg/ml oralna otopina *desloratadin*

Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek propisan je Vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadrži:

1. Što je ESCONTRAL oralna otopina i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti ESCONTRAL oralnu otopinu
3. Kako koristiti ESCONTRAL oralnu otopinu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati ESCONTRAL oralnu otopinu
6. Dodatne informacije

1. Što je ESCONTRAL oralna otopina i za što se koristi

ESCONTRAL oralna otopina je lijek protiv alergije koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i njezinih simptoma.

ESCONTRAL oralna otopina ublažava simptome alergijskog rinitisa (na primjer, kod peludne groznice i alergije na grinje) kao što su kihanje, curenje nosa, svrbež nosa ili nepca te svrbež, crvenilo i suzenje očiju.

Također se koristi za ublažavanje simptoma povezanih s urtikarijom (promjene na koži uslijed alergije), kao što su svrbež i koprivnjača.

Simptomi su ublaženi tijekom čitavog dana, što pomaže u nastavku normalnog života.

2. Prije nego počnete uzimati ESCONTRAL oralnu otopinu

Nemojte uzimati ESCONTRAL oralnu otopinu

- ako ste alergični na desloratadin, na bilo koji od ostalih sastojaka lijeka ili na loratadin.

ESCONTRAL oralna otopina namijenjena je liječenju djece u dobi od 1 – 11 godina starosti, adolescenata (12 godina starosti i stariji) i odraslih, uključujući i starije osobe.

Budite posebno oprezni s ESCONTRAL oralnom otopinom

- ako imate oslabljenu funkciju bubrega.

Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na vas ili niste sigurni odnosi li se na vas, javite se svom liječniku.

Uzimanje drugih lijekova s ESCONTRAL oralnom otopinom

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove, pa i one lijekove koje vam nije propisao liječnik.

Interakcije ESCONTRAL oralne otopine s drugim lijekovima nisu poznate.

Uzimanje hrane i pića s ESCONTRAL oralnom otopinom

ESCONTRAL oralna otopina se može uzeti uz obrok ili na prazan želudac.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, ne preporučuje se uzimanje ESCONTRAL oralne otopine.

Upitajte vašeg liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kakvog lijeka za vrijeme trudnoće ili dojenja.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Ako se uzme u preporučenoj dozi, ESCONTRAL oralna otopina ne bi trebala izazvati pospanost ili smanjenje budnosti, niti utjecati na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima ili strojevima. Međutim, vrlo rijetko neke osobe mogu osjetiti pospanost, koja može utjecati na njihovu koncentraciju.

Važne informacije o nekim sastojcima ESCONTRAL oralne otopine

ESCONTRAL oralna otopina sadrži sorbitol. Ako vam je liječnik rekao da ne podnosite neke vrste šećera, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati ESCONTRAL oralnu otopinu

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute. Provjerite s vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

*Ne zaboravite koristiti lijek. Liječnik će vas uputiti koliko dugo trebate koristiti **ESCONTRAL oralnu otopinu**.*

Djeca od 1-5 godina

2,5 ml (1/2 žličice od 5 ml) otopine jedanput dnevno.

Djeca od 6-11 godina

5 ml (1 žličica od 5 ml) otopine jedanput dnevno.

Odrasli i adolescenti (djeca starija od 12 godina)

10 ml (2 žličice od 5 ml) otopine jedanput dnevno.

Progutajte dozu oralne otopine, zatim popijte malo vode.

ESCONTRAL oralna otopina može se popiti uz obrok ili na prazan želudac.

Liječnik će odlučiti od kojeg oblika alergijskog rinitisa bolujete i ovisno o tome odrediti duljinu liječenja ESCONTRAL oralnom otopinom.

Ukoliko bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni kroz manje od 4 dana tjedno ili manje od 4 tjedna), vaš liječnik će na temelju vaše povijesti bolesti propisati trajanje liječenja.

Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni kroz više od 4 dana u tjednu ili dulje od 4 tjedna), liječnik vam može propisati dugotrajnije liječenje.

Također, duljina liječenja urtikarije (koprivnjače) razlikuje se od bolesnika do bolesnika, stoga morate slijediti upute vašeg liječnika.

Ako uzmete više ESCONTRAL oralne otopine nego što ste trebali

Uzimajte ESCONTRAL oralnu otopinu samo na način kako vam je propisano. Ne biste trebali imati ozbiljnih problema kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više ESCONTRAL oralne otopine nego vam je propisano, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti ESCONTRAL oralnu otopinu

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu!

Primijenite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu. Međutim, ako vam je ostalo nekoliko sati do sljedeće primjene, nemojte primijeniti propuštenu dozu nego pričekajte vrijeme za sljedeću primjenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ESCONTRAL oralne otopine obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi, i ESCONTRAL oralna otopina može izazvati nuspojave.

U većine djece i odraslih, nuspojave su bile usporedive s uzimanjem placeba (pripravak šećera ili neke druge neaktivne tvari). Međutim, česte nuspojave u djece ispod 2 godine su proljev, vrućica i nesanica, dok su u odraslih umor, suha usta i glavobolja zabilježeni češće nego kod uzimanja placeba.

Prestanite koristiti ESCONTRAL oralnu otopinu i odmah se javite liječniku ako primijetite jednu od sljedećih nuspojava:

- Alergijsku reakciju koja može biti izražena kao:
 - o osip, svrbež ili koprivnjača po koži
 - o oticanje lica, usana, jezika ili drugih dijelova tijela
 - o piskanje, otežano disanje.

Ostale moguće nuspojave:

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10000 bolesnika):

- halucinacije
- omaglica
- pospanost
- nesanica
- nemir s pojačanim tjelesnim kretnjama
- epileptički napadaji
- osjećaj lupanja srca
- ubrzano kucanje srca

- bol u trbuhu
- mučnina (loše osjećanje)
- povraćanje
- nadražen želudac
- proljev
- upala jetre te poremećeni rezultati testova jetrene funkcije
- bolovi u mišićima

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati ESCONTRAL oralnu otopinu

Lijek čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece!

Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju!

Lijekovi se ne smiju odbacivati u odvod ili kućno smeće. Pitajte vašeg ljekarnika kako odložiti lijek koji više ne trebate. Ove mjere pridonose zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što ESCONTRAL oralna otopina sadrži

1 ml ESCONTRAL oralne otopine sadrži 0,5 mg desloratadina.

Pomoćne tvari: propilenglikol; citratna kiselina, bezvodna; natrijev citrat; voda, pročišćena; sukraloza (E955); sorbitol, tekući, nekristalizirajući; hipromeloza; aroma tutti frutti, tekuća.

Kako ESCONTRAL oralna otopina izgleda i sadržaj pakovanja

Bistra, bezbojna tekućina.

60 ml otopine u smeđoj staklenoj bočici sa sigurnosnim zatvaračem, s odmjernom žličicom, u kutiji.

120 ml otopine u smeđoj staklenoj bočici sa sigurnosnim zatvaračem, s odmjernom žličicom, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja i proizvođača lijeka

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute

Siječanj 2014.