

UPUTA O LIJEKU

Cefiksim JADRAN 100 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju *cefiksim*

Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek propisan je vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadrži:

1. Što je Cefiksim oralna suspenzija i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Cefiksim oralnu suspenziju
3. Kako uzimati Cefiksim oralnu suspenziju
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Cefiksim oralnu suspenziju
6. Dodatne informacije

1. Što je Cefiksim oralna suspenzija i za što se koristi

Cefiksim je antibiotik koji spada u skupinu cefalosporina, a koristi se za liječenje infekcija.

Cefiksim oralna suspenzija primarno je namijenjena djeci. Bočica sadrži prašak u koji se prije primjene umiješa propisana količina vode. Dobivena suspenzija je okusa jagode.

Cefiksim oralna suspenzija koristi se u liječenju infekcija uzrokovanih bakterijama, poput:

- infekcije uha
- infekcije nosa ili sinusa (sinusitis)
- infekcije grla (tonzilitis, faringitis)
- infekcije dišnog sustava (bronhitis, upala pluća)
- infekcije mokraćnog sustava (upala mjehura, infekcije bubrega).

2. Prije nego počnete koristiti Cefiksim oralnu suspenziju

Nemojte koristiti Cefiksim oralnu suspenziju

- ako ste alergični na cefiksim, na bilo koji sastojak lijeka ili na ostale cefalosporine.

Budite oprezni s primjenom Cefiksim oralne suspenzije

Prije primjene Cefiksim oralne suspenzije obavijestite liječnika o zdravstvenim problemima koje imate ili ste imali ranije, kao i o svim alergijama.

- ukoliko ste alergični na penicilin ili neki drugi antibiotik
- ukoliko imate bolest probavnog sustava, osobito upalne bolesti crijeva (kolitis)
- ukoliko ste bubrežni bolesnik
- ukoliko trebate testirati razinu šećera u urinu.

Uzimanje drugih lijekova s Cefiksim oralnom suspenzijom

Recite svom liječniku ili ljekarniku ukoliko uzimate ili ste uzimali bilo koje druge lijekove. Ovo se odnosi i na one koji su kupljeni bez recepta, kao i na biljne lijekovite pripravke.

Interakcije s drugim lijekovima malo su vjerojatne, ali za vrijeme liječenja ovim antibiotikom može doći do:

- lažno pozitivnih laboratorijskih testova (glukoza u urinu). Cefiksim može utjecati na određivanje glukoze pa se preporuča određivanje glukoze putem testova baziranih na enzimatskoj reakciji glukoza-oksidge ili heksokinaze.
- treba obratiti pozornost pri uzimanju Cefiksim oralne suspenzije i lijekova protiv zgrušavanja krvi.

Prije nego prestanete uzimati bilo koji od lijekova koje inače uzimate, razgovarajte sa svojim liječnikom.

Uzimanje Cefiksim oralne suspenzije uz hranu i piće

Cefiksim oralna suspenzija može se uzimati neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje

Cefiksim oralna suspenzija namijenjena je djeci. Ukoliko vi kao odrasli (radi nekog razloga) uzimate suspenziju i ako ste trudni, mislite da ste trudni ili pokušavate zatrudnjeti, primjena Cefiksim oralne suspenzije se ne preporuča.

Ukoliko dojite, ne preporuča se korištenje Cefiksim oralne suspenzije.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Cefiksim oralna suspenzija ne bi trebala imati utjecaja na vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Važne informacije o nekim pomoćnim tvarima

Ovaj lijek sadrži 2430 mg saharoze u 5 ml pripremljene otopine suspenzije. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Cefiksim oralnu suspenziju

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.

Ne zaboravite uzeti lijek. Liječnik će vas uputiti kako i koliko dugo trebate uzimati Cefiksim oralnu suspenziju. Nemojte prekinuti liječenje prije vremena.

Lijek treba uzimati na usta.

U kutiji se nalazi plastična štrcaljka od 5 ml za doziranje lijeka, koju koristite za određivanje doze lijeka.

Lijek se može dati u jednoj dozi (svaka 24 sata) ili podijeljen u dvije doze (svakih 12 sati).

Ukoliko smatrate da je učinak lijeka nedovoljno jak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom. Nemojte sami mijenjati dozu lijeka.

Lijek je potrebno uzimati propisani broj dana.

Odrasli, stariji i djeca iznad 10 godina (>50 kg tjelesne težine)

10-20 ml dnevno, ovisno o težini infekcije.

Djeca od 5 do 10 godina

10 ml dnevno.

Djeca od 1 do 4 godine

5 ml dnevno.

Djeca od 6 mjeseci do 1 godine

3,75 ml dnevno.

Priprema suspenzije

Cefiksim oralna suspenzija priprema se neposredno prije primjene lijeka.

Prije pripreme, bočicu nekoliko puta treba dobro protresti, dodati 68 ml pročišćene vode (do oznake na bočici), podijeljeno u dva obroka kako bi se dobilo 100 ml suspenzije i dobro promiješati.

Ako uzmete više Cefiksim oralne suspenzije od propisane doze

Ukoliko uzmete više Cefiksim oralne suspenzije nego što biste trebali, obratite se liječniku.

Ako zaboravite uzeti dozu Cefiksim oralne suspenzije

Uzmite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu.

Ukoliko je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu!

Ako prestanete uzimati Cefiksim oralnu suspenziju

Nemojte prekidati liječenje ako imate osjećaj da vam se stanje poboljšalo, jer lijek još možda nije uništio sve uzročnike infekcije i stanje se može ponovno pogoršati.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja, savjetujte se s liječnikom kada prestati koristiti Cefiksim oralnu suspenziju.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi, i Cefiksim oralna suspenzija može dovesti do nuspojava, iako ih ne dobiju svi.

Ukoliko se neka od sljedećih nuspojava dogodi, prestanite uzimati Cefiksim oralnu suspenziju i kontaktirajte svog liječnika ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu jer ćete možda trebati hitnu liječničku pomoć.

Odmah javite svom liječniku ukoliko se jave neke od sljedećih nuspojava:

- alergijska reakcija koja uključuje pojavu osipa, bolova u zglobovima, oticanje lica, jezika i grkljana, što može izazvati velike poteškoće u disanju ili gutanju (angioneurotski edem). Ta reakcija vrlo je rijetka, a može biti opasna. Ukoliko se pojavi, odmah se obratite liječniku.
- krvarenje iz kože oko očiju, usta, nosa i genitalija, simptomi slični gripi i vrućici, što može ukazivati na Steven-Johnsonov sindrom
- intenzivan osip, koji može izazvati ljuštenje velikih površina kože tijela, odnosno toksičnu epidermalnu nekrolizu. Može se javiti osjećaj opće slabosti, vrućice, trnaca.
- osip kože ili kožne lezije s ružičastim/crvenim prstenom i blijedim centrom, koji može svrbiti, biti pokriven ljuskama ili ispunjen tekućinom. Ovakve promjene pripadaju stanju nazvanom multififormni eritem i javljaju se pretežno na dlanovima i stopalima.
- Ukoliko osoba koja uzima ovaj lijek postane sklonija infekcijama, ukoliko se češće no inače jave modrice ili krvarenja, to može biti posljedica promjena u krvnoj slici. Ova pojava se povlači nakon prekida uzimanja Cefiksim oralne suspenzije.

Odmah prekinite uzimanje lijeka ukoliko se tijekom liječenja Cefiksim oralnom suspenzijom javi teži proljev koji je teško zaustaviti. To može biti znak oboljenja nazvanog pseudomembranozni kolitis.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko se kod vas jave neke od sljedećih nuspojava, ako se pogoršavaju ili traju dulje od nekoliko dana:

- osjećaj slabosti – mučnina, povraćanje
- bolovi u trbuhu
- glavobolja
- vrtoglavica
- svrbež u genitalnom području

Također obavijestite svog liječnika ukoliko se kod vas pojavi nuspojava koja nije ovdje navedena.

Krvne pretrage

Cefiksim može uzrokovati gružanje krvi i manje promjene u radu bubrega i jetre. To se može vidjeti iz krvnih pretraga. Ova pojava nije česta te se povlači nakon završetka uzimanja lijeka.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Cefiksim oralnu suspenziju

Cefiksim oralnu suspenziju morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Neotvoreni lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Pripremljenu suspenziju čuvati na temperaturi ispod 25°C i upotrijebiti u roku od 14 dana.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Cefiksim oralna suspenzija sadrži

5 ml pripremljene suspenzije sadrži 100 mg cefiksima u obliku cefiksim trihidrata.

Pomoćne tvari: saharoza; ksantanska guma; natrijev benzoat (E211); silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; aroma jagode (prirodno identična aroma, kukuruzni maltodekstrin, trietilcitrati, propilenglikol).

Kako Cefiksim oralna suspenzija izgleda i sadržaj pakovanja

Skoro bijeli do svjetlo žuti prašak karakterističnog mirisa. Nakon rekonstitucije s vodom daje krem do svjetlo žutu viskoznu suspenziju.

Cefiksim prašak za oralnu suspenziju nalazi se u smeđoj staklenoj bočici s praškom za pripremu 100 ml oralne suspenzije s plastičnim sigurnosnim zatvaračem i plastičnom štrcaljkom od 5 ml za doziranje, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute

Veljača, 2014.