

## UPUTA O LIJEKU

### Cefiksim JADRAN 400 mg filmom obložene tablete cefiksim

*Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti lijek.*

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
- Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek propisan je vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši.

*Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.*

Uputa sadrži:

1. Što su Cefiksim tablete i za što se koriste
2. Prije nego počnete koristiti Cefiksim tablete
3. Kako uzimati Cefiksim tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Cefiksim tablete
6. Dodatne informacije

#### 1. Što su Cefiksim tablete i za što se koriste

Cefiksim je antibiotik koji spada u skupinu cefalosporina, a koristi se za liječenje infekcija.

Cefiksim tablete koriste se u liječenju infekcija uzrokovanih bakterijama, poput:

- infekcija uha
- infekcija nosa ili sinusa (sinusitis)
- infekcija grla (tonzilitis, faringitis)
- infekcija dišnog sustava (bronhitis, upala pluća)
- infekcija mokraćnog sustava (upala mjehura, infekcije bubrega).

#### 2. Prije nego počnete koristiti Cefiksim tablete

##### **Nemojte uzimati Cefiksim tablete**

- ako ste alergični na cefiksim, bilo koji drugi sastojak lijeka ili na ostale cefalosporine.

##### **Budite oprezni s primjenom Cefiksim tableta**

*Prije primjene Cefiksim tableta obavijestite liječnika o zdravstvenim problemima koje imate ili ste imali ranije, kao i o svim alergijama.*

- ukoliko ste alergični na penicilin ili neki drugi antibiotik
- ukoliko imate bolest probavnog sustava, osobito upalne bolesti crijeva (kolitis)
- ukoliko ste bubrežni bolesnik.

##### **Uzimanje drugih lijekova s Cefiksim tabletama**

*Recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove. Ovo se odnosi i na one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne lijekovite pripravke.*

Interakcije (međudjelovanje) s drugim lijekovima malo su vjerojatne, ali za vrijeme liječenja ovim antibiotikom može doći do:

- lažno pozitivnih laboratorijskih testova (šećer u urinu). Cefiksim može utjecati na određivanje šećera pa se preporuča određivanje šećera (glukoze) putem testova baziranih na enzimatskoj reakciji glukoza-oksidade ili heksokinaze.
- pozornost treba obratiti pri uzimanju Cefiksim tableta i lijekova protiv zgrušavanja krvi.

*Prije nego prestanete uzimati bilo koji od lijekova koje inače uzimate, razgovarajte sa svojim liječnikom.*

### **Uzimanje Cefiksim tableta uz hranu i piće**

Cefiksim tablete mogu se uzimati neovisno o obroku.

### **Trudnoća i dojenje**

Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili pokušavate zatrudnjati, ne preporuča se primjena Cefiksim tableta, osim u slučaju da liječnik procjeni da je neophodno.

Ukoliko dojite, ne preporuča se primjena Cefiksim tableta.

### **Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima**

Cefiksim tablete ne bi trebale imati utjecaja na vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

### **3. Kako uzimati Cefiksim tablete**

*Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.*

*Ne zaboravite uzeti lijek. Liječnik će vas uputiti kako i koliko dugo trebate uzimati Cefiksim tablete.*

*Nemojte prekinuti liječenje prije vremena.*

Tabletu treba progutati s tekućinom, neovisno o obroku.

Uobičajena je duljina liječenja 7 dana, a liječenje može biti produljeno do 14 dana, ukoliko to vaše stanje zahtjeva.

*Odrasli i djeca starija od 10 godina (>50 kg tjelesne težine)*

200 - 400 mg (pola do jedna tableta) dnevno, pojedinačno ili podijeljeno u dvije doze (tableta se može lomiti na pola).

Djecu mlađu od 10 godina treba liječiti Cefiksim JADRAN 100 mg/5 ml praškom za oralnu suspenziju.

*Starije osobe i osobe koje imaju problema s bubrezima*

Ukoliko je potrebno, liječnik će vam smanjiti dozu lijeka.

### **Ako uzmete više Cefiksim tableta nego biste trebali**

Uzmete li više Cefiksim tableta nego vam je preporučio liječnik, obratite se svom liječniku. Tablete ponesite sa sobom. U slučaju predoziranja, preporuča se ispiranje želuca.

### **Ako zaboravite uzeti dozu Cefiksim tableta**

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu!

Uzmite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu.

### **Ako prestanete uzimati Cefiksim tablete**

Nemojte prekidati liječenje ako imate osjećaj da vam je bolje, jer lijek još možda nije uništio sve uzročnike infekcije i stanje vam se može pogoršati.

*U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja savjetujte se s liječnikom kada prestati koristiti Cefiksim tablete.*

### **4. Moguće nuspojave**

*Kao i svi ostali lijekovi, i Cefiksim tablete mogu dovesti do nuspojave, iako ih ne dobiju svi.*

*Ukoliko se neka od sljedećih nuspojava dogodi, prestanite uzimati Cefiksim tablete i kontaktirajte svog liječnika ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu jer ćete možda trebati hitnu liječničku pomoć.*

***Odmah javite svom liječniku ukoliko se jave neke od sljedećih nuspojava:***

- alergijska reakcija koja uključuje pojavu osipa, bolova u zglobovima, oticanje lica, jezika i grkljana, što može izazvati velike poteškoće u disanju ili gutanju (angioneurotski edem). Ta reakcija vrlo je rijetka, a može biti opasna. Ukoliko se pojavi, odmah se obratite liječniku.
- krvarenje iz kože oko očiju, usta nosa i genitalija, simptomi slični gripici i vrućici, što može ukazivati na Stevens-Johnsonov sindrom
- intenzivan osip, koji može izazvati ljuštenje velikih površina kože tijela, odnosno toksičnu epidermalnu nekrolizu
- osip kože ili kožne lezije s ružičastim/crvenim prstenom i blijedim centrom, koji može svrbiti, biti pokriven ljuskama ili ispunjen tekućinom. Ovakve promjene pripadaju stanju nazvanom multififormni eritem i javljaju se pretežno na dlanovima i stopalima.
- ukoliko osoba koja uzima ovaj lijek postane sklonija infekcijama, ukoliko se češće no inače jave modrice ili krvarenja, to može biti posljedica promjena u krvnoj slici. Ova pojava se povlači nakon prekida uzimanja Cefiksim tableta.

Odmah prekinite uzimanje lijeka ukoliko se tijekom liječenja Cefiksim tabletama javi teži proljev koji je teško zaustaviti. To može biti znak oboljenja nazvanog pseudomembranozni kolitis.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko se kod vas jave neke od sljedećih nuspojava, ako se pogoršavaju ili traju dulje od nekoliko dana:

- osjećaj slabosti – mučnina, povraćanje
- bolovi u trbuhu
- glavobolja
- vrtoglavica
- svrbež u genitalnom području

Također obavijestite svog liječnika ukoliko se kod vas pojavi nuspojava koja nije ovdje navedena.

*Krvne pretrage*

Cefiksim može uzrokovati gružanje krvi i manje promjene u radu bubrega i jetre. To se može vidjeti iz krvnih pretraga. Ova pojava nije česta te se povlači nakon završetka uzimanja lijeka.

*Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.*

**5. Kako čuvati Cefiksim tablete**

Cefiksim tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

**6. Dodatne informacije**

Što Cefiksim tablete sadrže

1 filmom obložena tableta sadrži 400 mg cefiksima u obliku cefiksim trihidrata.

Pomoćne tvari: celuloza, mikrokristalična; škrob, prethodno geliran; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat; kalcijev hidrogenfosfat, bezvodni; boja Opadry White: hipromeloza (E464), titanijev dioksid (E171), polietilenglikol 400.

Kako Cefiksim tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Bijele do skoro bijele filmom obložene tablete modificiranog pravokutnog oblika s djelomičnim urezom na obje strane.

10 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC//Al ili PVC/Aclar//Al blisteru, u kutiji.

**Naziv i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet**  
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

**Naziv i adresa proizvođača lijeka**  
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

**Način i mjesto izdavanja lijeka**  
Na recept, u ljekarni.

**Datum revizije upute**  
Veljača, 2014.