

UPUTA O LIJEKU

RHINOSTOP tablete

paracetamol, pseudoefedrin, klorfenamin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke.

Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji učinak.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Obavezno kontaktirajte liječnika ako se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 3 do 4 dana.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

1. Što je lijek RHINOSTOP tablete i za šta se koristi

2. Prije nego počnete uzimati RHINOSTOP tablete

3. Kako uzimati RHINOSTOP tablete

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati RHINOSTOP tablete

6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE LIJEK RHINOSTOP tablete I ZA ŠTO SE KORISTI

Lijek RHINOSTOP tablete sadržava tri djelatne tvari; paracetamol, pseudoefedrin i klorfenamin, čije se djelovanje nadopunjuje.

Paracetamol ublažava bolove i snižava povišenu tjelesnu temperaturu.

Pseudoefedrin je nazalni dekongestiv. Djeluje na male krvne žile u sluznici nosa uzrokujući njihovo sužavanje, što ima za posljedicu sprječavanje prekomjernog izlučivanja nosnog sekreta i ublažavanje simptoma upale sluznice nosa i sinusa.

Klorfenamin svojim antihistaminskim djelovanjem umanjuje začepljenošć nosa, ublažava simptome curenja iz nosa, te suzenja i peckanja očiju.

RHINOSTOP tablete se koriste za ublažavanje simptoma prehlade, gripe i alergijskog rinitisa kao što su začepljenošć nosa, pojačana sekrecija iz nosa, šmrkanje, kihanje, crvenilo nosa i očiju, osjećaj peckanja očiju, pojačano suzenje, bol u području sinus-a, glavobolja, osjećaj grebanja u grlu, povišena tjelesna temperatura i sl.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RHINOSTOP tablete

Nemojte primjenjivati RHINOSTOP tablete

- ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak lijeka;

- ako imate povišen krvni tlak;
- ako imate ozbiljno srčano oboljenje (teška koronarna ishemija);
- ako imate izrazito pojačan rad štitne žlijezde;
- ako ste na terapiji s lijekovima koji se primjenjuju u liječenju depresije, a zovu se inhibitori monoaminoksidaze (MAO inhibitori), odnosno, nemojte uzimati lijek RHINOSTOP unutar razdoblja od 14 dana nakon prekida uzimanja MAO inhibitora;
- ako imate aktivni čir sluznice želuca ili dvanaesnika;
- ako ste nedavno preboljeli akutni srčani infarkt;
- ako imate teško oštećenje funkcije jetre;
- ako imate teško oštećenje funkcije bubrega;
- ako ste trudni ili dojite;
- istovremeno s drugim simpatomimetičkim dekongestivima;
- ako imate šećernu bolest;
- ako imate feokromocitom;
- ako imate glaukom zatvorenog kuta;
- ako uzimate beta-blokatore.

Budite posebno oprezni s RHINOSTOP tabletama te se prije primjene ovog lijeka posavjetujte s Vašim liječnikom ako imate:

- srčano oboljenje;
- visok krvni tlak ili uzimate lijekove za snižavanje povišenog krvnog tlaka;
- oboljenje jetre;
- oboljenje bubrega;
- oboljenje štitne žlijezde;
- probleme s mokrenjem uzrokovane povećanjem prostate;
- probleme s disanjem uzrokovane astmom, kroničnim bronhitisom ili emfizemom;
- suženje u probavnom sustavu (piloroduodenalna opstrukcija);
- nedostatak enzima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze;
- anoreksiju nervozu;
- povišen intrakranijalni tlak ili oštećenje mozga.

Oprez je potreban nakon transplantacije jetre, te u oboljelih od HIV infekcije-AIDS, koji se liječe zidovudinom. Rizik oštećenja jetre paracetamolom veći je u osoba koje konzumiraju alkohol. Potrebno je izbjegavati konzumaciju alkohola tijekom primjene Rhinostop tableta.

Poseban oprez je potreban pri određivanju doze u bolesnika starije životne dobi, zbog njihove veće osjetljivosti na lijekove ove vrste.

Ako uzimate ili ste nedavno uzimali ovaj lijek, a trebali biste ići na operaciju, neophodno je da o tome obavijestite svog liječnika ili kirurga.

Ukoliko imate bilo koji od navedenih zdravstvenih problema možda nećete moći primjenjivati ovaj lijek ili će Vam Vaš liječnik preporučiti posebno doziranje.

Uzimanje drugih lijekova s RHINOSTOP tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući lijekove koje ste nabavili bez liječničkog recepta. To se odnosi i na biljne pripravke. RHINOSTOP tablete mogu utjecati na djelovanje drugih lijekova, ali i neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje RHINOSTOP tableta.

Prije primjene RHINOSTOP tableta obratite se Vašem liječniku ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova:

- lijekove za liječenje depresije;
- lijekove za liječenje smetnji disanja (bronhodilatatori);
- lijekove za izmokravanje (diuretici);
- lijekove za liječenje posebnog oblika upale zglobova koja se zove giht;
- lijekove za snižavanje povišenog krvnog tlaka (antihipertenzivne lijekove);
- lijekove u liječenju smetnji debelog crijeva (sindrom iritabilnog kolona);
- lijekove u liječenju smetnji mokraćnog mjeđura ili smetnji s mokrenjem kao što su oksibutinin ili tolterodin;
- antiepileptike;
- izonijazid;
- zidovudin;
- acetilsalicilatnu kiselinu ili salicilate;
- lijekove za srce koji se zovu beta blokatori (atenolol, karteolol, metoprolol, nadolol, penbutolol, propranolol, sotalol, timolol)
- kardiotonične glikozide
- antikoagulanse (varfarin)
 - druge lijekove koji sadrže paracetamol ili oralne dekongestive nosne sluznice.

Uzimanje hrane i pića s RHINOSTOP tabletama

U toku primjene RHINOSTOP tableta potrebno je izbjegići konzumiranje alkohola.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Lijek RHINOSTOP tablete može štetno utjecati na plod, te ga ne bi smjeli uzimati prije nego što se obratite svom liječniku ili ljekarniku za savjet. Ako uzimate RHINOSTOP tablete, a planirate trudnoću ili Vam se trudnoća ustanovi, potrebno je da o tome što prije obavijestite Vašeg liječnika i potražite njegov savjet.

Dojenje

Pojedini sastojci ovog lijeka mogu dospjeti u majčino mljeko, te se na taj način mogu ispoljiti štetni učinci u dojenčeta. Ukoliko ste dojilja i mislite da bi ste trebali primijeniti lijek RHINOSTOP tablete, nemojte to učiniti, a da se prethodno niste posavjetovali s Vašim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lijek može uzrokovati pospanost i tako umanjiti Vaše psihofizičke sposobnosti, zbog čega je potreban poseban oprez pri upravljanju vozilima i/ili strojevima. Ako osjetite

umor i pospanost, nemojte upravljati vozilima ni strojevima.

Ostala upozorenja

RHINOSTOP tablete sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se s Vašim liječnikom.

3. KAKO UZIMATI RHINOSTOP tablete

RHINOSTOP tablete namijenjene su za peroralnu primjenu. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Pri primjeni RHINOSTOP tableta morate se pridržavati sljedećih preporuka za doziranje:

- **Ublažavanje simptoma prehlade, gripe i alergijskog rinitisa**

Odrasli i djeca starija od 12 godina

1 RHINOSTOP tableta svakih 6 sati. Preporučena dnevna doza je do 4 tablete na dan.

Napomena

RHINOSTOP tablete nisu namijenjene za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Doziranje u pacijenata s oštećenom bubrežnom funkcijom

U pacijenata s blago do umjерено oštećenom funkcijom bubrega preporučuje se produžiti interval između pojedinačnih doza na 8 do 12 sati.

Ako uzmete više RHINOSTOP tableta nego što ste trebali

U slučaju predoziranja odmah se obratite svom liječniku ili potražite hitnu medicinsku pomoć, iako se možda osjećate dobro i nema jasnih simptoma predoziranja, zbog mogućeg odgođenog nastupa ozbiljnog oštećenja jetre.

Simptomi predoziranja ovim lijekom se mogu ispoljiti u vidu nemira, nervoze, mučnine, povraćanja, bolova u trbuhi, omaglice, omamljenosti, suhoće usta, osjećaja topline, zujanja u ušima ili grčeva (konvulzije).

Ako ste zaboravili uzeti RHINOSTOP tablete

Ukoliko ste lijek propustili uzeti, uzmite ga što prije je moguće, a nakon toga nastavite s njegovom primjenom na način preporučen u ovoj Uputi. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste preskočili uzeti!

Ako prestanete uzimati RHINOSTOP tablete

Nagli prekid primjene ovog lijeka ne bi trebao imati štetno djelovanje na Vaš organizam.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom RHINOSTOP tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, RHINOSTOP tablete mogu izazvati nuspojave.

Pri uzimanju RHINOSTOP tableta mogu se javiti sljedeće nuspojave (prema djelatnim tvarima lijeka):

Paracetamol. Rijetke nuspojave su mučnina, reakcije preosjetljivosti (osip, koprivnjača, svrbež, crvenilo kože), smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija) i smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukopenija, neutropenija).

Pseudoefedrin. Rijetke nuspojave su ubrzan rad srca i/ili osjećaj lupanja srca (palpitacije), i povišen krvni tlak. Vrlo rijetke su nepravilni srčani otkucaji i usporen rad srca. Ostali simpatomimetički učinci (rijetki ili vrlo rijetki) uključuju: pojačanje simptoma hipertireoze (pojačan rad štitne žlijezde), mišićni tremor (drhtanje) ili slabost, mučnina i povraćanje, bljedilo kože, pojačano znojenje, poremećaj metabolizma šećera i/ili masti, zastoj mokraće i pojačanje tegoba hipertrofije (povećanja) prostate. Učinci na središnji živčani sustav: razdražljivost, tjeskobnost, nemir, uzbudjenost, nesanica, halucinacije i paranoidne deluzije (zablude). Pseudoefedrin može izazvati kožne reakcije (osip) i reakcije preosjetljivosti (moguća je i križna preosjetljivost s drugim simpatomimeticima). Središnji učinci pseudoefedrina nešto su češći u djece i starijih osoba

Klorfenamin. Rijetke nuspojave su sedativno djelovanje, vrtoglavica, inkordinacija pokreta te smanjenje kognitivnih sposobnosti. Klorfenamin može izazvati antimuskarinske učinke: zastoj mokraće, suhoću usta, zamućen vid, poremećaje probavnih organa i otežano disanje. Rijetko, klorfenamin može uzrokovati nizak krvni tlak, ekstrapiramidne poremećaje motorike, omaglicu, smetenost, depresiju, poremećaje spavanja, tremor (drhtanje), grčeve, osjećaj lupanja srca (palpitacije), nepravilan rad srca (aritmije), reakcije preosjetljivosti, poremećaje krvi i disfunkciju jetre.

Prestanite s primjenom RHINOSTOP tableta i odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako primijetite osip na koži ili osjetite otežano disanje, oticanje lica, usana, jezika ili grla.

Uzimanje RHINOSTOP tableta trebate prekinuti i odmah se obratiti Vašem liječniku ako osjetite ili primijetite:

- ubrzan ili nepravilan rad srca;
- smetenost, halucinacije, neobične misli ili ponašanje;
- izraženu omamljenost, tjeskobnost, nemir ili nervozu;
- izrazito povišen krvni tlak;
- otežano mokrenje ili prekid mokrenja;
- lako nastajanje modrica ili krvarenja, neuobičajenu iscrpljenost, groznicu, drhtavicu, bolove;
- taman urin, svijetlu stolicu (boja gline), žutu obojenost kože ili bjeloočnica.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI RHINOSTOP tablete

RHINOSTOP tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece!

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

RHINOSTOP tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što RHINOSTOP tablete sadrže

Jedna RHINOSTOP tableta sadržava:

Paracetamola 251,00 mg

Pseudoefedrinklorida 61,20 mg

Klorfenaminmaleata 2,54 mg

RHINOSTOP tablete sadrže sljedeće pomoćne tvari: lakoza hidrat; kukuruzni škrob; celuloza, mikrokristaličnu; hidroksipropilcelulozu i magnezijev stearat.

Kako lijek RHINOSTOP tablete izgleda i sadržaj pakovanja

RHINOSTOP tableta je bijele boje, okruglog oblika, ravnih, neoštećenih bridova, s utisnutim nazivom "RHINOSTOP" na jednoj strani.

RHINOSTOP tablete su pakirane u PVC/Al blister sa sadržajem 10 tableta, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Bosnalijek d.o.o., Gruška 18, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Jadran – Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Datum revizije upute

Svibanj, 2015.