Part VI Sažetak plana upravljanja rizikom

Sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju (cefepim)

Ovo je sažetak plana upravljanja rizikom (engl. *Risk Management Plan*, RMP) za lijek Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju (cefepim). Plan upravljanja rizikom (RMP) opisuje važne rizike lijeka Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, načine kako se oni mogu minimizirati te kako se mogu prikupiti dodatne informacije o rizicima i informacijama koje nedostaju lijeka Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju.

Sažetak opisa svojstava lijeka Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju i uputa o lijeku pružaju temeljne informacije zdravstvenim radnicima i bolesnicima o tome kako se lijek Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju (cefepim) treba primjenjivati.

Važni novi rizici ili promjene postojećih biti će uključeni putem ažuriranja Plana upravljanja rizikom (RMP) za lijek Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju.

I. Lijek i za što se primjenjuje

Lijek Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju je antibiotik iz skupine cefalosporina i pripada beta-laktamskim antibioticima. Odobren je za liječenje infekcija navedenih u nastavku:

Liječenje odraslih i adolescenta starijih od 12 godina i tjelesne težine >40 kg s bakterijemijom koja je povezana s, ili se sumnja da je povezana s, bilo kojom od navedenih infekcija:

- izvanbolnički stečene infekcije donjih dišnih putova i teška upala pluća,
- komplicirane i nekomplicirane infekcije mokraćnih putova,
- febrilne epizode u bolesnika s neutropenijom. Empirijsko liječenje bolesnika s febrilnom neutropenijom: monoterapija cefepima je indicirana za empirijsko liječenje bolesnika s febrilnom neutropenijom. U bolesnika s visokim rizikom od teške infekcije (npr. bolesnika nakon nedavne transplantacije koštane srži, s niskim krvnim tlakom, s hematološkom malignom bolešću ili teškom ili dugotrajnom neutropenijom), antibiotska monoterapija može biti neprimjerena. Nedostaju podaci o djelotvornosti monoterapije cefepimom u takvih bolesnika.
- infekcije žučnih putova

Djeca u dobi od 2 mjeseca do 12 godina i tjelesne težine ≤ 40 kg:

- febrilne epizode tijekom neutropenije kada je predviđeno trajanje neutropenije kratko. Dostupni klinički podaci za dojenčad i djecu ne dopuštaju preporučivanje monoterapije cefepimom.

Sadrži cefepim kao djelatnu tvar, a daje se intravenozno ili intramuskularno.

II. Rizici povezani s lijekom i aktivnosti za njihovu minimizaciju i/ili daljnju karakterizaciju

Važni rizici lijeka Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju zajedno s mjerama za njihovu minimizaciju i predloženim studijama za daljnju karakterizaciju rizika lijeka Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju opisani su u nastavku.

Mjere za minimizaciju identificiranih rizika lijeka mogu biti:

- Određene informacije poput upozorenja, mjera opreza i uputa za ispravnu primjenu u uputi o lijeku namijenjenoj za bolesnike i u sažetku opisa svojstava lijeka namijenjenom za zdravstvene radnike
- Određene informacije na pakiranju lijekova
- Odobrene veličine pakiranja lijeka (količina lijeka u pakiranju je određena kako bi se osigurala ispravna primjena lijeka)
- Način propisivanja lijeka (način kako se lijek propisuje i izdaje bolesnicima (na recept ili bez recepta) koristi se u minimizaciji rizika lijeka).

Prethodno opisane mjere se nazivaju *rutinskim mjerama minimizacije* rizika.

Osim prethodno navedenih mjera, informacije o nuspojavama se kontinuirano prikupljaju i redovito analiziraju kako bi se provele trenutne akcije ako je potrebno. Ove mjere sačinjavaju *rutinske farmakovigilancijske aktivnosti*.

II.A Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju

Važni rizici lijeka Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju su rizici koji zahtijevaju posebne aktivnosti kako bi se minimizirali ili dodatno istražili s ciljem sigurne primjene lijeka. Važni rizici mogu biti identificirani ili potencijalni. Identificirani rizici su oni za koje postoji dovoljno dokaza da su povezani s primjenom lijeka Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju. Potencijalni rizici su oni za koje je povezanost s primjenom lijeka moguća temeljem dostupnih podataka, ali nije još potvrđena i zahtijeva daljnja istraživanja. Informacije koje nedostaju su informacije o sigurnoj primjeni lijeka koje je potrebno prikupiti jer trenutno nisu dostupne (npr. informacije o dugotrajnoj primjeni lijeka).

Popis važnih rizika i informacija koje nedostaju	
Važni identificirani rizici	nema
Važni potencijalni rizici	nema
Informacije koje nedostaju	nema

II.B Sažetak važnih rizika

Sigurnosne informacije u odobrenim informacijama o lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku) su jednake onima referentnog lijeka.

II.C Post-autorizacijski razvojni plan

II.C.1 Studije koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Nema studija koje su uvjet odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili posebna obveza lijeka Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju.

II.C.2 Druge studije u post-autorizacijskom razvojnom planu

Nije zatraženo provođenje studija za lijek Cefepim AptaPharma 1 g i 2 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju.