Apiksaban

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Ovu karticu uvijek nosite sa sobom
Pokažite ovu karticu svom ljekarniku, stomatologu ili drugom zdravstvenom radniku koji Vas liječi.

Liječim se antikoagulacijskim lijekom AXIPIO (apiksaban) koji sprječava zgrušavanje krvi

Molimo Vas ispunite ovaj dio, ili zamolite svog liječnika da ga ispuni:

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Indikacija:

Doza: mg dvaput na dan

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Informacije za bolesnike

- AXIPIO uzimajte redovito, prema uputama. Ako propustite jednu dozu, uzmite ju čim se sjetite i nastavite prema uobičajenom rasporedu uzimanja.
- Nemojte prestati uzimati AXIPIO bez razgovora s liječnikom, obzirom da imate rizik od moždanog udara ili drugih komplikacija.
- AXIPIO Vam pomaže razrijediti krv. Međutim, to može povisiti rizik od krvarenja.
  Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica ili krvarenje ispod kože, crno obojenu stolicu, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, omaglicu, umor, bljedilo ili slabost, iznenadnu tešku glavobolju, iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi.
- Ako krvarenje ne prestane samo od sebe, **odmah zatražite medicinsku pomoć.**
- Ako idete na operaciju ili bilo kakvi invazivni postupak, obavijestite svog liječnika da uzimate AXIPIO.

Informacije za zdravstvene radnike

- AXIPIO (apiksaban) je oralni antikoagulans, koji djeluje izravnom selektivnom inhibicijom faktora Xa.
- AXIPIO može povećati rizik od krvarenja. U slučajevima jakih krvarenja, potrebno je odmah prekinuti primjenu.
- Liječenje lijekom AXIPIO ne zahtijeva rutinsko praćenje izloženosti. Kalibrirano kvantitativno određivanje sadržaja anti-faktora Xa može biti korisno u iznimnim situacijama, primjerice kod predoziranja i hitnih operacija (testovi zgrušavanja: protrombinsko vrijeme (PV), međunarodni normalizirani omjer (INR) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) se ne preporučaju) – vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka.
- Dostupan je lijek za reverziju anti-faktor Xa aktivnosti apiksabana.