

## KARTICA ZA BOLESNIKA

### Abatixent (apiksaban)

#### Kartica za bolesnika

Ova kartica uvijek treba biti uz Vas /dijete/njegovatelja

Pokažite ovu karticu ljekarniku, stomatologu ili drugom zdravstvenom radniku prije liječenja.

Liječim se antikoagulacijskim lijekom Abatixent (apiksaban) koji sprječava zgrušavanje krvi

Molimo Vas ispunite ovaj dio, ili zamolite svog liječnika da ga ispuni:

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Indikacija:

Težina:

Doza: mg dvaput na dan

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

#### Informacije za bolesnike/njegovatelje

- Abatixent uzimajte/dajte redovito, prema uputama. Ako propustite jutarnju dozu, uzmite/dajte je čim se sjetite ili zajedno s večernjom dozom. Propuštena večernja doza može se uzeti/dati samo tijekom iste večeri. Ne smijete uzeti/dati dvije doze sljedeće jutro, već sljedeći dan trebate nastaviti prema uobičajenom rasporedu uzimanja dvaput na dan, kako je preporučeno.
- Nemojte prestati uzimati/davati Abatixent bez razgovora s liječnikom, obzirom da imate/bolesnik ima rizik od moždanog udara/krvnog ugruška ili drugih komplikacija.
- Abatixent Vam pomaže razrijediti krv. Međutim, to može povisiti rizik od krvarenja. Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica ili krvarenje ispod kože, crno obojenu stolicu, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, omaglicu, umor, bljedilo ili slabost, iznenadnu tešku glavobolju, iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi.
- Ako krvarenje ne prestane samo od sebe, **odmah zatražite medicinsku pomoć.**
- Ako idete/bolesnik ide na operaciju ili bilo kakvi invazivni postupak, obavijestite liječnika da uzimate/bolesnik uzima Abatixent.

{MMM YYYY}

#### Informacije za zdravstvene radnike

- Abatixent (apiksaban) je oralni antikoagulans, koji djeluje izravnom selektivnom inhibicijom faktora Xa.
- Abatixent može povećati rizik od krvarenja. U slučajevima jakih krvarenja, potrebno je odmah prekinuti primjenu.
- Liječenje lijekom Abatixent ne zahtijeva rutinsko praćenje izloženosti. Kalibrirano kvantitativno određivanje sadržaja anti-faktora Xa može biti korisno u iznimnim situacijama, primjerice kod predoziranja i hitnih operacija (testovi zgrušavanja: protrombinsko vrijeme (PV), međunarodni normalizirani omjer (INR) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) se ne preporučaju) – vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka.  
Dostupan je lijek za reverziju anti-faktor Xa aktivnosti apiksabana za odrasle osobe. Međutim, njegova sigurnost i djelotvornost nisu ustanovljene u pedijatrijskih bolesnika (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za andeksanet alfa).