

PAA231115

# Kartica s upozorenjima za bolesnika



**Eliquis®**  
(apiksaban)

**Ovu karticu uvijek nosite sa sobom**  
Pokažite ovu karticu svom ljekarniku, stomatologu  
ili drugom zdravstvenom radniku koji Vas liječi.

Liječim se antikoagulacijskim lijekom Eliquis (apiksaban)  
koji sprječava zgrušavanje krvi

Molimo Vas ispunite ovaj dio, ili zamolite svog liječnika da  
ga ispuni:

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Indikacija:

Doza: mg dvaput na dan

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

## Informacije za bolesnike

- Eliquis uzimajte redovito, prema uputama. Ako propustite jutarnju dozu, uzmite je čim se sjetite ili zajedno s večernjom dozom. Propuštena večernja doza može se uzeti samo tijekom iste večeri. Ne smijete uzeti dvije doze sljedeće jutro, već sljedeći dan trebate nastaviti prema uobičajenom rasporedu uzimanja dvaput na dan, kako je preporučeno.
- Nemojte prestati uzimati Eliquis bez razgovora s liječnikom, obzirom da imate rizik od moždanog udara ili drugih komplikacija.

V

V



Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg

Product: **PACK ELIQUIS HR**

Color:

	Black
	PANTONE 683 C
	PANTONE 1645 C
	measureline

Color:

<b>2. draft, 11.10.2024 / KS</b>	
<b>PAA149195</b>	
<b>Pharma Code: PAA231115</b>	
<b>85 x 405 mm</b>	

<b>9 pt</b>	
<b>85 x 405 mm</b>	
<b>Comments:</b>	

Comments:

PAA231115

- Eliquis Vam pomaže razrijediti krv. Međutim, to može povisiti rizik od krvarenja. Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica ili krvarenje ispod kože, crno obojenu stolicu, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, omaglicu, umor, bljedilo ili slabost, iznenadnu tešku glavobolju, iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi.
- Ako krvarenje ne prestane samo od sebe, **odmah zatražite medicinsku pomoć.**
- Ako idete na operaciju ili bilo kakvi invazivni postupak, obavijestite svog liječnika da uzimate Eliquis. srpanj 2024

### Informacije za zdravstvene radnike

- Eliquis (apiksaban) je oralni antikoagulans, koji djeluje izravnom selektivnom inhibicijom faktora Xa.
- Eliquis može povećati rizik od krvarenja. U slučajevima jakih krvarenja, potrebno je odmah prekinuti primjenu.
- Liječenje lijekom Eliquis ne zahtijeva rutinsko praćenje izloženosti. Kalibrirano kvantitativno određivanje sadržaja anti-faktora Xa može biti korisno u iznimnim situacijama, primjerice kod predoziranja i hitnih operacija (testovi zgrušavanja: protrombinsko vrijeme (PV), međunarodni

normalizirani omjer (INR) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) se ne preporučaju – vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka.

- Dostupan je lijek za reverziju anti-faktor Xa aktivnosti apiksabana.

<b>Pfizer</b>	
<b>Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg</b>	
<b>PAA231115</b>	Product: <b>PACK ELIQUIS HR</b>
Draft / Creator:	<b>2. draft, 11.10.2024 / KS</b> Color: <b>Black</b>
Component Code Old:	<b>PAA149195</b> <b>PANTONE 683 C</b>
Smallest Font Size:	<b>9 pt</b> Pharma Code: <b>PAA231115</b>
Size:	<b>85 x 405 mm</b>
Comments:	<b>measureline</b>