


<p>Ime bolesnika:</p> <hr/> <p>Ime liječnika:</p> <hr/> <p>Telefonski broj liječnika:</p> <hr/> <p>Nosite ovu karticu sa sobom još 4 mjeseca nakon doze lijeka Flixabi ili, u slučaju trudnoće, još najmanje 6 mjeseci nakon poroda. Nuspojave se mogu javiti dugo vremena nakon zadnje doze lijeka.</p>	<p>Datum početka liječenja lijekom Flixabi:</p> <hr/> <hr/> <p>Sadašnji režim primjene lijeka:</p> <hr/> <hr/> <p>Prilikom svakog posjeta liječniku obavezno ponesite popis svih drugih lijekova koje uzimate.</p>	<p>Popis drugih lijekova:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>Popis alergija:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Zamolite liječnika da ovdje zabilježi vrstu i datum posljednjeg testiranja na tuberkulozu (TBC):</p> <p>Test: _____</p> <p>Datum: _____</p> <p>Rezultat: _____</p>	<p>SAMSUNG BIDEPIB</p>	<p><b>Kartica s podsjetnikom za bolesnika</b></p> <p> <b>Flixabi<sup>®</sup> 100 mg</b> <b>infliksimumab</b></p> <p><b>HR</b></p> <p>Pokažite ovu karticu svakom liječniku koji sudjeluje u Vašem liječenju.</p>
--	--	--	---	------------------------	---

<p>Ova kartica s podsjetnikom za bolesnika sadrži važne sigurnosne informacije, kojih morate biti svjesni prije i tijekom liječenja lijekom Flixabi.</p> <p>Pažljivo pročitajte uputu o lijeku za lijek Flixabi prije nego što počnete primati ovaj lijek.</p> <p>Važno je da Vi i Vaš liječnik zabilježite zaštićeni naziv i broj serije Vašeg lijeka.</p>	<p><b>Infekcije</b></p> <p><b>Prije liječenja lijekom Flixabi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obavijestite liječnika ako imate neku infekciju, čak i ako je vrlo blaga.</li> <li>• Vrlo je važno da obavijestite liječnika ako ste ikada bolovali od tuberkuloze (TBC-a) ili bili u bliskom kontaktu s osobom koja je bolovala od tuberkuloze. Liječnik će Vas testirati da utvrdi imate li tuberkulozu. Zamolite liječnika da na ovu karticu upiše vrstu i datum zadnjeg testiranja na TBC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obavijestite liječnika ako imate hepatitis B ili ako znate ili sumnjate da ste zaraženi virusom hepatitisa B.</li> </ul> <p><b>Tijekom liječenja lijekom Flixabi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odmah obavijestite liječnika ako se pojave znakovi infekcije. Ti znakovi uključuju vrućicu, umor, (ustrajan) kašalj, nedostatak zraka, gubitak tjelesne težine, noćno znojenje, proljev, rane, probleme sa zubima, žarenje pri mokrenju ili simptome nalik gripi.</li> </ul>	<p><b>Trudnoća i cijepljenje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U slučaju da ste primali Flixabi za vrijeme trudnoće, važno je da o tome obavijestite pedijatra svog djeteta prije nego što Vaše dijete primi ikakvo cjepivo. Vaše dijete ne smije primiti "živo cjepivo", kao što je BCG (primjenjuje se za sprječavanje tuberkuloze), unutar 6 mjeseci od rođenja.</li> </ul>		
---	--	---	---	--	--