

KARTA PACJENTA / PATIENT ALERT CARD
39x80 mm (80x195 mm)

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Rocavys 15 mg ☐

Rocavys 20 mg ☐

- Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku
- Pokažite ovu karticu svakom liječniku i stomatologu prije liječenja

Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Rocavys (rivaroksaban).

Ime i prezime:

Drugi lijekovi/stanja:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Faksimil liječnika:

Molim također obavijestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

Obavijest za liječnike:

- INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Rocavys.

Što trebam znati o lijeku Rocavys?

- Rocavys razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Rocavys morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka.**
- Ne smijete prestati uzimati Rocavys bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Rocavys.
- Obavijestite liječnika da uzimate Rocavys prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

Kada trebam potražiti savjet liječnika?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Rocavys, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinite uzimati Rocavys bez prethodnog dogovora s liječnikom ako znate da ste izloženi povećanom riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- bol
- oticanje ili nelagodu
- glavobolju, omaglicu ili slabost
- neobično stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu krvariti
- menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvenu ili crnu stolicu
- iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

Kako uzimati Rocavys?

- Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Rocavys
 - od 15 mg se mora uzimati s hranom
 - od 20 mg se mora uzimati s hranom.


930001070/01 

CARTON LEAFLET LABEL ALUMINIUM TUBE KARTICA ZA PACIJENTA ROCAVYS_HR			COLOUR (number of colours): 1/1		☒ 1. draft ☐ Date: 16.01.2025. Date:
 SAP CODE 930001070 REVISION 01 DIMENSION 80x195 mm FARMACODE - ORIENTATION A FOLDING TYPE - FONT / SIZE Futura TOT, 9pt EAN CODE - SPECIFICATION NUMBER - PREPRESS Adobe Illustrator CC CREATED BY Barbaroša MATERIAL -			PANTONE Process Black 		☒ 2. draft ☐ Date: 29.01.2025. Date:
			Non printing colours		☐ 3. draft ☐ Date: Date:
			Profile 		☐ 4. draft ☐ Date: Date:
					☐ 5. draft ☐ Date: Date:
					☐ 6. draft ☐ Date: Date:
			SIGNATURE PRODUCTION		SIGNATURE MARKET

KARTA PACJENTA / PATIENT ALERT CARD
39x80 mm (80x195 mm)

41 mm

63 mm



2D code
aprox. 15 x 15 mm
