

## KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

### Dovequa 10 mg filmom obložene tablete (rivaroksaban)

#### Kartica s upozorenjima za bolesnika

- ♦ Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku
- ♦ Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja

#### Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Dovequa (rivaroksaban)

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

Drugi lijekovi/stanja:

#### U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Faksimil liječnika:

#### Molim također obavijestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

#### Obavijest za liječnike:

- ♦ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Dovequa.

#### Što trebam znati o lijeku Dovequa?

- ♦ Dovequa razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- ♦ Dovequa morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka.**
- ♦ Ne smijete prestati uzimati Dovequa bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- ♦ Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Dovequa.
- ♦ Obavijestite liječnika da uzimate lijek Dovequa prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

#### Kada trebam potražiti savjet liječnika?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Dovequa, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinite uzimati Dovequa bez prethodnog dogovora s liječnikom ako znate da ste izloženi riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- ♦ bol
- ♦ oticanje ili nelagodu
- ♦ glavobolju, omaglicu ili slabost
- ♦ neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu krvariti
- ♦ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- ♦ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvenu ili crnu stolicu
- ♦ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

**Kako uzimati Dovequa?**

- ♦ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Dovequa
  - od 10 mg može se uzimati s hranom ili bez nje