

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Dovequa 15 mg filmom obložene tablete (rivaroksaban)

Kartica s upozorenjima za bolesnika

- ♦ Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku
- ♦ Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja

Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Dovequa (rivaroksaban)

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

Drugi lijekovi/stanja:

U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Faksimil liječnika:

Molim također obavijestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

Obavijest za liječnike:

- ♦ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Dovequa.

Što trebam znati o lijeku Dovequa?

- ♦ Dovequa razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- ♦ Dovequa morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka.**
- ♦ Ne smijete prestati uzimati Dovequa bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- ♦ Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Dovequa.
- ♦ Obavijestite liječnika da uzimate lijek Dovequa prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

Kada trebam potražiti savjet liječnika?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Dovequa, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinite uzimati Dovequa bez prethodnog dogovora s liječnikom ako znate da ste izloženi riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- ♦ bol
- ♦ oticanje ili nelagodu
- ♦ glavobolju, omaglicu ili slabost
- ♦ neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu krvariti
- ♦ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- ♦ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvenu ili crnu stolicu
- ♦ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

Kako uzimati Dovequa?

- ♦ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Dovequa
 - od 15 mg se mora uzimati s hranom