

## KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

### Kartica s upozorenjima za bolesnika

Accord

**Rivaroxaban Accord 2,5 mg** (kućica za označavanje propisane doze kvačicom )

**Rivaroxaban Accord 10 mg** (kućica za označavanje propisane doze kvačicom )

**Rivaroxaban Accord 15 mg** (kućica za označavanje propisane doze kvačicom )

**Rivaroxaban Accord 20 mg** (kućica za označavanje propisane doze kvačicom )

- ◆ **Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku**
- ◆ **Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja**

### **Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Rivaroxaban Accord (rivaroksaban)**

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

Drugi lijekovi/stanja:

### **U hitnom slučaju molim obavijestite:**

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Faksimil liječnika:

### **Molim također obavijestite:**

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

### **Obavijest za liječnike:**

◆ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Rivaroxaban Accord.

### **Što trebam znati o lijeku Rivaroxaban Accord?**

- ◆ Rivaroxaban Accord razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- ◆ Rivaroxaban Accord morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka.**
- ◆ Ne smijete prestati uzimati Rivaroxaban Accord bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- ◆ Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Rivaroxaban Accord.
- ◆ Obavijestite liječnika da uzimate lijek Rivaroxaban Accord prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

### **Kada trebam potražiti savjet liječnika?**

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Rivaroxaban Accord, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinite uzimati Rivaroxaban Accord bez prethodnog dogovora s liječnikom ako znate da ste izloženi povećanom riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- ◆ bol
- ◆ oticanje ili nelagodu
- ◆ glavobolju, omaglicu ili slabost
- ◆ neobično stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu krvariti
- ◆ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- ◆ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvena ili crna stolica
- ◆ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

### **Kako uzimati Rivaroxaban Accord?**

- ◆ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Rivaroxaban Accord
  - od 2,5 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
  - od 10 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
  - od 15 mg se mora uzimati s hranom
  - od 20 mg se mora uzimati s hranom