

<b>KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA</b>
--

**KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA****Cagluen**

filmom obložene tablete

**edoksaban**

Molimo Vas da uvijek nosite ovu karticu sa sobom.

Pokažite je liječniku, ljekarniku, kirurgu ili zubaru prije svakog liječenja ili zahvata.

**INFORMACIJE O BOLESNIKU**

Ime bolesnika:

Datum rođenja:

U hitnom slučaju, molimo da se obratite:

Ime:

Broj telefona:

**INFORMACIJE O LIJEČENJU**

(Ispunjava liječnik)

Cagluen je propisan jedanput na dan u dozi od: mg

Početak liječenja: / (mm/gg)

Krvna grupa:

Drugi lijekovi/bolesti:

**INFORMACIJE O LIJEČNIKU KOJI PROPISUJE LIJEK**

Za dodatne informacije ili u hitnom slučaju, obratite se:

Ime liječnika:

Telefonski broj, žig ordinacije:

Potpis liječnika:

## INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

- Cagluen je oralni antikoagulans, inhibitor faktora Xa.
- Kad je potreban invazivni postupak, primjenu lijeka Cagluen treba prekinuti najmanje 24 sata prije i primijeniti odgovarajući oprez.
- Cagluen može povećati rizik od krvarenja. U slučaju klinički značajnog krvarenja, odmah obustavite liječenje.
- Testovi koagulacije kao što su međunarodni normalizirani omjer (INR), protrombinsko vrijeme (PV) ili aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) nisu korisne mjere učinka lijeka Cagluen. Međutim, kalibrirani test za određivanje anti-faktora Xa može dati korisnu informaciju kod donošenja kliničke odluke.

Molimo da pročitate Sažetak opisa svojstava lijeka za dodatne informacije.

## O LIJEČENJU

Propisan Vam je Cagluen, antikoagulantni lijek, koji razrjeđuje krv i pomaže u sprječavanju nastanka krvnih ugrušaka. Važno je da uzimate ovaj lijek točno prema uputama liječnika.

- Ako propustite dozu, odmah je uzmite i zatim nastavite sljedećeg dana prema uobičajenom rasporedu – nemojte istog dana uzeti dvostruko veću dozu od propisane.
- Nemojte početi uzimati nikakve druge lijekove (uključujući one u slobodnoj prodaji) a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom.
- Nemojte prestati uzimati Cagluen a da se prethodno niste posavjetovali s liječnikom jer Vam to može povećati rizik od nastanka krvnog ugruška.
- Molimo da pročitate Uputu o lijeku koju možete pronaći u svakom pakiranju lijeka Cagluen.

## KADA ZATRAŽITI SAVJET LIJEČNIKA

### RIZIK OD KRVARENJA

Uzimanje antikoagulantnog lijeka kao što je Cagluen može Vam povećati rizik od krvarenja. Stoga je važno da budete upoznati s mogućim znakovima i simptomima krvarenja i da se **odmah** obratite svom liječniku ako Vam se pojavi nešto od sljedećeg:

- modrice ili potkožno krvarenje
- krv u mokraći
- iskašljavanje krvi
- povraćanje krvi ili sadržaja koji izgleda kao mljevena kava
- krvarenje iz nosa ili posjekotine kojima treba puno vremena da prestanu
- stolica boje katrana
- omaglica ili iznenadna glavobolja
- neobjašnjivi umor
- nenormalno krvarenje iz rodnice, uključujući jaču ili dugotrajniju menstruaciju.

Molimo da se obratite svom liječniku ako osjetite ikakve neobične simptome.