

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Banxiol (apiksaban)

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Ova kartica treba biti uz Vas / dijete / njegovatelja u svakom trenutku.

Pokažite ovu karticu ljekarniku, stomatologu ili drugom zdravstvenom radniku prije početka liječenja.

Liječim se antikoagulacijskim lijekom Banxiol (apiksaban) koji sprječava zgrušavanje krvi.

Molimo Vas ispunite ovaj dio ili zamolite liječnika da ga ispuni

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Indikacija:

Tjelesna težina:

Doza: mg dvaput na dan

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Informacije za bolesnike / njegovatelje

- Banxiol uzimajte / dajte redovito, prema uputama. Ako propustite jutarnju dozu, uzmite / dajte je čim se sjetite ili zajedno s večernjom dozom. Propuštena večernja doza može se uzeti / dati samo tijekom iste večeri. Ne smijete uzeti / dati dvije doze sljedeće jutro, već sljedeći dan trebate nastaviti prema uobičajenom rasporedu uzimanja dvaput na dan, kako je preporučeno.
- Nemojte prestati uzimati / davati Banxiol bez razgovora s liječnikom, s obzirom na to da imate / bolesnik ima rizik od moždanog udara / krvnog ugruška ili drugih komplikacija.
- Banxiol pomaže razrijediti krv. Međutim, to može povećati rizik od krvarenja.
- Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica ili krvarenje ispod kože, crno obojenu stolicu, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, omaglicu, umor, bljedilo ili slabost, iznenadnu tešku glavobolju, iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi.
- Ako krvarenje ne prestane samo od sebe, **odmah zatražite medicinsku pomoć.**
- Ako idete / bolesnik ide na operaciju ili bilo kakav invazivni postupak, obavijestite liječnika da uzimate / bolesnik uzima Banxiol.

09/2025.

Informacije za zdravstvene radnike

- Banxiol (apiksaban) oralni je antikoagulans, koji djeluje izravnom selektivnom inhibicijom faktora Xa.
- Banxiol može povećati rizik od krvarenja. U slučajevima jakih krvarenja, potrebno je odmah prekinuti primjenu.
- Liječenje lijekom Banxiol ne zahtijeva rutinsko praćenje izloženosti. Kalibrirano kvantitativno određivanje sadržaja anti-faktora Xa može biti korisno u iznimnim situacijama, primjerice kod predoziranja i hitnih operacija (ne preporučuju se testovi zgrušavanja: protrombinsko vrijeme (PV), međunarodni normalizirani omjer (INR) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV)) – vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka.
- Dostupan je lijek za reverziju anti-faktor Xa aktivnosti apiksabana za odrasle osobe, međutim, njegova sigurnost i djelotvornost nisu ustanovljene u pedijatrijskih bolesnika (pročitajte sažetak opisa svojstava lijeka za andeksanet alfa).