

Kartica za bolesnika

Ova kartica sadrži važne sigurnosne informacije koje trebate znati kada se liječite lijekom Jesoxade. Uvijek nosite ovu karticu sa sobom i pokažite je svakom liječniku koji Vas liječi.

Jesoxade 10 mg filmom obložene tablete

macitentan

Važno je da svom liječniku koji Vam je propisao lijek odmah prijavite trudnoću ili bilo koju nuspojavu koja se može javiti tijekom liječenja lijekom Jesoxade.

Centar za liječenje: _____

Ime i prezime liječnika propisivača: _____

Telefonski broj liječnika propisivača: _____

Trudnoća

Jesoxade može štetno djelovati na razvoj fetusa. Stoga ne smijete uzimati Jesoxade ako ste trudni i također ne smijete zatrudnjati dok uzimate Jesoxade. Štoviše, ako patite od plućne arterijske hipertenzije, pojava trudnoće može jako pogoršati simptome Vaše bolesti.

Kontracepcija

Za vrijeme liječenja lijekom Jesoxade morate koristiti pouzdanu metodu kontracepcije. Pobrinite se da od svog liječnika dobijete odgovor na sva pitanja.

Testiranju na trudnoću se morate podvrgnuti prije početka liječenja lijekom Jesoxade te svakog mjeseca tijekom liječenja, čak i ako mislite da niste trudni.

Poput svih drugih lijekova ove skupine, Jesoxade može imati utjecaj na jetru. Vaš liječnik će provesti krvne pretrage prije početka liječenja lijekom Jesoxade i tijekom liječenja kako bi ispitao radi li Vam jetra ispravno.

Znakovi da Vaša jetra ne radi normalno mogu uključivati:

- mučninu (nagon za povraćanjem)
- povraćanje
- vrućicu (visoku temperaturu)
- bol u trbuhu (abdomenu)
- žuticu (žutilo kože i bjeloočnica)
- tamno obojanu mokraću
- svrbež kože
- letargiju ili umor (neuobičajeni umor ili iscrpljenost)
- sindrom nalik gripi (bol u zglobovima i mišićima s vrućicom)

Ako primijetite bilo koji od ovih znakova, odmah obavijestite svog liječnika. Ako imate dodatnih pitanja o Vašem liječenju, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.