

Kartica — podsjetnik za bolesnika

Pažljivo pročitajte cijeli podsjetnik prije nego počnete primati lijek jer sadrži Vama važne sigurnosne podatke za lijekove koji sadrže zoledronatnu kiselinu. Liječnik Vam je preporučio primjenu zoledronatne kiseline radi sprječavanja koštanih komplikacija (npr. prijeloma) uzrokovanih koštanim metastazama (širenje raka iz primarnog mjesta u kosti) ili rakom kostiju, ili radi smanjenja količine kalcija u krvi u odraslih bolesnika kad je količina kalcija prevelika zbog prisutnosti tumora. Nuspojava koja se zove osteonekroza čeljusti (oštećenje čeljusne kosti) zabilježena je manje često u bolesnika koji su primali zoledronatnu kiselinu za liječenje stanja povezanih s karcinomom. Osteonekroza čeljusti se također može javiti nakon prestanka liječenja. Potrebno je poduzeti sljedeće mjere opreza radi smanjenja rizika od razvoja osteonekroze čeljusti:

Prije početka liječenja:

- Prije početka liječenja, zamolite svog liječnika da Vas informira o osteonekrozi čeljusti.
- Provjerite sa svojim liječnikom preporuča li Vam pregled kod zubara prije nego počnete liječenje sa zoledronatnom kiselinom.
- Obratite se svom liječniku/ medicinskoj sestri (zdravstvenom radniku) ako imate bilo koji problem s Vašim ustima ili zubima. Bolesnici upućeni na kirurški zahvat na zubima (npr. vađenje zuba), koji ne obavljaju rutinske preglede kod zubara, koji imaju bolest desni, koji su pušači ili su prethodno liječeni ovom skupinom lijekova (u svrhu liječenja ili sprječavanja poremećaja kostiju) mogu imati veći rizik od razvoja osteonekroze čeljusti.

Za vrijeme liječenja:

- Održavajte dobru oralnu higijenu, pazite da proteza dobro priliježe i obavljajte rutinske preglede kod zubara.
- Ako morate liječiti zube ili ste naručeni na invazivni stomatološki zahvat (npr. vađenje zuba), recite svom liječniku za stomatološki zahvat i svom zubaru da se liječite zoledronatnom kiselinom.
- Odmah obavijestite svog liječnika i stomatologa ako imate bilo koji problem s Vašim ustima ili zubima poput klimanja zubi, bol ili oticanje, ranice u ustima koje ne cijele ili iscjedak, jer to mogu biti znakovi osteonekroze čeljusti.

Za dodatne informacije pogledajte uputu o lijeku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Verzija 1, 26.9.2017.