KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA ZA LIJEK

HYPOLIVAT 2,5 mg/50 mg

rivaroksaban/acetilsalicilatna kiselina

Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Hypolivat u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Lijekovi koji sadrže rivaroksaban/acetilsalicilatnu kiselinu mogu biti na tržištu pod različitim nazivima. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku.

Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja.

Na antikoagulacijskoj sam terapiji lijekom Hypolivat (rivaroksaban/acetilsalicilatna kiselina)

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

Drugi lijekovi / stanja:

U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Pečat liječnika:

Molim također obavijestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

Obavijest za liječnike:

INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Hypolivat.

Što trebam znati o lijeku Hypolivat?

- Hypolivat razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Hypolivat morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka**.
- Ne smijete prestati uzimati Hypolivat bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ih ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije početka primjene lijeka Hypolivat.
- Obavijestite liječnika da uzimate lijek Hypolivat prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

Kada trebam potražiti savjet liječnika?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Hypolivat, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinjite uzimati Hypolivat bez prethodnog dogovora s liječnikom ako znate da ste izloženi riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- bol
- oticanje ili nelagodu
- glavobolju, omaglicu ili slabost
- neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu krvariti
- menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvenu ili crnu stolicu
- iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

Kako uzimati Hypolivat?

Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Hypolivat 2,5 mg/50 mg može se uzimati s hranom ili bez nje.