

Vaše ime i prezime:

Ime i prezime liječnika (koji je propisao lijek Jyseleca):

Broj telefona liječnika:

Datum početka uzimanja lijeka Jyseleca:

Ovu karticu uvijek nosite sa sobom dok uzimate lijek Jyseleca i pokažite je svakom zdravstvenom radniku koji sudjeluje u Vašoj skrbi ili liječenju, primjerice ljekarniku ili liječniku hitne službe.

Posjetite našu mrežnu stranicu:



Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

NP-43261 verzija 3; prosinac, 2025.

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Nosite ovu karticu uvijek sa sobom.



Informacije o sigurnosti primjene lijeka Jyseleca® (filgotinib) za bolesnike. Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Jyseleca u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).



JYSELECA

Infekcije

- Jyseleca može pogoršati postojeću infekciju ili povećati mogućnost pojave nove infekcije. Odmah se obratite liječniku ako se razbolite ili primijetite znakove infekcije, kao što su:
 - vrućica ili zimica, nedostatak zraka, kašalj, osjećaj umora više nego inače – to mogu biti znakovi upale pluća
 - vrućica, znojenje, gubitak težine ili kašalj koji ne prestaje – to mogu biti znakovi tuberkuloze (TBC)
 - bolni osip s plikovima na koži – to može biti znak herpesa (herpes zoster)
- Prije nego što počnete uzimati lijek Jyseleca pitajte svog liječnika trebate li se testirati na TBC, uključujući neaktivnu infekciju.
- Odmah obavijestite svog liječnika ako ste nedavno bili u bliskom kontaktu s osobom koja boluje od TBC-a.

Krvni ugrušci u venama nogu ili plućima

- Odmah obavijestite liječnika ako Vam se pojave simptomi krvnih ugrušaka u nogama ili plućima, poput bolnog oticanja nogu, bola u prsnom košu ili nedostatka zraka.

Kolesterol

Visok kolesterol važan je čimbenik rizika za srčanu bolest. Za vrijeme liječenja lijekom Jyseleca Vaš liječnik će provjeravati razine kolesterola. To će mu pomoći kod donošenja odluke o potrebi primjene terapije za snižavanje razine kolesterola.

Cjepiva

- Dok uzimate lijek Jyseleca ne smijete primiti određena (živa) cjepiva (primjerice, Zostavax™ koji se koristi za sprječavanje herpesa).
- Prije nego što počnete uzimati lijek Jyseleca porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom o cjepivima. Možda će trebati provjeriti jeste li primili sva planirana cjepiva.

Trudnoća, kontracepcija i dojenje

Jyseleca se ne smije uzimati tijekom trudnoće.

- Koristite učinkovitu kontracepciju dok uzimate lijek Jyseleca te najmanje 1 tjedan nakon zadnje doze.
- Ako zatrudnite tijekom uzimanja lijeka Jyseleca ili mislite da ste trudni, prestanite uzimati lijek Jyseleca i odmah se obratite svom liječniku.
- Ako planirate trudnoću, najprije o tome porazgovarajte sa svojim liječnikom. Nemojte dojit dok uzimate lijek Jyseleca.

Rak i rak kože

Jyseleca može povećati rizik od raka. Obavijestite svog liječnika ako otkrijete bilo kakvu novu izraslinu na koži.

Srčane bolesti

Jyseleca može povećati rizik od određenih bolesti srca. Obavijestite svog liječnika ako osjetite nelagodu u prsima (koja se može proširiti na ruke, čeljust, vrat i leđa), otežano disanje i omaglicu.