APIKSABAN AVOCLOD
(apiksaban)

Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka apiksaban u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u sažetku opisa svojstava lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka molimo da pročitate sažetak opisa svojstava lijeka (dostupan na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

verzija 1 travanj, 2026.

KARTICA ZA BOLESNIKA

Ovu karticu Vi, dijete ili njegovatelj trebate uvijek nositi sa sobom.

Pokažite ovu karticu ljekarniku, stomatologu ili drugom zdravstvenom radniku prije liječenja.

Liječim se antikoagulacijskim lijekom Avoclod (apiksaban) koji sprječava zgrušavanje krvi.

Molimo Vas ispunite ovaj dio ili zamolite liječnika da ga ispuni:

Ime i prezime:	
Datum rođenja:	
Indikacija:	
Tjelesna težina:	
Doza:	mg dvaput na dan
Ime i prezime liječnika:	
Broj telefona liječnika:	

Informacije za bolesnike/*njegovatelje*

- Avoclod uzimajte/*davajte* redovito, prema uputama. Ako propustite jutarnju dozu, uzmite/*dajte* ju čim se sjetite ili ju uzmite/*dajte* zajedno s večernjom dozom. Propuštena večernja doza može se uzeti/*dati* samo tijekom iste večeri. Ne smijete uzeti/*dati* dvije doze sljedeće jutro, već sljedeći dan trebate nastaviti prema uobičajenom rasporedu uzimanja dvaput na dan, kako je preporučeno.
- Nemojte prestati uzimati/*davati* Avoclod bez razgovora s liječnikom, obzirom da ste Vi/*bolesnik* izloženi riziku od moždanog udara / stvaranja krvnog ugruška ili drugih komplikacija.
- Avoclod pomaže razrijediti krv. Međutim, to može povisiti rizik od krvarenja.
- Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica ili krvarenje ispod kože, crno obojenu stolicu, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, omaglicu, umor, bljedilo ili slabost, iznenadnu tešku glavobolju, iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi.
- Ako krvarenje ne prestane samo od sebe, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Ako Vi/*bolesnik* trebate ići na operaciju ili bilo kakvi invazivni postupak, obavijestite liječnika da Vi/*bolesnik* uzimate Avoclod.

04/2026

Informacije za zdravstvene radnike

- Avoclod (apiksaban) je oralni antikoagulans, koji djeluje izravnom selektivnom inhibicijom faktora Xa.
- Avoclod može povećati rizik od krvarenja. U slučajevima jakih krvarenja, potrebno je odmah prekinuti primjenu.
- Liječenje lijekom Avoclod ne zahtijeva rutinsko praćenje izloženosti. Kalibrirano kvantitativno određivanje sadržaja anti-faktora Xa može biti korisno u iznimnim situacijama, primjerice kod predoziranja i hitnih operacija (testovi zgrušavanja: protrombinsko vrijeme (PV), međunarodni normalizirani omjer (INR) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) se ne preporučaju) – vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka.
- Dostupan je lijek za reverziju anti-faktor Xa aktivnosti apiksabana za odrasle osobe. Međutim, njegova sigurnost i djelotvornost nisu ustanovljene u pedijatrijskih bolesnika (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za andeksanet alfa).