

SADRŽI VAŽNE MEDICINSKE INFORMACIJE

DARATUMUMAB[®]

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Verzija 2, 10/2020

CRO-MeEd-HEM-EM-006-14/10/2020

Broj telefona:

Ime liječnika/naziv klinike, centra ili bolnice:

**U slučaju hitnosti ili ako pronadete ovu karticu,
kontaktirajte ovog liječnika:**

Za BOLESNIKE liječene daratumumabom: Pokažite ovu karticu zdravstvenim radnicima PRIJE transfuzije krvi i nosite je sa sobom još 6 mjeseci nakon završetka liječenja
Za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku

Identifikacijska kartica bolesnika koji se liječi daratumumabom

Ime i prezime: _____

Uzimam sljedeći lijek:

daratumumab - protutijelo za liječenje multiplog mijeloma

Prestao/la sam uzimati ovaj lijek _____ / _____ / _____
DD MM GGGG

Za zdravstvene radnike:

Daratumumab je povezan s rizikom od interferencije s tipiziranjem krvi. Nalaz indirektnog Coombsovog testa (indirektnog antiglobulinskog testa [IAT]) u bolesnika koji uzimaju daratumumab može biti pozitivan, čak i ako u bolesnikovu serumu nisu prisutna protutijela na manje značajne antigene. Taj učinak može potrajati do 6 mjeseci nakon primjene posljednje doze lijeka. Nema utjecaja na određivanje bolesnikove krvne grupe (ABO) ni Rh faktora.

Ako je potrebna hitna transfuzija, mogu se primijeniti ABO/RhD-kompatibilni eritrociti za koje nije provedena križna proba, u skladu s praksom lokalne banke krvi.

Za više informacija pročitajte zadnju odobrenu uputu o lijeku ili se obratite Janssen medicinskom odjelu (telefonom: 01 6610 700 ili E-poštom: JJSAFETY@jnocr.jnj.com), a dodatne informacije možete potražiti i na sljedećoj poveznici: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>

Verzija 2, 10/2020

Prije početka liječenja daratumumabom, nalazi krvnih pretraga provedenih na uzorcima prikupljenima

_____ / _____ / _____ **bili su:**
DD MM GGGG

Krvna grupa: A B AB 0 Rh+ Rh-

Nalaz indirektnog Coombsovog testa (probira na protutijela) bio je:

negativan pozitivan na sljedeća protutijela:

Drugo: _____

Kontaktne podatke institucije u kojoj su provedene krvne pretrage:

Verzija 2, 10/2020