

VALDOXAN

Preporuke za izbjegavanje jetrenih nuspojava

Valdoxan je lijek koji se koristi u liječenju depresije.

Tijekom primjene Valdoxana može doći do nuspojava koje mogu uključivati promjene rada Vaše jetre.

Ovaj vodič Vam pruža preporuke kako izbjeći jetrene nuspojave te što trebate učiniti ukoliko se takve nuspojave pojave tijekom liječenja.

Za sve dodatne informacije pitajte svog liječnika!

Kako bi optimizirali vašu medicinsku skrb, slijedite preporuke svog liječnika u vezi uzimanja Valdoxana (doze, trajanje liječenja, ponovne kontrolne posjete liječniku, pretrage krvi).

ŠTO UČINITI PRIJE UZIMANJA VALDOXANA?

- **Recite svom liječniku ako znate da Vaša jetra ne radi ispravno: u ovom slučaju nemojte uzeti Valdoxan.**
- **Mogu postojati i drugi razlozi zašto Valdoxan ne može biti prikladan za Vas.**
Molimo obratite se svom liječniku za savjet o sljedećem:
 - ako ste ikada imali problema s jetrom,
 - ako imate višak kilograma,
 - ako ste dijabetičar,
 - ako konzumirate alkohol,
 - ako uzimate druge lijekove (za neke se zna da utječu na jetru).

ŠTO UČINITI KAKO BI IZBJEGLI PROBLEME S JETROM TIJEKOM LIJEČENJA?

➤ **Provoditi redovite pretrage krvi**

• **Zašto?**

Vaš liječnik treba provjeriti **prije početka liječenja** da li Vaša jetra radi ispravno. Pretrage krvi koje je liječnik propisao će reći **kako Vaša jetra radi** i je li Valdoxan pogodan za Vas.

Tijekom liječenja Valdoxanom kod nekih se pacijenata može povećati razina jetrenih enzima u krvi. Razine jetrenih enzima ukazuju na pravilan ili nepravilan rad jetre te su od vitalnog značaja za liječnika pri praćenju Vašeg liječenja.

• **Kada?**

	Prije početka liječenja ili povišenja doze	Nakon približno 3 tjedna	Nakon približno 6 tjedana	Nakon približno 12 tjedana	Nakon približno 24 tjedna
Pretrage krvi	✓	✓	✓	✓	✓

Ako Vaš liječnik poveća dozu na 50 mg, pretrage krvi se moraju opet ponoviti.

Ne zaboravite ponijeti **PODSJETNIK ZA TERMINE KRVNIH PRETRAGA** (vidjeti sljedeću stranicu) svom liječniku kako bi ste u njega mogli upisati termine testiranja na jetrene enzime.

Odmah obavijestite svog liječnika ako ste dobili bilo kakve informacije da su se Vaši jetreni enzimi u krvi povećali tijekom liječenja.

➤ **Budno pratite znakove problema s jetrom**

Ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma, Vaša jetra možda ne radi ispravno:

- žuta koža / oči
- tamnija mokraća,
- stolica svijetle boje,
- bol u desnom gornjem dijelu trbuha,
- neobičan umor (pogotovo povezan s drugim gore navedenim simptomima)

⇒ Zatražite hitan savjet od liječnika koji Vas može savjetovati da prestanete uzimati Valdoxan.

Poziv na prijavljivanje nuspojava

O svim sumnjama na nuspojave lijeka trebate obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim ste u stupili u kontakt. O sumnji na nuspojavu možete izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem

- on-line prijave nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr

ili

pisano putem obrasca za prijavu nuspojave za pacijenta/korisnika dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. Nuspojavu može prijaviti korisnik lijeka, roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik poštom na adresu Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, telefaksom (01/4884-119) ili elektronskom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr).

PODSJETNIK ZA TERMINE VAŠIH KRVNIH PRETRAGA

ZAPAMTITI

Prilikom uzimanja lijeka Valdoxan, važno je da imate redovite krvne pretrage.

**TABLICA DOLJE VAM POMAŽE KAKO BI PRATILI SVOJE TERMINE ZA KRVNE
PRETRAGE.**

VALDOXAN 25 MG – DATUM PRVOG UZIMANJA:	
Intervali krvnih pretraga za jetrene enzime	Datum
datum prvog testa (<i>početak liječenja</i>)	
datum drugog testa (<i>poslije oko 3 tjedna</i>)	
datum trećeg testa (<i>poslije oko 6 tjedna</i>)	
datum četvrtog testa (<i>poslije oko 3 mjeseca</i>)	
datum petog testa (<i>poslije oko 6 mjeseci</i>)	

Vaš liječnik može odlučiti da treba napraviti i daljnje analize krvi.

POVEĆANJE DOZE NA 50 MG - DATUM PRVOG UZIMANJA:	
Intervali krvnih pretraga za jetrene enzime	Datum
datum testa kod povećanja doze Valdoxana na 50 mg	
<input type="checkbox"/> datum drugog testa (<i>poslije oko 3 tjedna</i>)	
<input type="checkbox"/> datum trećeg testa (<i>poslije oko 6 tjedna</i>)	
<input type="checkbox"/> datum četvrtog testa (<i>poslije oko 3 mjeseca</i>)	
<input type="checkbox"/> datum petog testa (<i>poslije oko 6 mjeseci</i>)	

Vaš liječnik može odlučiti da treba napraviti i daljnje analize krvi.

Nemojte zaboraviti donijeti ovaj vodič kada posjetite svog liječnika.

Za detaljnije informacije, molimo pogledajte Uputu o lijeku koja se nalazi u pakiranju Valdoxana.