

Popis bezreceptnih lijekova s jednom djelatnom tvari odobrenih u Republici Hrvatskoj

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
1	A01AB12	hexetidinum	za usta i ždrijelo	∅	200 ml / 200 mg	ublažavanje simptoma kod lakših do umjereno teških upala usne šupljine i ždrijela (afte, upale desni, parodontitisa s krvarenjem desni, upale krajnika, upale ždrijela, upale jezika, gljivičnih bolesti usne šupljine), sprječavanje rasta mikroorganizama u zubnom plaku i na sluznici usne šupljine te prije i nakon zubarskih zahvata, održavanje higijene usne šupljine kod teških sustavnih bolesti te za uklanjanje neugodnog zadaha iz usta	∅	odrasli i djeca starija od 5 godina, djeca mlađa od 5 god po preporuci liječnika	nije navedeno	Trudnice i dojilje obavezno pridržavanje uputa o doziranju i načinu primjene
2	A01AB12	hexetidinum	za usta i ždrijelo	∅	200 ml / 200 mg	uništavanje mikroorganizama u usnoj šupljini i ždrijelu, pomoć pri liječenju bakterijskih upala zubnog mesa i usne sluznice, kod paradontalnih zahvata	∅	odrasli i djeca starija od 2 godine	nije navedeno, primjena kroz dulje vrijeme samo po savjetu liječnika ili zubara	Kontraindikacije: primjena kod dojenčadi i djece mlađe od 2 godine (opasnost od grča grkljana), pacijenti s bronhijalnom astmom te izraženom preosjetljivošću dišnih putova (inhaliranje otopine može dovesti do poteškoća u disanju ili izazvati napad astme), kod erozivnih promjena ili ljuštenja sluznice usta, kod ranica i ulceracija; oprez kod trudnica i dojilja-izbjegavati čestu, svakodnevnu uporabu
3	A01AB12	hexetidinum	za usta i ždrijelo	∅	40 ml / 80 mg	uništavanje mikroorganizama u usnoj šupljini i ždrijelu, pomoć pri liječenju bakterijskih upala zubnog mesa i usne sluznice, kod paradontalnih zahvata	∅	odrasli i djeca starija od 2 godine	nije navedeno, primjena kroz dulje vrijeme samo po savjetu liječnika ili zubara	Kontraindikacije: primjena kod dojenčadi i djece mlađe od 2 godine (opasnost od grča grkljana), pacijenti s bronhijalnom astmom te izraženom preosjetljivošću dišnih putova (inhaliranje otopine može dovesti do poteškoća u disanju ili izazvati napad astme), kod erozivnih promjena ili ljuštenja sluznice usta, kod ranica i ulceracija; oprez kod trudnica i dojilja-izbjegavati čestu, svakodnevnu uporabu
4	A01AD02	benzydaminum	za usta i ždrijelo	2,01 g	240 ml / 0,36 g	liječenje simptoma bolnih upalnih stanja i nadražaja u usnoj šupljini i ždrijelu (npr. upala desni, upala sluznice usne šupljine, upala sluznice ždrijela) i kao nadopuna uobičajenog stomatološkog liječenja kao i nakon vađenja zuba.	6,03 g	sve dobne skupine osim male djece	7 dana	Kontraindikacije: mala djeca i osobe koje imaju oslabljen refleks gutanja; Nuspojave: anafilaktičke reakcije

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
5	A01AD02	benzydaminum	za usta i ždrijelo	2,68 mg	20 pastila / 53,6 mg	liječenje simptoma bolnih upala i nadražaja u usnoj šupljini i ždrijelu kao što su pečenje, crvenilo, osjećaj natečenosti i problemi s gutanjem. Lokalna anestezija	8,04 mg	odrasli i djeca iznad 6 godina; 6-12 godina uz nadzor odraslih	7 dana	Kontraindikacije: osobe preosjetljive na nesteroidne protuupalne lijekove
6	A01AD02	benzydaminum	za usta i ždrijelo	2,68 mg	20 pastila / 53,6 mg	liječenje simptoma bolnih upala i nadražaja u usnoj šupljini i ždrijelu kao što su pečenje, crvenilo, osjećaj natečenosti i problemi s gutanjem. Lokalna anestezija	8,04 mg	odrasli i djeca iznad 6 godina; 6-12 godina uz nadzor odraslih	7 dana	Kontraindikacije: osobe preosjetljive na nesteroidne protuupalne lijekove
7	A01AD02	benzydaminum	za usta i ždrijelo	0,182	30 ml / 0,0402 g	liječenje simptoma bolnih upalnih stanja i nadražaja u usnoj šupljini i ždrijelu (npr. upala desni, upala sluznice usne šupljine, upala sluznice ždrijela) i kao nadopuna uobičajenog stomatološkog liječenja kao i nakon vađenja zuba.	1,093 g	sve dobne skupine	7 dana	Kontraindikacije: osobe preosjetljive na nesteroidne protuupalne lijekove
8	A01AD02	benzydaminum	za usta i ždrijelo	0,182	15 ml / 0,0402 g	liječenje simptoma bolnih upalnih stanja i nadražaja u usnoj šupljini i ždrijelu (npr. upala desni, upala sluznice usne šupljine, upala sluznice ždrijela) i kao nadopuna uobičajenog stomatološkog liječenja kao i nakon vađenja zuba.	1,093 g	odrasle osobe	7 dana	Kontraindikacije: osobe preosjetljive na nesteroidne protuupalne lijekove
9	A02AD04	hydrotalcitum	kroz usta	1000 mg	20 tableta / 10 000 mg	simptomatsko liječenje poremećaja kod kojih je potrebno neutralizirati kiselost želuca: vrijed želuca ili dvanaesnika (želučani ulkus i duodenalni ulkus) te žgaravica i želučani poremećaji zbog kiseline	6000 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	2 tjedna	Oprez: bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega-moraju izbjegavati dugotrajnu primjenu visokih doza lijeka, bolesnici s hipofosfatemijom, kod bolesnika s upornim i/ili čestim simptomima mora se isključiti rizik od ozbiljnog poremećaja koji izaziva te simptome, kao što su peptički ulkus ili zloćudna bolest; dugotrajna uporaba: zahtijeva redovite provjere razine aluminija, u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega i u bolesnika koji kronično uzimaju visoke doze može se povisiti razina magnezija i serumska razina aluminija, uz djetu siromašnu fosfatima mogu izazvati smanjenje količine fosfata uz rizik nastanka osteomalacije
10	A02BA02	ranitidinum	kroz usta	75 mg	10 filmom obloženih tableta / 750 mg	sprječavanje i uklanjanje simptoma loše probave, žgaravice i povećane kiselosti u želucu	300 mg	odrasli i djeca starija od 16 godina	14 dana	Kontraindikacije: alergija na ranitidin ili na pomoćne tvari; Oprez: osobe srednjih godina i starije osobe s nedavnom pojavom simptoma, nenamjerni gubitak tjelesne težine, problemi s jetrom i/ili bubrezima, redovite liječničke kontrole, kronična bolest pluća, dijabetes, oslabljeni imunitet, porfirija, trudnice i dojilje; Interakcije: acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen, diklofenak, indometacin, naproksen, azapropazon, piroksikan, ketoprofen

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
11	A02BA02	ranitidinum	kroz usta	150 mg	10 tableta / 1500 mg	sprječavanje i uklanjanje simptoma žgaravice i povećane kiselosti u želucu	300 mg	odrasli i djeca starija od 16 godina	7 dana	Kontraindikacije: alergija na ranitidin ili na pomoćne tvari, drugi lijekovi za smanjenje lučenja želučane kiseline; Upozorenje: kod pojave teškog gutanja, povraćanja krvi ili crne stolice, neočekivanog mršavljenja ili slabokrvnosti odmah se javiti liječniku; Oprez: kod dijagnosticiranog oštećenja želuca ili dvanaesnika, žgaravica dulja od 3 mjeseca, teška bolest jetre ili bubrega, trudnoća ili planiranje trudnoće, ugrađen elektrostimulator srca ili nenormalno spor puls, rijetka bolest porfirija, žgaravica i teško disanje, bol u prsima, vrtoglavica, omaglica uz znojenje, pacijenti srednjih godina ili stariji kada se tegobe javljaju prvi put ili su se promijenile, postojanje druge kronične bolesti ili uzimanje drugih lijekova, trudnice i dojilje iznimno po preporuci liječnika, istovremeno ne konzumirati alkohol, moguć utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
12	A02BA02	ranitidinum	kroz usta	150 mg	10 tableta / 1500 mg	smanjenje prekomjernog izlučivanja želučane kiseline	300 mg	odrasli i djeca starija od 16 godina	7 dana	Kontraindikacije: alergija na ranitidin ili na pomoćne tvari, drugi lijekovi za smanjenje lučenja želučane kiseline; Upozorenje: kod pojave teškog gutanja, povraćanja krvi, crne stolice, neočekivanog mršavljenja ili slabokrvnosti odmah se javiti liječniku; Oprez: kod dijagnosticiranog oštećenja želuca ili dvanaesnika, žgaravice dulje od 3 mjeseca, teška bolest jetre ili bubrega, trudnoća ili planiranje trudnoće, dojennje, ugrađen elektrostimulator srca ili nenormalno spor puls, porfirija, žgaravica i teško disanje, bol u prsima, vrtoglavica, omaglica uz znojenje, pacijenti srednjih godina ili stariji kada se tegobe javljaju prvi put ili su se promijenile, postojanje druge kronične bolesti ili uzimanje drugih lijekova, trudnice i dojilje iznimno po preporuci liječnika, ne konzumirati alkohol, moguć utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima; Interakcije: nesteroidni protuupalni lijekovi, lidokain, propranolol, prokainamid ili n-acetilprokainamid, diazepam, fenitoin, teofilin, varfarin, glipizid, atazanavir ili delaviridin, triazolam, gefitnib, ketokonazol, midazolam
13	A02BA02	ranitidinum	kroz usta	75 mg	20 šumećih tableta / 1500 mg	ublažavanje simptoma žgaravice, loše probave, povećane kiselosti u želucu	150 mg	odrasli i djeca starija od 16 godina	6 dana	Kontraindikacije: alergija na ranitidin ili na pomoćne tvari; Oprez: trudnice i dojilje po savjetu liječnika, nesteroidni protuupalni lijekovi, porfirija; Interakcije: lijekovi za liječenje HIV infekcija

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
14	A02BC01	omeprazolom	kroz usta	20 mg	14 kapsula / 140 mg	sprječava prekomjerno lučenje želučane kiseline kod učestalih žgaravica i ostalih dispeptičkih tegoba (bol u trbuhu, osjećaj punoće, pritisak, nadutost, podrigivanje, vjetrovi)	20 mg	odrasli-stariji od 18 godina, djeca i adolescenti mlađi od 18 godina po savjetu liječnika	2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na omeprazol ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, terapija atazanavirom (AIDS); Oprez: problemi s jetrom, bolesnici s dugotrajnom, često ponavljajućom žgaravicom i dispeptičkim tegobama-potrebne redovne kontrole; Interakcije: antikoagulansi, digoksin, fenitoin, diazepam, ketokonazol, itraconazol, vorikonazol, takrolimis, atazanavir, klopidogrel; utječe na sposobnost upravljanja strojevima i vozilom
15	A02BC02	pantoprazolum	kroz usta	20 mg	14 želučanootpornih tableta / 280 mg	za kratkotrajno liječenje simptoma refluksa (npr. žgaravica, dizanje kiseline u usta) u odraslih	20 mg	odrasli-stariji od 18 godina	4 tjedna	Kontraindikacije: alergija na pantoprazol ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, terapija atazanavirom (AIDS), mlađi od 18 godina, trudnice i dojilje; Oprez: žutica i problemi s jetrom, bolesnici stariji od 55 godina koji svakodnevno koriste lijekove za reguliranje probave ili imaju nove ili nedavno promijenjene simptome, čir na želucu, operativni zahvat probavnog trakta, ozbiljna bolest ili stanje, endoskopske pretrage, C-urea izdisajni test; Interakcije: ketokonazol, antikoagulansi, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, ranitidin, famotidin; utječe na sposobnost upravljanja strojevima i vozilom
16	A02BC02	pantoprazolum	kroz usta	20 mg	14 želučanootpornih tableta / 280 mg	za kratkotrajno liječenje simptoma refluksa (npr. žgaravica, dizanje kiseline u usta) u odraslih	20 mg	odrasli-stariji od 18 godina	4 tjedna	Kontraindikacije: alergija na pantoprazol ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, terapija atazanavirom (AIDS), mlađi od 18 godina, trudnice i dojilje; Oprez: žutica i problemi s jetrom, bolesnici stariji od 55 godina koji svakodnevno koriste lijekove za reguliranje probave ili imaju nove ili nedavno promijenjene simptome, čir na želucu, operativni zahvat probavnog trakta, ozbiljna bolest ili stanje, endoskopske pretrage, C-urea izdisajni test; Interakcije: ketokonazol, antikoagulansi, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, ranitidin, famotidin; utječe na sposobnost upravljanja strojevima i vozilom

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
17	A03AD02	drotaverinum	kroz usta	80 mg	60 tableta / 2400 mg	spazam glatkih mišića u bolestima žučnog sustava: žučni kamenac, upala žučnog mjehura, spazam glatkih mišića u bolestima mokraćnog sustava: bubrežni kamenac, kamenac u mokraćovodu , upale mokraćnog sustava (pijelitis, cistitis), grčevi mokraćnog mjehura; kao pomoćna terapija: u slučaju spazma glatkih mišića probavnog sustava: čir na želucu i dvanaesniku, upala želučane sluznice (gastritis), želučani grčevi, upala debelog crijeva (kolitis), preosjetljivost i iritabilnost debelog crijeva udruženi s zatvorom konstipacijom) i nadutošću (meteorizmom), u određenim tipovima glavobolja (tenzijski tip), u ginekološkim bolestima:	odrasli: 720 mg; djeca iznad 12 godina: 160 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	nekoliko dana	Kontraindikacije: oboljeli od teškog jetrenog, bubrežnog ili srčanog zatajivanja, djeca do 12 godina; Oprez: bolesnici s niskim krvnim tlakom, trudnice, kod upravljanja vozilima i strojevima; ne preporuča se dojiljama
18	A03AD02	drotaverinum	kroz usta	80 mg	20 tableta / 1600 mg	spazam glatkih mišića u bolestima žučnog sustava: žučni kamenac, upala žučnog mjehura, spazam glatkih mišića u bolestima mokraćnog sustava: bubrežni kamenac, kamenac u mokraćovodu , upale mokraćnog sustava (pijelitis, cistitis), grčevi mokraćnog mjehura; kao pomoćna terapija: u slučaju spazma glatkih mišića probavnog sustava: čir na želucu i dvanaesniku, upala želučane sluznice (gastritis), želučani grčevi, upala debelog crijeva (kolitis), preosjetljivost i iritabilnost debelog crijeva udruženi s zatvorom konstipacijom) i nadutošću (meteorizmom), u određenim tipovima glavobolja (tenzijski tip), u ginekološkim bolestima:	odrasli: 720 mg; djeca iznad 12 godina: 160 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	nekoliko dana	Kontraindikacije: oboljeli od teškog jetrenog, bubrežnog ili srčanog zatajivanja, djeca do 12 godina; Oprez: bolesnici s niskim krvnim tlakom, trudnice, kod upravljanja vozilima i strojevima; ne preporuča se dojiljama

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
19	A03AX	dimeticonum	kroz usta	80 mg	20 tableta za žvakanje / 1600 mg	uklanjanje simptoma želučano-crijevnih tegoba izazvanih prekomjernim nakupljanjem plinova npr. meteorizma, nadutost, aerofagija, Roemheldov sindrom; pomoćna mjera prije dijagnostičkih pretraga u području trbuha; protiv pojačanog stvaranja plinova nakon kirurških zahvata	želučano crijevne tegobe: 320 mg; prije dijagnostičkih pretraga: 400 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	po potrebi i u dužem razdoblju	Nema posebnih napomena
20	A03AX	simeticonum	kroz usta	2,075 g	30 ml suspenzije / 2075,7 mg	uklanjanje simptoma želučano-crijevnih tegoba izazvanih prekomjernim nakupljanjem plinova (meteorizam, osjećaj prepunih crijeva), pomoćna mjera prije dijagnostičkih pretraga u području trbuha (rendgen, ultrazvuk, gastroduodenoskopije), protiv pojačanog stvaranja plinova nakon kirurških zahvata, protiv trovanja sredstvima za pranje	2,075 g	sve dobne skupine uključujući trudnice i dojilje	nije ograničeno	Kontraindikacije: alergija na simetikon ili pomoćne tvari; Oprez: ponovno pojavljivanje tegoba, dugotrajne tegobe
21	A03AX13	simeticonum	kroz usta	80 mg	100 kapsula / 4000 mg	simptomatsko liječenje gastrointestinalnih tegoba uzrokovanih stvaranjem plinova (nadutost-meteorizma) ili flatulencije, osjećaja punoće, priprema za dijagnostičke pretrage u području abdomena (rendgenske i ultrazvučne pretrage)	320 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	nije ograničeno	Kontraindikacije: alergija na simetikon ili pomoćne tvari; Oprez: ponovno pojavljivanje tegoba, dugotrajne tegobe, trudnice i dojilje po savjetu liječnika
22	A05BA03	Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum	kroz usta	200 mg silimarina izraženo kao silibum	60 kapsula / 6000 mg silimarina izraženo kao silibum	kod poremećaja funkcije jetre u sljedećim bolestima i stanjima: kronični hepatitis B i C (upalna bolest jetre), oštećenje jetre zbog izloženosti alkoholu uz prestanak unošenja alkoholnih pića u organizam, ciroza jetre	4 kapsule = 400 mg silimarina izraženo kao silibum	odrasli i djeca starija od 18 godina	nije ograničeno	Kontraindikacije: alergija na neki od sastojaka lijeka; Oprez: trudnice po preporuci liječnika, dojiljama se ne preporuča, ne konzumirati alkohol

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
23	A06AB02	Sennae fructi extractum siccum	kroz usta	333 mg suhog ekstrakta = 30 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	17,6 g instant biljnog čaja / 541.54 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Cassia senna L., fructus (plod aleksandrijske sene) i Cassia angustifolia Vahl, fructus (plod tinevelske sene) (4,5-5,5 : 1) što odgovara 20 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B; ekstrakcijsko otapalo: voda	kratkotrajno liječenje povremene opstipacije (zatvora)	1 1/2 čajna žličica čaja = 333 mg suhog ekstrakta = 30 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	odrasli i djeca starija od 12 godina	1 tjedan	Kontraindikacije: alergija na ekstrakt sene ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, djeca mlađa od 12 godina, crijevna opstrukcija i stenoze, atonije crijeva, upale slijepog crijeva, upalne crijevne bolesti (npr. Crohnova bolest, ulcerozni kolitis), bolovi u trbuhu nepoznatog uzroka, teške dehidracija s posljedičnim nedostatkom vode i elektrolita; Oprez: u slučaju dugotrajne uporabe pojačava se učinak srčanih glikozida i antiaritmika, kod akutnih bolova u trbuhu, zatvora, mučnine i povraćanja nepoznatog uzroka ne koristiti bez savjeta s liječnikom, potrebno izbjegavati dugotrajnu upotrebu jer može doći do pojave ovisnosti i oštećenja funkcije crijeva; Interakcije: istovremena primjena kortikosteroida, diuretika i preparata s korijenom sladića može dovesti do smanjenja koncentracije kalija u krvi; trudnicama i dojiljama se ne preporuča
24	A06AB02	bisacodylum	rektalno	10 mg	6 čepića / 60 mg	kronična začepljenja, priprema za dijagnostičke postupke, u preoperativnim i postoperativnim postupcima	10 mg	odrasli i djeca iznad 10 godina	3 dana	Kontraindikacije: dojlje, ileus, začepljenje crijevnog kanala, akutna upala crijeva, teška dehidracija
25	A06AB02	bisacodylum	kroz usta	10 mg	30 obloženih tableta / 5 mg	kronična začepljenja, priprema za dijagnostičke postupke, u preoperativnim i postoperativnim postupcima	10 mg	odrasli i djeca iznad 4 godine	14 dana	Kontraindikacije: dojlje, ileus, začepljenje crijevnog kanala, akutna upala crijeva, teška dehidracija
26	A06AB06	sennae folii extractum siccum normatum	kroz usta	30 mg hidroksiantracenskih glikozida izraženih kao senozid B	20 tableta / 300 mg hidroksiantracenskih glikozida izraženih kao senozid B	kod povremenog zatvora uzrokovanog promjenom okoline i hrane te stresom te kod zatvora zbog dugotrajnijeg ležanja u krevetu, odnosno smanjenog kretanja kada zatvor nije moguće otkloniti promjenom prehrane i laksativima baziranim na vlaknima	2 filmom obložene tablete = 30 mg hidroksiantracenskih glikozida izraženih kao senozid B	odrasli i djeca starija od 10 godina	dva tjedna	Kontraindikacije: alergija na ekstrakt sene ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, kod začepljenja crijeva, akutni ili kronični upalni procesi u crijevima (upala crvuljka, Vrohnova bolest, ulcerozni kolitis), bolovi u trbuhu nepoznatog uzroka, djeca mlađa od 10 godina; Oprez: terapiju započeti najmanjom dozom (1 tableta) u protivnom kod predoziranja se javlja proljev, bez savjeta sa liječnikom koristiti najduže 1-2 tjedna-dugotrajno uzimanje laksativa povećava ljenost crijeva i može stvoriti ovisnost s potrebom povećavanja doze, kod dugotrajnog uzimanja lijeka moguća je pigmentacija debelog crijeva (pseudomelanosis coli), zlouporabom može doći do poremećaja ravnoteže vode i elektrolita (hipokalijemiju) i atoniju crijeva, kod svakodnevnih opstipacija potražiti savjet liječnika, ne koristiti kao sredstvo za mršavljenje, sadrži glukozu; Interakcije: kardiotonični glikozidi uz prisutnu hipokalijemiju, antiaritmici, istovremena primjena sa diureticima, kortikosteroidima i preparate s podankom slatkog korijena može dovesti do hipokalijemije; trudnicama se ne preporuča jer nema dovoljno podataka o neškodljivosti

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
27	A06AB06	sennae folium	kroz usta	30 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	50 g biljnog čaja / 1,5 g hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	za kratkotrajno liječenje povremene konstipacije (ne česta, tvrda, mala i suha stolica, uz otežano pražnjenje crijeva i osjećaj nepotpunog pražnjenja)	1 čajna žličica čaja = 1,2 g cca 30 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	odrasli i djeca starija od 12 godina	1-2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na senu, povraćanje, opstrukcijai/ili stenoza crijeva, upalne bolesti crijeva, bolovi u trbuhu nejasnog uzroka, dehidracija, analne fisure, fistule, ulcerozni hemoroidi, proktitis, djeca mlađa od 12 godina; Oprez: kod kroničnih bolesti, metaboličkih poremećaja, alergija ili primijenjenih drugih terapija potrebno je posavjetovati se s liječnikom kao i u slučaju primjene sljedećih lijekova: glikozidi digitalisa, antiaritmika, lijekova koji mogu izazvati produljenje QT-intervalu, diuretika, adrenokortikoida, korijen sladića, potrebno je izbjegavati upotrebu dulju od preporučene (1-2 tjedna) jer može doći do pojave ovisnosti i poremećaj funkcije crijeva, kod bolesnika s poremećajem funkcije bubrega moguć poremećaj elektrolita; Interakcije: glikozidi digitalisa, antiaritmici (kinidin), kod tiazidskih diuretika i adrenokortikosteroida koji mogu dovesti do hipokalemije stanje se može pogoršati; trudnicama se ne preporuča u prvom trimestru trudnoće, dojiljama se ne preporuča
28	A06AB06	Sennae fructi angustifoliae extractum siccum	kroz usta	20 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	45 obloženih tableta / 900 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	kratkotrajno liječenje povremene opstipacije (zatvora)	1 obložena tableta = 20 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	odrasli i djeca starija od 12 godina	1-2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na ekstrakt sene ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, djeca mlađa od 12 godina, crijevna opstrukcija i stenoze, atonije crijeva, upale slijepog crijeva, upalne crijevne bolesti (npr. Crohnova bolest, ulcerozni kolitis), bolovi u trbuhu nepoznatog uzroka, teške dehidracija s posljedičnim nedostatkom vode i elektrolita; Oprez: u slučaju dugotrajne uporabe pojačava se učinak srčanih glikozida i antiaritmika, kod akutnih bolova u trbuhu, zatvora, mučnine i povraćanja nepoznatog uzroka ne koristiti bez savjeta s liječnikom, potrebno izbjegavati dugotrajnu upotrebu jer može doći do pojave ovisnosti i oštećenja funkcije crijeva; Interakcije: istovremena primjena kortikosteroida, diuretika i preparata sa korijenom sladića može dovesti do smanjenja koncentracije kalija u krvi; trudnicama i dojiljama se ne preporuča

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
29	A06AB06	Sennae fructus angustifoliae, Sennae fructus acutifoliae, Sennae folium	kroz usta	30 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	80 g biljnog čaja / 2,4 g hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	kratkotrajno liječenje povremene opstipacije (zatvora)	1 čajna žlica čaja = 1 g = 30 mg hidroksiantracenskih glikozida, izračunano kao senozid B	odrasli i djeca starija od 12 godina	1-2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na ekstrakt sene ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, djeca mlađa od 12 godina, crijevna opstrukcija i stenozе, atonije crijeva, upale slijepog crijeva, upalne crijevne bolesti (npr. Crohnova bolest, ulcerozni kolitis), bolovi u trbuhu nepoznatog uzroka, teške dehidracija s posljedičnim nedostatkom vode i elektrolita; Oprez: u slučaju dugotrajne uporabe pojačava se učinak srčanih glikozida i antiaritmika, kod akutnih bolova u trbuhu, zatvora, mučnine i povraćanja nepoznatog uzroka ne koristiti bez savjeta s liječnikom, potrebno izbjegavati dugotrajnu upotrebu jer može doći do pojave ovisnosti i oštećenja funkcije crijeva; Interakcije: istovremena primjena kortikosteroida, diuretika i preparata sa korijenom sladiča može dovesti do smanjenja koncentracije kalija u krvi; trudnicama i dojiljama se ne preporuča
30	A06AB08	sodium picosulfate	kroz usta	5 mg	30 ml / 225 mg	kratkotrajno liječenje kroničnog zatvora	10 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	moгуća dugotrajna primjena svaki drugi dan	Kontraindikacije: alergija na pomoćne tvari, prisutna abdominalna bol (sa ili bez mučnine i povraćanja), upala crijeva, opstrukcija crijeva, težak poremećaj ravnoteže tekućine; Oprez: ne primjenjivati kontinuirano svaki dan ili kroz dulje vrijeme zbog mogućeg poremećaja ravnoteže tekućine i sniženja koncentracije kalija u krvi; djeca mlađa od 12 godina po preporuci liječnika
31	A06AD11	lactulosum	kroz usta	odrasli 30 g; djeca 7-14 godina 10 g	250 ml / 166.75 g	za olakšano pražnjenje crijeva u slučajevima povremene ili dugotrajne opstipacije (zatvor stolice), za omekšavanje stolice u slučaju hemoroida, operativnog zahvata na debelom crijevu ili čmaru	odrasli 30 g; djeca 7-14 godina 10 g	odrasli i djeca starija od 7 godina	7 dana; isključenjem drugih uzroka opstipacije moguća dugotrajnija primjena	Kontraindikacije: preosjetljivi na laktulozu ili laktulozi srodne šećere (laktoza, galaktoza), dijete bez galaktoze (ako bolujete od galaktozemije), terapija mesalazinom, zapletaj crijeva (ileus); Oprez: djece mlađa od 7 godina, sumnja na upalu crvuljka (apendicitis), kod kolostome ili ileostome, kod krvarenja iz debelog crijeva, sadrži galaktozu i laktozu; trudnoća i dojilje po preporuci liječnika
32	A06AD11	lactulosum liquidum	kroz usta	odrasli i djeca iznad 14 godina: 30,015 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 6,67 g; dojenčad: 3,335 g; hepatička encefalopatija: 33,35 g	300 ml sirupa / 200,1 g	česti ili povremeni zatvor (opstipacija) kod: bolnog pražnjenja stolice, za uspostavu normalanog rada crijeva, nakon operacije, kod bolesnika koji dugotrajno moraju ležati u krevetu; sprječavanje opstipacije; opstipacija uzrokovana određenim lijekovima, hepatičke (portalne) encefalopatije (poremećaj jetrene funkcije koji dovodi do nakupljanja toksina u krvi)	odrasli: 30,015 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 6,67 g; dojenčad: 3,335 g; hepatička encefalopatija: 100,05 g	sve dobne skupine uključujući dojenčad	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivi na laktulozu ili laktulozi srodne šećere (laktoza, galaktoza), dijete bez galaktoze (ako bolujete od galaktozemije), iznenadna bol u trbuhu ili začepljenje crijeva; Oprez: sadrži galaktozu i laktozu; trudnoća i dojilje po preporuci liječnika,

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
33	A06AD11	lactulosum liquidum	kroz usta	odrasli i djeca iznad 14 godina: 30,015 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 6,67 g; dojenčad: 3,335 g; hepaticka encefalopatija: 33,35 g	200 ml sirupa / 133,4 g	česti ili povremeni zatvor (opstipacija) kod: bolnog pražnjenja stolice, za uspostavu normalanog rada crijeva, nakon operacije, kod bolesnika koji dugotrajno moraju ležati u krevetu; sprječavanje opstipacije; opstipacija uzrokovana određenim lijekovima, hepaticke (portalne) encefalopatije (poremećaj jetrene funkcije koji dovodi do nakupljanja toksina u krvi)	odrasli: 30,015 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 6,67 g; dojenčad: 3,335 g; hepaticka encefalopatija: 100,05 g	sve dobne skupine uključujući dojenčad	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivi na laktulozu ili laktulozi srodne šećere (laktoza, galaktoza), dijete bez galaktoze (ako bolujete od galaktozemije), iznenadna bol u trbuhu ili začepljenje crijeva; Oprez: sadrži galaktozu i laktozu; trudnoća i dojilje po preporuci liječnika,
34	A06AD11	lactulosum liquidum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 14 godina: 20,01 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 10,005 g; dojenčad: 3,335 g; hepaticka encefalopatija: 30,015 g	100 ml sirupa / 65 g	opstipacija, na koju se ne može dostatno utjecati hranom bogatom balastnim vlaknima kao ni drugim općim mjerama, te oboljenja kod kojih je nužno osigurati olakšano pražnjenje crijeva, prevencije i terapije portalne encefalopatije (tj. oštećenja mozga izazvanog kroničnim oboljenjima jetre, naročito cirozom jetre)	odrasli i djeca starija od 14 godina: 20,01 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 10,005 g; dojenčad: 3,335 g; hepaticka encefalopatija: 120,06 g	sve dobne skupine uključujući dojenčad	nije navedeno	Kontraindikacije: preosjetljivi na laktulozu ili laktulozi srodne šećere (laktoza, galaktoza), dijete bez galaktoze (ako bolujete od galaktozemije), iznenadna bol u trbuhu ili začepljenje crijeva; Oprez: sadrži galaktozu i laktozu; kod upala u predjelu stomaka i crijeva, kod poremećaja u ravnoteži elektrolita
35	A06AD11	lactulosum liquidum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 14 godina: 20,01 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 10,005 g; dojenčad: 3,335 g; hepaticka encefalopatija: 30,015 g	200 ml sirupa / 130 g	opstipacija, na koju se ne može dostatno utjecati hranom bogatom balastnim vlaknima kao ni drugim općim mjerama, te oboljenja kod kojih je nužno osigurati olakšano pražnjenje crijeva, prevencije i terapije portalne encefalopatije (tj. oštećenja mozga izazvanog kroničnim oboljenjima jetre, naročito cirozom jetre)	odrasli i djeca starija od 14 godina: 20,01 g; djeca od 7 do 14 godina: 10,005 g; djeca od 1 do 6 godina: 10,005 g; dojenčad: 3,335 g; hepaticka encefalopatija: 120,06 g	sve dobne skupine uključujući dojenčad	nije navedeno	Kontraindikacije: preosjetljivi na laktulozu ili laktulozi srodne šećere (laktoza, galaktoza), dijete bez galaktoze (ako bolujete od galaktozemije), iznenadna bol u trbuhu ili začepljenje crijeva; Oprez: sadrži galaktozu i laktozu; kod upala u predjelu stomaka i crijeva, kod poremećaja u ravnoteži elektrolita
36	A06AX01	glycerolum	rektalno	1,375 g	10 čepića / 13,75 g	kod povremene opstipacije i konstipacije te kada nije moguća primjena oralnih laksativa	1,375 g	djeca starija od 2 godine	7 dana	Kontraindikacije: analne fisure, fistule, hemoroidi, proktitis
37	A06AX01	glycerolum	rektalno	2.250 g	10 čepića / 22,5 g	kod povremene opstipacije i konstipacije te kada nije moguća primjena oralnih laksativa	4,5 g	odrasli	7 dana	Kontraindikacije: analne fisure, fistule, hemoroidi, proktitis

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
38	A07BA01	carbo activatus	kroz usta	3 g	30 tableta / 4,5 g	akutno trovanje unesenim lijekom ili otrovom (analgetici, antipiretici, sedativi, hipnotici, antiepileptici, triciklički antidepresivi, kardiotonični glikozidi, sulfonamidi, kinin, teofilin, nikotin); trovanje hranom; proljev; napuhnutost	18 g	odrasli i djeca starija od 3 godine	7 dana	Kontraindikacije: alergija na aktivni medicinski ugljen, ako postoji mogućnost peroralne primjene specifičnoga antidota; Oprez: u slučaju kroničnih bolesti, metaboličkih poremećaja, alergija ili terapija drugim lijekovima potrebno je konzultirati liječnika, pacijent mora biti pri svijesti (da ne dođe do udisanja čestica aktivnog ugljena), kod primjene oralnih kontraceptiva primijeniti drugi oblik zaštite od začeca, ne preporuča se kod trovanja mineralnim kiselinama ili lužinama, sredstvima za pranje, solima teških metala, metanolom, etanolom, etilen glikolom, ometa endoskopiju; Interakcije: istovremena primjena oralnih kontraceptiva, emetika, protuotrova razmak između uzimanja min. 2 sata, istovremena primjena sorbitola može dovesti do dehidracije, mlijeko, sladoled i sl. smanjuju djelovanje
39	A07BA01	carbo activatus	kroz usta	19,25 g	50 g / 19,25 g	akutno trovanje unesenim lijekom ili otrovom (analgetici, antipiretici, sedativi, hipnotici, antiepileptici, triciklički antidepresivi, kardiotonični glikozidi, sulfonamidi, kinin, teofilin, nikotin); trovanje hranom; proljev; napuhnutost	97,5 g	odrasli i djeca starija od 3 godine	7 dana	Kontraindikacije: alergija na aktivni medicinski ugljen, ako postoji mogućnost peroralne primjene specifičnoga antidota; Oprez: u slučaju kroničnih bolesti, metaboličkih poremećaja, alergija ili terapija drugim lijekovima potrebno je konzultirati liječnika, pacijent mora biti pri svijesti (da ne dođe do udisanja čestica aktivnog ugljena), kod primjene oralnih kontraceptiva primijeniti drugi oblik zaštite od začeca, ne preporuča se kod trovanja mineralnim kiselinama ili lužinama, sredstvima za pranje, solima teških metala, metanolom, etanolom, etilen glikolom, ometa endoskopiju; Interakcije: istovremena primjena oralnih kontraceptiva, emetika, protuotrova razmak između uzimanja min. 2 sata, istovremena primjena sorbitola može dovesti do dehidracije, mlijeko, sladoled i sl. smanjuju djelovanje
40	A07FA49	polirezistentne spore Bacillus clausii	kroz usta	2 000 000 000 polirezistentnih spora Bacillus clausii	12 kapsula / 24 milijarde polirezistentnih spora Bacillus clausii	liječenje i sprječavanje promjena crijevne bakterijske flore	6 000 000 000	sve dobne skupine osim dojenčadi	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari lijeka; Oprez: tijekom antibiotske terapije lijek primijeniti između dvije doze antibiotika
41	A07FA49	polirezistentne spore Bacillus clausii	kroz usta	2 000 000 000 polirezistentnih spora Bacillus clausii	100 ml oralne suspenzije / 40 milijardi polirezistentnih spora Bacillus clausii	liječenje i sprječavanje promjena crijevne bakterijske flore	6 000 000 000	sve dobne skupine uključujući dojenčad	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari lijeka; Oprez: tijekom antibiotske terapije lijek primijeniti između dvije doze antibiotika
42	A08AB01	orlistatum	kroz usta	60 mg	84 tvrdih kapsula / 5040 mg	za smanjenje tjelesne težine (ITM 28 i veći)	180 mg	odrasli-stariji od 18 godina	12 tjedana max. 6 mjeseci	Kontraindikacije: mlađi od 18 godina, trudnice i dojilje, terapija ciklosporinima, varfarinom ili drugim antikoagulansima, alergija na orlistat ili neku od pomoćnih tvari u sastavu lijeka, kolestaza, kronični malapsorpcijski sindrom; Oprez: dijabetes, bolest bubrega; Interakcije: oralni kontraceptivi, multivitaminski pripravci, amiodaron, akarboza, levotiroksin, antiepileptici, antihipertenzivi, antilipemici

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
43	A11DA01	thiaminum	kroz usta	100 mg	20 tableta / 1000 mg	za sprječavanje nedostatka vitamina B1 kod povećane potrebe (trudnoća, dojenje, dugotrajna povećana tjelesna aktivnost, stres, pojačani rad štitnjače, dugotrajne zarazne bolesti, jetrene ili crijevne bolesti, kronična hemodijaliza, prehrana pretežno ugljikohidratima, alkoholizam), liječenje beri-beri i wernickeova encefalopatija, bolesti nastale kao posljedica urođenih poremećaja metabolizma	300 mg	nije navedeno	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na tiamin ili pomoćne tvari; alkohol sprječava apsorpciju vitamina B1
44	A11GA01	acidum ascorbicum	kroz usta	1000 mg	20 šumećih tableta / 20000 mg	terapija bolesti koje su povezane s nedostatkom vitamina C	1000 mg	odrasli	po odluci liječnika	Kontraindikacije: alergija na askorbatnu kiselinu ili pomoćne tvari; Oprez: oksalatni bubrežni kamenci, nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, hemokromatoza, sideroblastična anemija, talasemija, sklonost stvaranja bubrežnih kamenaca, insuficijencija bubrega visokog stupnja, terminalna insuficijencija, dijeta siromašna natrijem; Interakcije: -
45	A11GA01	acidum ascorbicum	kroz usta	1000 mg	20 šumećih tableta / 20000 mg	terapija bolesti koje su povezane s nedostatkom vitamina C	1000 mg	odrasli	po odluci liječnika	Kontraindikacije: alergija na askorbatnu kiselinu ili pomoćne tvari; Oprez: oksalatni bubrežni kamenci, nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, hemokromatoza, sideroblastična anemija, talasemija, sklonost stvaranja bubrežnih kamenaca, insuficijencija bubrega visokog stupnja, terminalna insuficijencija, dijeta siromašna natrijem; Interakcije: -
46	A11GA01	acidum ascorbicum	kroz usta	1000 mg	20 šumećih tableta / 20000 mg	prevencija i liječenje skorbuta i manjka vitamina C u organizmu, u stanjima u kojima je povećana potreba za vitaminom C (trudnoća, dojenje, težak tjelesni rad, pušenje, stres, povišena tjelesna temperatura, zarazne bolesti, stanja nakon kirurških zahvata, neoplazme, tireotoksikoza, heemodijaliza, methemoglobinemija, sklonost krvarenju, rane i opekline koje sporo zacjeljuju, jednolična prehrana, umor i tromost u rano proljeće, dijetalna prehrana siromašna vitaminom C)	1000 mg	nije navedeno	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na askorbatnu kiselinu ili pomoćne tvari; Oprez: bubrežni kamenci, nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, hemokromatoza, sideroblastična anemija, anemija srpastih stanica, talasemija, dijabetes, dijeta siromašna natrijem; Interakcije: terapija željezom, varfarin, oralni kontraceptivi, antidijabetici, 48-72 sata prije laboratorijskih pretraga prestati uzimati lijek

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
47	A11GA01	acidum ascorbicum	kroz usta	1000 mg	20 šumećih tableta / 20000 mg	prevencija i liječenje skorbuta i manjka vitamina C u organizmu, u stanjima u kojima je povećana potreba za vitaminom C (trudnoća, dojenje, težak tjelesni rad, pušenje, stres, povišena tjelesna temperatura, zarazne bolesti, stanja nakon kirurških zahvata, neoplazme, tireotoksikoza, hemodijaliza methemoglobinemija, sklonost krvarenju, rane i opekline koje sporo zacjeljuju, uporaba nekih lijekova (barbiturati, primidon, salicilati), jednolična prehrana, umor i tromost u rano proljeće, dijetalna prehrana siromašna vitaminom C)	1000 mg	nije navedeno	nije navedeno	Kontraindikacije: /; Oprez: hiperoksalurija ili bubrežni kamenci, nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, hemokromatoza, sideroblastična anemija, talasemija, trudnice i dojilje preporučenu dnevnu dozu; Interakcije: terapija željezom, varfarin, oralni kontraceptivi, amfetamin, triciklički antidepresivi, utječe na rezultate laboratorijskih pretraga
48	A11GA01	acidum ascorbicum	kroz usta	100 mg	30 tableta / 1500 mg	prevencija i liječenje skorbuta i manjka vitamina C u organizmu	300 mg tjedan dana, nakon toga 100 mg	djeca	nekoliko tjedana	Kontraindikacije: alergija na askorbatnu kiselinu ili pomoćne tvari, bubrežni kamenci; Oprez: bubrežni kamenci, nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, hemokromatoza, sideroblastična anemija, anemija srpastih stanica-talasemija, dijabetes; Interakcije: terapija željezom, varfarin, deferoksamin, sulfonamidi, bortezonid, ciklosporin, oralni kontraceptivi, 48-72 sata prije laboratorijskih pretraga prestati uzimati lijek
49	A11GA01	acidum ascorbicum	kroz usta	skorbut 2 g; prevencija 500 mg	20 tableta / 10000 mg	prevencija i liječenje skorbuta i manjka vitamina C u organizmu	skorbut 2 g; prevencija 500 mg	odrasli	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na askorbatnu kiselinu ili pomoćne tvari, bubrežni kamenci; Oprez: bubrežni kamenci, nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, hemokromatoza, sideroblastična anemija, anemija srpastih stanica-talasemija, dijabetes, trudnice i dojilje preporučenu dnevnu dozu; Interakcije: terapija željezom, varfarin, deferoksamin, sulfonamidi, bortezonid, ciklosporin, oralni kontraceptivi, 48-72 sata prije laboratorijskih pretraga prestati uzimati lijek
50	A11GA01	acidum ascorbicum	kroz usta	500 mg	30 tableta / 15000 mg	prevencija i liječenje skorbuta i manjka vitamina C u organizmu	500 mg	odrasli	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na askorbatnu kiselinu ili pomoćne tvari, bubrežni kamenci; Oprez: bubrežni kamenci, nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, hemokromatoza, sideroblastična anemija, anemija srpastih stanica-talasemija, dijabetes, trudnice i dojilje preporučenu dnevnu dozu; Interakcije: terapija željezom, varfarin, deferoksamin, sulfonamidi, bortezonid, ciklosporin, oralni kontraceptivi, 48-72 sata prije laboratorijskih pretraga prestati uzimati lijek

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
51	B01AC06	acidum acetylsalicylicum	kroz usta	100 mg	30 tableta /3000 mg	smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s anginom pektoris, smanjenje rizika od dodatnog začepljenja srčanih arterija nakon srčanog udara, sprječavanje ponovne pojave tromboze nakon operacije krvnih žila, npr. ugradnje srčane prenosnice, sekundarna prevencija prolaznih smetnji moždane cirkulacije i moždanog udara, liječenje akutnog srčanog udara, smanjenje rizika od kardiovaskularnih incidenata (koji zahvaćaju srce i krvožilni sustav), kao što su angina pektoris ili srčani udar u bolesnika sa šećernom bolešću i visokim kardiovaskularnim rizikom	100 mg	kontraindikacije: djeca mlađa od 16 godina; 1. i 3. tromjeseč trudnoće; dojilje	Ø	Kontraindikacije: alergija na acetilsalicilatnu kiselinu i pomoćne tvari u lijeku, alergija na druge salicilate i slične tvari, gastrointestinalni ulkus, pojačana sklonost krvarenju (hemoragijska diateza), hemofilija, relativno smanjenje krvnih pločica u krvi (trombocitopenija), zatajenje bubrega, bubrežni kamenci, zatajenje jetre (teško oštećenje jetre), teško, nedostavno kontrolirano zatajenje srca (oštećenje srca), terapija metotreksatom (15 mg ili više tjedno), primjena kod djece, zadnja tri mjeseca trudnoće; Oprez: alergija na druge analgetike, antireumatike i protuupalne lijekove, druge alergije (npr. s kožnim reakcijama, svrbežom, urtikarijom), kod astme, peludne groznice, otjecanja sluznice nosa (nosni polipi) ili kroničnih bolesti dišnih putova, istovremena terapija lijekovima protiv zgrušavanja krvi (npr. derivatima kumarina, heparinom –osim terapije niskom dozom heparina), kod oboljelih od rijetkog metaboličkog poremećaja (genetski uvjetovan nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze), kod probavnih tegoba (npr. gastritis), ulkusne bolesti ili krvarenja iz probavnog trakta, oštećene funkciju jetre ili bubrega, prije kirurških postupaka (čak i vađenja zuba) jer vrijeme krvarenja može biti produljeno, kod primjene drugih salicilata ili protuupalnih lijekova, kod primjene
52	B01AC06	acidum acetylsalicylicum	kroz usta	300 mg	20 tableta / 2000 mg	za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s anginom pektoris, za smanjenje rizika od moždanog udara u bolesnika s tranzitornim ishemijskim atacima, sekundarna prevencija srčanog udara, sekundarna prevencija moždanog udara, prevencija tromboembolije, za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s jednim ili više rizičnih faktora za nastanak kardiovaskularnih bolesti	300 mg	odrasli i djeca starija od 16 godina	Ø	Kontraindikacije: primjena kod djece, alergija na acetilsalicilatnu kiselinu ili na pomoćne tvar, alergija na drugi nesteroidni protuupalni lijek, gastritis, želučani i duodenalni ulkus, pojačana sklonost krvarenju, giht, zadnje tromjesečje trudnoće, terapija metotreksatom u dozi 15 mg/tjedan ili većoj; Oprez: problemi s jetrom i bubrezima, bronhalna astma, trudnice i dojilje; Interakcije: antacidi, antiokagulansi, urikozurici, drugi nesteroidni protuupalni lijekovi i steroidi, oralni hipoglikemici iz skupine sulfonilureje, metotreksat valproična kiselina, ciklosporin, takrolimus, antihipertenzivni lijekovi, izbjegavati alkohol, prekinuti terapiju 5 dana prije operacijskog zahvata, ne preporuča se djeci mlađoj od 16 godina, trudnice po preporuci liječnika, dojiljama se ne preporuča

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
53	C04AX	suhi ekstrakt ginkova lista (35-67 : 1) s najmanje 24% flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi i najmanje 6% terpenskih laktona	kroz usta	120 mg	48 filmom obloženih tableta / 2880 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (35-67 : 1), što odgovara najmanje 14,4 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi i najmanje 3,6 mg terpenskih laktona; prvo ekstrakcijsko otapalo: etanol 70% V/V	kod poremećaja moždane cirkulacije i/ili poremećaja cirkulacije ruku i nogu koji se očituju simptomima: slabljenjem intelektualnih sposobnosti, oslabljenim pamćenjem i koncentracijom, omaglicom, šumom u ušima, glavoboljom, poremećajem spavanja, neraspoloženjem, osjećajem straha te trncima, osjećajem hladnoće, gubitkom osjeta u rukama i nogama te grčevima i bolovima u nogama pri hodanju	240 mg	odrasli	min 3 mjeseca	Kontraindikacije: alergija na ekstrakt ginka ili pomoćne tvari lijeka, primjena kod djece; Oprez: kod planiranog kirurškog zahvata potrebno je 36 sati prije prekinuti uzimanje lijeka zbog utjecaja ginka na zgrušavanje krvi; Interakcije: antikoagulantni i antiagregacijski lijekovi; ne preporuča se trudnicama i dojiljama zbog nedostatnih podataka o neškodljivosti primjene
54	C04AX	suhi ekstrakt ginkova lista (35-67 : 1) s najmanje 24% flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi i najmanje 6% terpenskih laktona	kroz usta	120 mg	72 filmom obloženih tableta / 4320 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (35-67 : 1), što odgovara najmanje 14,4 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi i najmanje 3,6 mg terpenskih laktona; prvo ekstrakcijsko otapalo: etanol 70% V/V	kod poremećaja moždane cirkulacije i/ili poremećaja cirkulacije ruku i nogu koji se očituju simptomima: slabljenjem intelektualnih sposobnosti, oslabljenim pamćenjem i koncentracijom, omaglicom, šumom u ušima, glavoboljom, poremećajem spavanja, neraspoloženjem, osjećajem straha te trncima, osjećajem hladnoće, gubitkom osjeta u rukama i nogama te grčevima i bolovima u nogama pri hodanju	240 mg	odrasli	min 3 mjeseca	Kontraindikacije: alergija na ekstrakt ginka ili pomoćne tvari lijeka, primjena kod djece; Oprez: kod planiranog kirurškog zahvata potrebno je 36 sati prije prekinuti uzimanje lijeka zbog utjecaja ginka na zgrušavanje krvi; Interakcije: antikoagulantni i antiagregacijski lijekovi; ne preporuča se trudnicama i dojiljama zbog nedostatnih podataka o neškodljivosti primjene
55	C05BA03	heparinum	za kožu	∅	100 g / 100 000 IU	površinski tromboflebitis	∅	za odrasle	nije navedeno	Kontraindikacije: djeca, u slučaju krvarenja, otvorene rane, ne nanositi na sluznicu niti na inficirana mjesta u slučaju gnojnih procesa; Oprez: sadrži parabene
56	C05BA03	heparinum natricum	za kožu	∅	25 g otopine / 60 000 IU	upale površinskih vena, tromboflebitisa i pratećih simptoma proširenih vena	∅	odrasli i djeca starija od 2 godine	14 dana	Ne nanositi na područje oko očiju, nosa i usta
57	C05CA04	troxerutinum	kroz usta	300 mg	50 kapsula / 15 000 mg	simptomatsko liječenje oslabljene venske i limfne cirkulacije te za ublažavanje simptoma povezanih sa hemoroidima (oticanje, svrbež, krvarenje, curenje)	1200 mg	nije navedeno	7-10 dana	Kontraindikacije: alergija na trokserutin ili pomoćne tvari u lijeku, bolesnici s nasljednim poremećajem nepodnošljivosti galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze-galaktoze; Oprez: ne preporuča se u prvom tromjesečju trudnoće

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
58	D01AC01	clotrimazolum	za kožu	∅	20 g / 200 mg	gljivične infekcije stopala i ruku, kože na trupu, udovima, kožnim pregibima i u preponama, gljivične infekcije kože nazvane pityriasis versicolor, infekcije vanjskih spolnih organa gljivicama iz roda Candida u žena i muškaraca, bakterijske infekcije kože nazvane eritrazma	∅	nije navedeno	4 + 2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na klotrimazol ili neku pomoćnu tvar; Oprez: smanjuje efikasnost kontracepcijskih sredstva od lateksa (npr. dijafragma ili kondom); Trudnice u prva tri mjeseca trudnoće po preporuci liječnika
59	D01AC01	clotrimazolum	za kožu	∅	30 g / 300 mg	gljivične infekcije stopala i ruku, kože na trupu, udovima, kožnim pregibima i u preponama, gljivične infekcije kože nazvane pityriasis versicolor, bakterijske infekcije kože nazvane eritrazma	∅	nije navedeno	4 tjedna	Kontraindikacije: alergija na klotrimazol ili neku pomoćnu tvar; Oprez: izbjegavati kontakt s očima, trudnice u prva tri mjeseca trudnoće po preporuci liječnika
60	D01AC01	clotrimazolum	za kožu	∅	20 ml / 200 mg	gljivične infekcije stopala i ruku, kože na trupu, udovima, kožnim pregibima i u preponama, gljivične infekcije kože nazvane pityriasis versicolor, bakterijske infekcije kože nazvane eritrazma	∅	nije navedeno	4 + 2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na klotrimazol ili neku pomoćnu tvar; Oprez: izbjegavati kontakt s očima, trudnice u prva tri mjeseca trudnoće po preporuci liječnika
61	D01AC08	ketoconazolum	na vlasište	∅	100 ml šampona	za liječenje i sprječavanje peruti i nekih gljivičnih bolesti kože (Pityriasis versicolor i seboroični dermatitis)	∅	odrasli i djeca starija od 12 godina	4 tjedna	Trudnice, dojilje i djeca mlađa od 12 godina po savjetu liječnika
62	D01AC08	ketoconazolum	na vlasište	∅	100 ml šampona	za liječenje i sprječavanje peruti i nekih gljivičnih bolesti kože (Pityriasis versicolor i seboroični dermatitis)	∅	nije navedeno	4 tjedna	Trudnice i dojilje po savjetu liječnika
63	D02AE01	ureum	za kožu	∅	50 g kreme / 6 g	za liječenje suhe kože kod atopijskog dermatitisa, kod starenja kože, za liječenje ihtioze	∅	nije navedeno	po preporuci liječnika	Kontraindikacije: alergija na ureu ili pomoćne tvari u lijeku, razgrebana koža, akutni dermatitis, velika površina kože, bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega; Interakcije: kortikosteroidi, ditranol, 5-fluorouracil;

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
64	D03AX03	dexpanthenolum	za kožu	∅	25 g / 1250 mg	lokalno, kod mehaničkih oštećenja kože - ogrebotina, hiperkeratoze, manjih oštećenja, nakon kirurških zahvata i opekлина, smanjuje svrbež i poboljšava zarastanje blažih dermatozā, u djece primjena kod ogrebotina i blažih kožnih nadražaja uzrokovanih suncem, ultraljubičastim ili rendgenskim zračenjem	∅ 2-3 x dnevno, po potrebi češće	nije navedeno (sve dobne skupine)	∅	Izbjegavati kontakt s očima
65	D03AX03	dexpanthenolum	za kožu	∅	25 g / 1250 mg	lokalno, kod mehaničkih oštećenja kože - ogrebotina, hiperkeratoze, manjih oštećenja, nakon kirurških zahvata i opekлина, smanjuje svrbež i poboljšava zarastanje blažih dermatozā, u djece primjena kod ogrebotina i blažih kožnih nadražaja uzrokovanih suncem, ultraljubičastim ili rendgenskim zračenjem	∅ 2-3 x dnevno, po potrebi češće	nije navedeno (sve dobne skupine)	∅	Izbjegavati kontakt s očima
66	D04AA09	chloropyraminum	za kožu	∅	20 g / 200 mg	lokalni anestetik kod uboda insekata i svrbeža	∅	sve dobne skupine	3 dana	Kontraindikacije: inficirana i vlažna koža; Oprez: nanositi u tankom sloju, trudnice i dojilje koristiti što kraće, ne koristiti na velikim površinama kože, moguća fotosjetljivost
67	D04AA13	dimetindenum	za kožu	∅	30 g / 30 mg	ublažavanje svrbeža povezanog sa osipom, urtikarijom, ubodima insekata, sunčanim i površinskim opekotinama	∅	nije navedeno	nije navedeno	Oprez: izbjegavati dugotrajno izlaganje suncu veće površine kože namazane gelom, ne nanositi na veće površine kože kod dojenčadi i male djece pogotovo ako postoje otvorene rane ili je koža upaljena
68	D06AX08	tyrothricinum	za kožu	∅	5 g gela / 5 mg	lokalni antibiotik za liječenje manjih, površinskih, umjereno vlažnih rana	∅	nije navedeno	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na trokserutin ili pomoćne tvari u lijeku; Oprez: trudnice i dojilje ne bi trebale primjenjivati
69	D06AX08	tyrothricinum	za kožu	∅	5 g praška / 5 mg	lokalni antibiotik za liječenje manjih, površinskih, umjereno vlažnih rana	∅	nije navedeno	7 dana nakon povlačenja simptoma, za slučaj pogoršanja simptoma ili izostanka pozitivnog odgovora tijekom prvih 7 dana- obratiti se liječniku	Kontraindikacije: alergija na trokserutin ili pomoćne tvari u lijeku; Oprez: trudnice i dojilje primjenjivati po preporuci liječnika na maloj površini i kratko vrijeme

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
70	D06BB03	aciclovirum	na koži	∅	2 g kreme / 100 mg	za liječenje "groznice" (herpes labialis), infekcije kože uzrokovane Herpes simplex virusom	∅	odrasli i djeca	min. 4 dana max 10 dana	Kontraindikacije: alergija na aciklovir ili pomoćnu tvar lijeka, ne upotrebljava se za liječenje herpes infekcija oka ili spolnih organa te primjena na mukoznim membranama; Oprez: trudnice, ako "groznica" poprimi teži oblik, nakon transplantacije koštane srži, liječeni od neke maligne bolesti, oboljeli od AIDS-a
71	D06BB03	aciclovirum	na koži	∅	2 g kreme / 100 mg	infekcije usana i lica uzrokovanih virusom Herplex simplex (ponavljani herpes labialis)	∅	odrasli i djeca	min 5 dana max 10 dana	Kontraindikacije: alergija na aciklovir, valaciklovir, propilen glikol, ne upotrebljava se za liječenje herpes infekcija oka ili spolnih organa te primjena na mukoznim membranama, ne preporuča se osobama s oslabljenim imunitetom; trudnice i dojilje po preporuci liječnika
72	D08AG02	povidonum iodinum	za kožu	∅	1000 ml otopine / 100 g	dezinfekcija i sprječavanje infekcija na koži, terapijska obrada rana, terapijsko i profilaktičko ispiranje mjehura crijeva, pleuralno, peritonealno i vaginalno ispiranje	∅	sve dobne skupine osim novorođenčadi	dok postoji infekcija ili opasnost od infekcije	Kontraindikacije: alergija na povidon jodirani ili jodide, hipertiroidizam, dermatitis herpetiformis-Duhring, prije i nakon radioterapije; Oprez: pacijenti s litijskom terapijom, opekline, velike i otvorene rane, novorođenčad niske porođajne težine, pacijenti sa zatajenjem bubrega i jetre, bolestima štitnjače, djeca-kontrolirati funkciju štitnjače, prekid u liječenju 1-2 tjedna prije tiroidnih ispitivanja, trudnice i dojilje po preporuci liječnika (moguće promjene u funkciji štitnjače novorođenčadi); Interakcije: klorheksidin, srebro-sulfadiazin, lužine, živa, preparati litija, benzojeva tinktura
73	D08AG02	povidonum iodinum	za kožu	∅	1000 ml otopine / 75 g	antiseptičko čišćenje kože prije operacija i pranje kirurga i ostalog osoblja	∅	sve dobne skupine osim novorođenčadi	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na povidon jodirani ili jodide, hipertiroidizam, dermatitis herpetiformis-Duhring, prije i nakon radioterapije; Oprez: pacijenti s litijskom terapijom, opekline, pacijenti sa zatajenjem bubrega i jetre, bolestima štitnjače, djeca i novorođenčad-kontrolirati funkciju štitnjače, prekid u liječenju 1-2 tjedna prije tiroidnih ispitivanja, trudnice i dojilje po preporuci liječnika (moguće promjene u funkciji štitnjače novorođenčadi); Interakcije: klorheksidin, srebro-sulfadiazin, lužine, živa, preparati litija, benzojeva tinktura
74	D11AB58	paraffinum liquidum	za kupanje	∅	200 ml otopine / 96 g	emolijens i protektiv kod suhih i ljuskajućih dermatitisa: psorijaza i atopijski dermatitis (endogeni ekcem)	∅	sve dobne skupine	4 tjedna	Kontraindikacije: alergija na djelatnu ili pomoćne tvari, bolesnici s povišenom tjelesnom temperaturom, teškim srčanim ili vaskularnim poremećajem (visoki krvni tlak)
75	D11AX01	minoxidilum	za kožu	20 mg	60 ml otopine / 1200 mg	liječenje androgene ćelavosti u muškaraca i žena u dobi između 18 i 65 godina	40 mg	odrasli muškarci i žene od 18 do 65 godina	4 mjeseca do 1 godine	Kontraindikacije: alergija na minoksidil ili pomoćne tvari, povišeni krvni tlak (liječeni i neliječeni), kožne promjene na vlasištu (uključujući psorijazu i opekline od sunca), obrijano vlasište, istovremena primjena okluzivnih zavoja ili drugog lijeka za lokalnu primjenu; Oprez: nanositi na neoštećeno i zdravo vlasište, srčana bolest ili srčana aritmija; Interakcije: lijekovi za lokalnu primjenu (kortikosteroidi, tretinoin, ditranol, vazelin, periferni vazodilatatori; ne preporuča se trudnicama i dojiljama te mlađima od 18 i starijima od 65 godina

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
76	D11AX01	minoxidilum	za kožu	50 mg	60 ml otopine / 3000 mg	liječenje androgene ćelavosti u muškaraca u dobi između 18 i 65 godina	100 mg	odrasli muškarci od 18 do 65 godina	2 mjeseca do 1 godine	Kontraindikacije: primjena u žena, alergija na minoksidil ili pomoćne tvari, povišeni krvni tlak (liječeni i neliječeni), kožne promjene na vlasištu (uključujući psorijazu i opekline od sunca), obrijano vlasište, istovremena primjena okluzivnih zavoja ili drugog lijeka za lokalnu primjenu; Oprez: nanositi na neoštećeno i zdravo vlasište, srčana bolest ili srčana aritmija; Interakcije: lijekovi za lokalnu primjenu (kortikosteroidi, tretinoin, ditranol, vazelin, periferni vazodilatatori; ne preporuča se trudnicama i dojiljama te mlađima od 18 i starijima od 65 godina
77	D11AX01	minoxidilum	za kožu	20 mg	60 ml / 1200 mg	liječenje androgene ćelavosti u muškaraca i žena u dobi između 18 i 65 godina	40 mg	odrasli muškarci i žene od 18 do 65 godina	4 mjeseca do 1 godine	Kontraindikacije: alergija na minoksidil ili pomoćne tvari, povišeni krvni tlak (liječeni i neliječeni), kožne promjene na vlasištu (uključujući psorijazu i opekline od sunca), obrijano vlasište, istovremena primjena okluzivnih zavoja ili drugog lijeka za lokalnu primjenu; Oprez: nanositi na neoštećeno i zdravo vlasište, srčana bolest ili srčana aritmija; Interakcije: lijekovi za lokalnu primjenu (kortikosteroidi, tretinoin, ditranol, vazelin, periferni vazodilatatori; ne preporuča se trudnicama i dojiljama te mlađima od 18 i starijima od 65 godina
78	D11AX01	minoxidilum	za kožu	50 mg	60 ml otopine / 3000 mg	liječenje androgene ćelavosti u muškaraca u dobi između 18 i 65 godina	100 mg	odrasli muškarci od 18 do 65 godina	2 mjeseca do 1 godine	Kontraindikacije: primjena u žena, alergija na minoksidil ili pomoćne tvari, povišeni krvni tlak (liječeni i neliječeni), kožne promjene na vlasištu (uključujući psorijazu i opekline od sunca), obrijano vlasište, istovremena primjena okluzivnih zavoja ili drugog lijeka za lokalnu primjenu; Oprez: nanositi na neoštećeno i zdravo vlasište, srčana bolest ili srčana aritmija; Interakcije: lijekovi za lokalnu primjenu (kortikosteroidi, tretinoin, ditranol, vazelin, periferni vazodilatatori; ne preporuča se trudnicama i dojiljama te mlađima od 18 i starijima od 65 godina
79	G01AD01	acidum (S)-lacticum, natrii lactatis solutio	u rodnicu	207 mg	7 vagitorija / 280 mg	lakši i srednje teški kronični ili recidivirajući vaginitis (bakterijske vaginoze i nespecifični vaginitis)	207 mg	odrasli	5-7 dana	Kontraindikacija: preosjetljivost na laktatnu kiselinu; primjena kod djece po preporuci liječnika

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
80	G01AF02	clotrimazolum	u rodnicu + za kožu	500 mg + Ø	1 tableta / 500 mg, 20 g kreme / 200 mg	za liječenje infekcija spolnih organa (vaginitisa) koje uzrokuju gljivice (iz roda kvasnica Candida), za liječenje infekcija spolnih organa koje izazove parazit Trichomonas vaginalis u kombinaciji s drugim peroralnim lijekovima koje propiše liječnik, za liječenje infekcija koje se javljaju nakon prethodne infekcije, obično zbog invazije gljivica ili bakterija otpornih na primijenjeni lijek (tzv. superinfekcije) liječenje infekcija stidnih usana i predjela oko njih (kandidni vulvitis), liječenje upale glavića i kožice muškog uda (kandidni balanitis)	500 mg + Ø	žene i djevojke starije od 12 godina	7 dana	Kontraindikacije: alergija na clotrimazol ili neku pomoćnu tvar, primjena za vrijeme menstruacije; Oprez: smanjuje efikasnost kontracepcijskih sredstva od lateksa (npr. dijafragma ili kondom), terapiju završiti prije početka menstruacije, trudnice u prva tri mjeseca po preporuci liječnika
81	G01AF02	clotrimazolum	u rodnicu	500 mg	1 tableta za rodnicu / 500 mg	za liječenje infekcija spolnih organa (vaginitisa) koje uzrokuju gljivice (iz roda kvasnica Candida), za liječenje infekcija spolnih organa koje izazove parazit Trichomonas vaginalis u kombinaciji s drugim peroralnim lijekovima koje propiše liječnik, za liječenje infekcija koje se javljaju nakon prethodne infekcije, obično zbog invazije gljivica ili bakterija otpornih na primijenjeni lijek (tzv. superinfekcije)	500 mg	žene i djevojke starije od 12 godina	7 dana	Kontraindikacije: alergija na clotrimazol ili neku pomoćnu tvar, primjena za vrijeme menstruacije; Oprez: smanjuje efikasnost kontracepcijskih sredstva od lateksa (npr. dijafragma ili kondom), terapiju završiti prije početka menstruacije, trudnice u prva tri mjeseca po preporuci liječnika
82	G01AF02	clotrimazolum	u rodnicu + za kožu	200 mg + Ø	3 tablete / 600 mg, 20 g kreme / 200 mg	za liječenje infekcija spolnih organa (vaginitisa) koje uzrokuju gljivice (iz roda kvasnica Candida), za liječenje infekcija spolnih organa koje izazove parazit Trichomonas vaginalis u kombinaciji s drugim peroralnim lijekovima koje propiše liječnik, za liječenje infekcija koje se javljaju nakon prethodne infekcije, obično zbog invazije gljivica ili bakterija otpornih na primijenjeni lijek (tzv. superinfekcije), kandidni vulvitis, kandidni balanitis	200 mg + Ø	odrasli i djeca starija od 12 godina	7 dana	Kontraindikacije: alergija na clotrimazol ili neku pomoćnu tvar, primjena za vrijeme menstruacije; Oprez: smanjuje efikasnost kontracepcijskih sredstva od lateksa (npr. dijafragma ili kondom), terapiju završiti prije početka menstruacije, trudnice u prva tri mjeseca po preporuci liječnika, Interakcije: takrolimus

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
83	G01AF02	clotrimazolom	u rodnicu	Ø	20 g / 400 mg	za liječenje infekcija spolnih organa (vaginitisa) koje uzrokuju gljivice (iz roda kvasnica Candida), za liječenje infekcija spolnih organa koje izazove parazit Trichomonas vaginalis u kombinaciji s drugim peroralnim lijekovima koje propiše liječnik, za liječenje infekcija koje se javljaju nakon prethodne infekcije, obično zbog invazije gljivica ili bakterija otpornih na primijenjeni lijek (tzv. superinfekcije), kandidni vulvitis, kandidni balanitis	Ø	odrasli i djeca starija od 12 godina	7 dana	Kontraindikacije: alergija na klotrimazol ili neku pomoćnu tvar, primjena za vrijeme menstruacije; Oprez: smanjuje efikasnost kontracepcijskih sredstva od lateksa (npr. dijafragma ili kondom), terapiju završiti prije početka menstruacije, trudnice u prva tri mjeseca po preporuci liječnika
84	G01AF02	clotrimazolom	u rodnicu	200 mg	3 tablete / 600 mg	za liječenje infekcija spolnih organa (vaginitisa) koje uzrokuju gljivice (iz roda kvasnica Candida), za liječenje infekcija spolnih organa koje izazove parazit Trichomonas vaginalis u kombinaciji s drugim peroralnim lijekovima koje propiše liječnik, za liječenje infekcija koje se javljaju nakon prethodne infekcije, obično zbog invazije gljivica ili bakterija otpornih na primijenjeni lijek (tzv. superinfekcije), kandidni vulvitis, kandidni balanitis	200 mg	žene i djevojke starije od 12 godina	7 dana	Kontraindicirano u vrijeme menstruacije; Oprez: smanjuje efikasnost kontracepcijskih sredstva od lateksa (npr. dijafragma ili kondom), terapiju završiti prije početka menstruacije, trudnice u prva tri mjeseca po preporuci liječnika
85	G02CX	suhi ekstrakt iz Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (podanak Cimicifuge) (4,5-8,5 : 1; ekstrakcijsko otapalo: etanol 60 % V/V)	kroz usta	6,5 mg	30 filmom obloženih tableta / 195 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (podanak Cimicifuge) (4,5-8,5 : 1; ekstrakcijsko otapalo: etanol 60 % V/V)	za ublažavanje tegoba uzrokovanih menopauzom (kao što su navale vrućine ili pojačano znojenje)	6,5 mg	odrasle osobe ženskog spola	3 mjeseca	Kontraindikacije: alergija na ekstrakte podanka biljke Cimicifuga racemosa ili neke druge pomoćne tvari lijeka, pacijenti liječeni ili se upravo liječe zbog karcinoma dojke ili neke druge tumorske bolesti; Oprez: ako se pojave znakovi i simptomi oštećenja jetre (umor, gubitak teka, žutilo kože i bjeloočnica ili jaki bolovi u žličici praćeni mučninom i povraćanjem ili tamna mokraća), treba odmah prekinuti uzimanje lijeka i obratiti se liječniku, kod pojave krvarenje iz rodnice ili razvijanja novih ili nejasnih simptoma, treba se posavjetovati s liječnikom, estrogenske pripravke uzimati istodobno samo uz liječnički nadzor, budući lijek može pojačati njihovo djelovanje

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
86	G04CX02	Sabalıs serrulatae extractum spissum	kroz usta	320 mg	60 kapsula / 19 200 mg ekstrakta (kao gusti ekstrakt) iz <i>Serenoa repens</i> (Bartram) Small. (Sabal serrulata (Michaux) Nichols), fructus (sabalov plod) (9-11 : 1) što odgovara najmanje 80 mg oleatne kiseline i najmanje 0,48 mg ukupnih fitosterola; ekstrakcijsko otapalo: etanol 96% V/V	ublažava smetnje mokrenja izazvane prekomjernim povećanjem prostate (benigna hiperplazija prostate)	320 mg	odrasli, muškog spola	4 - 6 tjedana	Kontraindikacije: alergija na ekstrakt sabalovog ploda ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, primjena kod žena i djece; Oprez: kod pojave krvi u mokraći ili nemogućnosti uriniranja prekinuti terapiju i obratiti se liječniku, lijek ne utječe na veličinu prostate te je potrebno provoditi redovne liječničke kontrole
87	G04CX02	sabalıs serrulatae fructi extractum spissum	kroz usta	320 mg	15 kapsula / 4 800 mg žitkog ekstrakta iz <i>Serenoa repens</i> (Bartram) Small. (Sabal serrulata (Michaux) Nichols), fructus (Sabalov plod) (9-11 : 1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 96% V/V.	teškoće pri pražnjenju mjehura kod benignog povećanja prostate stupnja I (tegobe kod mokrenja, ali je još uvijek moguće potpuno pražnjenje mokraćnog mjehura) i stupnja II (potpuno pražnjenje mokraćnog mjehura nije više moguće, zaostaje više od 50 ml mokraće u mokraćnom mjehuru)	320 mg	nije navedeno	4 tjedna	Kontraindikacije: nisu poznate; Oprez: lijek ublažava tegobe, ali ne smanjuje hipertrofiju prostate
88	G04CX02	sabalıs serrulatae fructi extractum spissum	kroz usta	320 mg	60 kapsula / 19 200 mg žitkog ekstrakta iz <i>Serenoa repens</i> (Bartram) Small. (Sabal serrulata (Michaux) Nichols), fructus (Sabalov plod) (9-11 : 1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 96% V/V.	teškoće pri pražnjenju mjehura kod benignog povećanja prostate stupnja I (tegobe kod mokrenja, ali je još uvijek moguće potpuno pražnjenje mokraćnog mjehura) i stupnja II (potpuno pražnjenje mokraćnog mjehura nije više moguće, zaostaje više od 50 ml mokraće u mokraćnom mjehuru)	320 mg	nije navedeno	4 tjedna	Kontraindikacije: nisu poznate; Oprez: lijek ublažava tegobe, ali ne smanjuje hipertrofiju prostate

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
89	G04CX02	sabalis serrulatae fructi extractum spissum	kroz usta	320 mg	30 kapsula / 9 600 mg žitkog ekstrakta iz <i>Serenoa repens</i> (Bartram) Small. (<i>Sabal serrulata</i> (Michaux) Nichols), fructus (Sabalov plod) (9-11 : 1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 96% V/V.	teškoće pri pražnjenju mjehura kod benignog povećanja prostate stupnja I (tegobe kod mokrenja, ali je još uvijek moguće potpuno pražnjenje mokraćnog mjehura) i stupnja II (potpuno pražnjenje mokraćnog mjehura nije više moguće, zaostaje više od 50 ml mokraće u mokraćnom mjehuru)	320 mg	nije navedeno	4 tjedna	Kontraindikacije: nisu poznate; Oprez: lijek ublažava tegobe, ali ne smanjuje hipertrofiju prostate
90	L03AW05	suhi istisnuti sok iz <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench, herba recens	kroz usta	186 mg	50 ml otopine / 2325 mg suhog istisnutog soka iz <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench, herba recens (svježa zelen purpurne rudbekije (30 - 60 : 1)	sprječavanje i liječenje prehlade	372 mg suhog ekstrakta	odrasli i djeca starija od 12 godina	10 dana (pauza 14 dana do ponovne primjene)	Kontraindikacije: alergija na biljke iz porodice glavočika cjevnjače kao što su kamilica, arnika, neven stolisnik ili na pomoćne tvari u lijeku, tuberkuloza, leukemije, kolagenoze, multipla skleroza, AIDS ili HIV-infekcije, autoimune bolesti, imunosupresivna terapija, djeca mlađa od 1 godine; Oprez: pogoršanje stanja ili pojava temperature, naslijedna sklonost alergijama, ne preporuča se djeci od 1-12 godina (nije dokazana učinkovitost u toj dobi); Interakcije: ne preporuča se primjena istovremeno s imunosupresivnim lijekovima (ciklosporini, metotreksat); trudnice i dojilje po preporuci liječnika
91	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	400 mg	10 tableta / 2000 mg	ublažavanje menstrualnih bolova	1200 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	3 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili neki od sastojaka lijeka, acetilsalicilnu kiselinu ili drugi nesteroidni protuupalni lijek, čir na želucu ili krvarenje u probavnom sustavu, teško jetreno, bubrežno ili srčano zatajenje, djeca mlađa od 12 godina; oprez kod: bronhalne astme ili alergijskih bolesti, poremećaja probavnog sustava ili funkcije jetre ili bubrega; potražiti savjet liječnika ili ljekarnika kod problema sa srcem, prethodno doživljenog moždanog udara ili kod povećanog rizika za ova stanja (npr. povišeni krvni tlak, šećerna bolest, visoke vrijednosti kolesterola u krvi, pušači)

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
92	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	400 mg	20 šumećih tableta / 4000 mg	ublažavanje i uklanjanje blagih i umjerenih bolova (glavobolja, bolovi u mišićima, zubobolja, menstrualni bolovi i druga bolna stanja) te za snižavanje povišene tjelesne temperature	1200 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	3-5 dana; max. 10 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili neki od ostalih sastojaka lijeka, astma ili alergija na nesteroidne protuupalne lijekove ili acetilsalicilatnu kiselinu, krvarenja ili perforacija u probavnom sustavu, aktivni, kronični ili hemoragični ulkus želuca i/ili dvanaesnika, ulcerozni kolitis i Crohnova bolest, ozbiljne bolesti jetre i bubrega, teško zatajenje srca, stanje prije i nakon operacija na srcu, sistemski lupus erythematosus, treće tromjesečje trudnoće, dojenje; Oprez: astma uz kronični rinitis, sinusitis i nosni polip, lijekovi protiv zgrušavanja krvi, bolesti srca (zastojna srčana insuficijencija, preboljeli infarkt srca, ishemijska bolest srca), poremećena funkcija jetre i bubrega, nereguliran povišen krvni tlak, preboljeli moždani udar, bolest perifernih arterija, povišenu koncentraciju masnoća u krvi, šećerna bolest, pušači, trudnoća i dojenje, čir na želucu ili dvanaesniku; ne preporuča se istovremeno uzimanje uz terapiju 100 mg preparatima acetilsalicilatne kiseline
93	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	djeca od 3 mjeseca do 12 godina: 50 mg 300 mg; odrasli 400 mg	100 ml sirupa / 2000 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature uslijed obične prehlade, gripe i drugih upalnih bolesti, ublažavanje blagih do srednje jakih bolova i tegobe uslijed obične prehlade, gripe i upalnih bolesti (primjerice grlobolja, uhololja), glavobolja, bol uslijed ozljede (iščašenja, uganuća) zubobolja, bol pri nicanju zubi, menstruacijska bol i bol kod predmenstruacijskog sindroma (primarna dismenoreja), bolovi reumatskog podrijetla (lumbago, artritis i drugo)	djeca od 3 mjeseca do 12 godina: 150 mg-900 mg; odrasli 1200 mg	djeca starija od 3 mjeseca i odrasli	djeca od 3-6 mjeseci 24 sata; djeca starija od 6 mjeseci 3 dana; druge dobne skupine 5-7 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili neki od ostalih sastojaka lijeka, alergija na nesteroidne protuupalne lijekove ili acetilsalicilatnu kiselinu, preboljeli ili akutni čir na želucu ili dvanaesniku, krvarenje iz probavnog sustava, krvarenje iz probavnog sustava kod prethodnog uzimanja nestroidnih protuupalnih lijekova, teško srčano zatajenje, teški poremećaj funkcije bubrega i/ili jetre, posljednje tromjesečje trudnoće; Oprez: javiti se liječniku u slučaju: pojave bolova ili krvarenja iz probavnog sustava, pojavljivanja promjena na koži i sluznici, kod ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti, alergijske bolesti i astma, kod sistemskog eritemskog lupusa, moždanog udara, srčanih tegoba, povišenog krvnog tlaka, dijabetesa, povišenog kolesterola, starijih od 65 godina, trudnice u prvih 6 mjeseci trudnoće; Interakcije: analgetici, antihipertenzivi, diuretici, antikoagulansi, antitrombotici, digoksin, kortikosteroidi, fenitoin, litij, metotreksat, ciklosporin, takrolimus, mifepriстон, zidovudin, kinilinski antibiotici, acetilsalicilatna kis., antidepressivi

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
94	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	400 mg	30 tableta / 6000 mg	za kratkotrajno ublažavanje blagih do srednje jakih bolova različitog porijekla: glavobolje, uključujući i migrenu, bolova u leđima, mišićima i/ili zglobovima, zubobolje, bolova koji potječu od živaca (neuralgija), menstrualnih bolova i bolova kod predmenstrucijskog sindroma te bolova reumatskog porijekla. za ublažavanje tegoba uslijed obične prehlade i gripe te za snižavanje povišene tjelesne temperature	1200 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	ublažavanje boli 10 dana, za snižavanje tjelesne temperature 3 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili neki od ostalih sastojaka lijeka, alergija na nesteroidne protuupalne lijekove ili acetilsalicilatnu kiselinu, preboljeli ili akutni čir na želucu ili dvanaesniku, krvarenje iz probavnog sustava, krvarenje iz probavnog sustava kod prethodnog uzimanja nesteroidnih protuupalnih lijekova, teško srčano zatajenje, teški poremećaj funkcije bubrega i/ili jetre, posljednje tromjesečje trudnoće; Oprez: javiti se liječniku u slučaju: pojave bolova ili krvarenja iz probavnog sustava, pojavljivanja promjena na koži i sluznici, kod ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti, alergijske bolesti i astma, kod sistemskog eritemskog lupusa, moždanog udara, srčanih tegoba, povišenog krvnog tlaka, dijabetesa, povišenog kolesterola, starijih od 65 godina, trudnice u prvih 6 mjeseci trudnoće; Interakcije: analgetici, antihipertenzivi, diuretici, antikoagulansi, antitrombotici, digoksin, kortikosteroidi, fenitoin, litij, metotreksat, ciklosporin, takrolimus, mifepriston, zidovudin, kinilinski antibiotici, acetilsalicilatna kis., antidepresivi
95	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	400 mg	10 tableta / 2000 mg	za kratkotrajno ublažavanje blagih do srednje jakih bolova različitog porijekla: glavobolje, uključujući i migrenu, bolova u leđima, mišićima i/ili zglobovima, zubobolje, bolova koji potječu od živaca (neuralgija), menstrualnih bolova i bolova kod predmenstrucijskog sindroma te bolova reumatskog porijekla. za ublažavanje tegoba uslijed obične prehlade i gripe te za snižavanje povišene tjelesne temperature	1200 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	ublažavanje boli 10 dana, za snižavanje tjelesne temperature 3 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili neki od ostalih sastojaka lijeka, alergija na nesteroidne protuupalne lijekove ili acetilsalicilatnu kiselinu, preboljeli ili akutni čir na želucu ili dvanaesniku, krvarenje iz probavnog sustava, krvarenje iz probavnog sustava kod prethodnog uzimanja nesteroidnih protuupalnih lijekova, teško srčano zatajenje, djeca mlađa od 12 godina; Oprez: kod povišenog krvnog tlaka, teže srčane bolesti, poremećaj rada jetre, bubrega i srca, ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti, astme, starijih od 65 godina, trudnice po preporuci liječnika; Interakcije: analgetici, antihipertenzivi, diuretici, antikoagulansi, kortikosteroidi, litij, metotreksat, ciklosporin, aminoglikozidni antibiotici, acetilsalicilatna kis., antidepresivi, probenecid

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
96	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	400 mg	10 tableta / 4000 mg	za kratkotrajno ublažavanje blagih do srednje jakih bolova različitog porijekla: glavobolje, uključujući i migrenu, bolova u leđima, mišićima i/ili zglobovima, zubobolje, bolova koji potječu od živaca (neuralgija), menstrualnih bolova i bolova kod predmenstrucijskog sindroma te bolova reumatskog porijekla. za ublažavanje tegoba uslijed obične prehlade i gripe te za snižavanje povišene tjelesne temperature	1200 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina, djeca mlađa od 12 godina po preporuci liječnika	ublažavanje boli 10 dana, za snižavanje tjelesne temperature 3 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili neki od ostalih sastojaka lijeka, alergija na nesteroidne protuupalne lijekove ili acetilsalicilatnu kiselinu, preboljeli ili akutni čir na želucu ili dvanaesniku, krvarenje iz probavnog sustava, krvarenje iz probavnog sustava kod prethodnog uzimanja nesteroidnih protuupalnih lijekova, teško srčano zatajenje, teški poremećaj funkcije bubrega i/ili jetre, posljednje tromjesečje trudnoće; Oprez: javiti se liječniku u slučaju: pojave bolova ili krvarenja iz probavnog sustava, pojavljivanja promjena na koži i sluznici, kod ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti, alergijske bolesti i astma, kod sistemskog eritemskog lupusa, moždanog udara, srčanih tegoba, povišenog krvnog tlaka, dijabetesa, povišenog kolesterola, starijih od 65 godina, trudnice u prvih 6 mjeseci trudnoće; Interakcije: analgetici, antihipertenzivi, diuretici, antikoagulansi, antitrombotici, digoksin, kortikosteroidi, fenitoin, litij, metotreksat, ciklosporin, takrolimus, mifepriston, zidovudin, kinilinski antibiotici, acetilsalicilatna kis., antidepresivi
97	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	400 mg	10 kapsula / 2000 mg	simptomatsko ublažavanje blagih do umjereno jakih bolova (glavobolja, bolovi u leđima, menstrualni bolovi, zubobolja, grlobolja, neuralgije, reumatski i mišićni bolovi, artritis, migrena) ublažavanje simptoma prehlade i gripe, snižavanje povišene tjelesne temperature	1200 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina, djeca mlađa od 12 godina po preporuci liječnika	10 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili pomoćne tvari u lijeku, napadaj bronhospazma, astme, rinitisa ili urtikarije povezanih s uzimanjem acetilsalicilatne kiseline ili drugog nesteroidnog protuupalnog lijeka, preboljeli ili aktivni peptički vrijed ili krvarenje iz probavnog sustava, krvarenje iz probavnog sustava nakon uzimanja nesteroidnih protuupalnih lijekova, teži poremećaji jetrene ili bubrežne funkcije, teško srčano zatajenje, zadnje tromjesečje trudnoće; Oprez: sistemski eritemski lupus, ulcerozni kolitis, Crohnova bolest, probavne smetnje, visoki krvni tlak, oslabljena srčana funkcija, poremećena funkcija jetre i bubrega, bronhalna astma ili alergija, uzimanje nesteroidnih protuupalnih lijekova uključujući i selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2, starije osobe, terapija oralnim kortikosteroidima, antikoagulansima, SSRI, može doći do prolaznog smanjenja plodnosti kod žena; Interakcije: acetilsalicilatna kiselina ili drugi nesteroidni protuupalni lijek, kortikosteroidi, varfarin, antihipertenzivi, diuretici, litij, metotreksat, zidovudin, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina; trudnice u prvih 6 mjeseci trudnoće po preporuci liječnika

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
98	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	400 mg	24 obloženih tableta / 4800 mg	simptomatsko ublažavanje blagih do umjereno jakih bolova (glavobolja, bolovi u leđima, menstrualni bolovi, zubobolja, grlobolja, neuralgije, reumatski i mišićni bolovi, artritis, migrena) ublažavanje simptoma prehlade i gripe, snižavanje povišene tjelesne temperature	1200 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina, djeca mlađa od 12 godina po preporuci liječnika	10 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili pomoćne tvari u lijeku, napadaj bronhospazma, astme, rinitisa ili urtikarije povezanih s uzimanjem acetilsalicilatne kiseline ili drugog nesteroidnog protuupalnog lijeka, preboljeli ili aktivni peptički vrijed ili krvarenje iz probavnog sustava, krvarenje iz probavnog sustava nakon uzimanja nesteroidnih protuupalnih lijekova, teži poremećaji jetrene ili bubrežne funkcije, teško srčano zatajenje, zadnje tromjesečje trudnoće; Oprez: sistemski eritemski lupus., ulcerozni kolitis, Crohnova bolest, probavne smetnje, visoki krvni tlak, oslabljena srčana funkcija, poremećena funkcija jetre i bubrega, bronhalna astma ili alergija, uzimanje nesteroidnih protuupalnih lijekova uključujući i selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2, starije osobe, terapija oralnim kortikosteroidima, antikoagulansima, SSRI, može doći do prolaznog smanjenja plodnosti kod žena; Interakcije: acetilsalicilatna kiselina ili drugi nesteroidni protuupalni lijek, kortikosteroidi, varfarin, antihipertenzivi, diuretici, litij, metotreksat, zidovudin, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina; trudnice u prvih 6 mjeseci trudnoće po preporuci liječnika
99	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	novorođenčad i dojenčad od 3 do 6 mjeseci 50 mg; dojenčad 6 mjeseci do 1 godine 50 mg, djeca 1-3 godine 100 mg, djeca 4-6 godina 150 mg, djeca 7-9 godina 200 mg, djeca 10-12 godina 300 mg	100 ml suspenzije / 2000 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature uključujući povišenu tjelesnu temperaturu nakon cijepjenja, ublažavanje blagih do umjereno jakih bolova (grlobolja, bolovi pri nicanju zubi, zubobolja, uhobolja, glavobolja, bolovi uslijed manjih ozljeda (uganuća, iščašenja)	novorođenčad i dojenčad od 3 do 6 mjeseci 150 mg; dojenčad 6 mjeseci do 1 godine 200 mg, djeca 1-3 godine 300 mg, djeca 4-6 godina 450 mg, djeca 7-9 godina 600 mg, djeca 10-12 godina 900 mg	dojenčad i djeca od 3 mjeseca do 12 godina, dojenčad mlađa od 3 godine po preporuci liječnika	dojenčad od 3 do 6 mjeseci: 1 dan dojenčad starija od 6 mjeseci: 3 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili pomoćne tvari u lijeku, napadaj bronhospazma, astme, rinitisa ili urtikarije povezanih s uzimanjem acetilsalicilatne kiseline ili drugog nesteroidnog protuupalnog lijeka, preboljeli ili aktivni peptički vrijed ili krvarenje iz probavnog sustava, krvarenje iz probavnog sustava nakon uzimanja nesteroidnih protuupalnih lijekova, teži poremećaji jetrene ili bubrežne funkcije, teško srčano zatajenje, zadnje tromjesečje trudnoće; Oprez: sistemski eritemski lupus., ulcerozni kolitis, Crohnova bolest, probavne smetnje, visoki krvni tlak, oslabljena srčana funkcija, poremećena funkcija jetre i bubrega, bronhalna astma ili alergija, uzimanje nesteroidnih protuupalnih lijekova uključujući i selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2, starije osobe, terapija oralnim kortikosteroidima, antikoagulansima, SSRI, može doći do prolaznog smanjenja plodnosti kod žena; Interakcije: acetilsalicilatna kiselina ili drugi nesteroidni protuupalni lijek, kortikosteroidi, varfarin, antihipertenzivi, diuretici, litij, metotreksat, zidovudin, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina; trudnice u prvih 6 mjeseci trudnoće po preporuci liječnika, dojilje smiju koristiti lijek u preporučenim dozama

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
100	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	400 mg	20 kapsula / 4000 mg	za smanjenje upale i kratkoročno ublažavanje boli različitog porijekla: glavobolje, migrene, bolova u leđima, menstrualnih bolova, zubobolje, upale živca (neuralgija), bolova u mišićima, bolova u zglobovima, reumatskih bolova, za ublažavanje tegoba prehlade, gripe i groznice	1200 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	ublažavanje boli 10 dana, za snižavanje tjelesne temperature 3 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, alergija na neki drugi nesteroidni protuupalni lijek, otežano disanje, pogoršanje stanja astme, alergijski osip ili svrbež i curenje iz nosa uslijed primjene ibuprofena, aspirina i drugih sličnih lijekova, krvarenje ili perforacije iz probavnog sustava uslijed prijašnje primjene ibuprofena, aspirina i drugih sličnih lijekova, preboljeni ili akutni čir (vrijed) na želucu ili dvanaesniku, s pucanjem (perforacijom) čira ili krvarenjem, ozbiljna bolest bubrega, jetre ili srca, zadnji trimestar trudnoće, mlađi od 12 godina; Oprez: astmatični bolesnici, problemi s radom bubrega, jetre ili srca, istovremeno uzimanje nesteroidnih protuupalnih lijekova, povišen krvni tlak ili srčana slabost, po savjetu liječnika kod: oboljenja vezivnog tkiva (npr. sistemskog eritematoznog lupusa (SLE)), problema s krvarenjem ili zgrušavanjem krvi, intolerancije na neke šećere, starijih osoba, upale crijeva ulcerozni kolitis ili Crohnovu bolest, redovne terapije koju je propisao liječnik, visokog tlaka, šećerne bolesti, povišenog kolesterola, kod pušača, kod primjene lijeka može doći do prolaznog smanjenja plodnosti u žena, ibuprofen povećava rizik od pojave infarkta miokarda ili moždanog udara; Interakcije: acetilsalicilatna kiselina ili drugi nesteroidni protuupalni
101	M01AE01	ibuprofenum	kroz usta	400 mg	20 kapsula / 8000 mg	za smanjenje upale i kratkoročno ublažavanje boli različitog porijekla: glavobolje, migrene, bolova u leđima, menstrualnih bolova, zubobolje, upale živca (neuralgija), bolova u mišićima, bolova u zglobovima, reumatskih bolova, za ublažavanje tegoba prehlade, gripe i groznice	1200 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	ublažavanje boli 10 dana, za snižavanje tjelesne temperature 3 dana	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili pomoćne tvari u sastavu lijeka, alergija na neki drugi nesteroidni protuupalni lijek, otežano disanje, pogoršanje stanja astme, alergijski osip ili svrbež i curenje iz nosa uslijed primjene ibuprofena, aspirina i drugih sličnih lijekova, krvarenje ili perforacije iz probavnog sustava uslijed prijašnje primjene ibuprofena, aspirina i drugih sličnih lijekova, preboljeni ili akutni čir (vrijed) na želucu ili dvanaesniku, s pucanjem (perforacijom) čira ili krvarenjem, ozbiljna bolest bubrega, jetre ili srca, zadnji trimestar trudnoće, mlađi od 12 godina; Oprez: astmatični bolesnici, problemi s radom bubrega, jetre ili srca, istovremeno uzimanje nesteroidnih protuupalnih lijekova, povišen krvni tlak ili srčana slabost, po savjetu liječnika kod: oboljenja vezivnog tkiva (npr. sistemskog eritematoznog lupusa (SLE)), problema s krvarenjem ili zgrušavanjem krvi, intolerancije na neke šećere, starijih osoba, upale crijeva ulcerozni kolitis ili Crohnovu bolest, redovne terapije koju je propisao liječnik, visokog tlaka, šećerne bolesti, povišenog kolesterola, kod pušača, kod primjene lijeka može doći do prolaznog smanjenja plodnosti u žena, ibuprofen povećava rizik od pojave infarkta miokarda ili moždanog udara; Interakcije:

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
102	M02AA07	piroxicamum	za kožu	∅	50 g / 500 mg	ublažavanje bolova, upale i otekline zglobova pri reumatskim bolestima, kod zglobova osjetljivim na dodir, bolova i otekline nakon uganuća, nagnječenja, istegnuća, boli u leđima	∅	odrasli i djeca starija od 12 godina, kod starijih od 65 godina primijeniti najnižu učinkovitu dozu kroz najkraće moguće vrijeme	akutna stanja 7 dana, kronična stanja 4 tjedna	Kontraindikacije: alergija na piroksikam ili pomoćne sastojke lijeka ili na neki drugi nesteroidni protuupalni lijek (npr. acetilsalicilnu kiselinu), djeca mlađa od 12 godina, primjena u području otvorenih rana, upalnih promjena i infekcija kože; Oprez: upalne bolesti crijeva (npr. Crohnova bolest), vrijed (čir) na želucu, poremećaj rada jetre i/ili bubrega, stariji od 65 godina, liječeno područje kože ne izlagati suncu, ne omatati zavojem; Interakcije: lijekovi protiv zgrušavanja krvi (npr. varfarin ili acetilsalicilna kiselina), trudnice i dojilje po preporuci liječnika
103	M02AA13	ibuprofenum	za kožu	∅	100 g gela / 5000 mg	analgetsko i protuupalno djelovanje za liječenje reumatskih bolova, bolova u mišićima, bolova u leđima, bolova i otekline izazvanih iščašenjem, istegnućem te kod neuralgija	∅	odrasli i djeca starija od 12 godina	2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili neki od ostalih sastojaka lijeka, alergija na nesteroidne protuupalne lijekove ili acetilsalicilatnu kiselinu, trudnice i dojilje, oštećena koža; Oprez: čir na želucu, oboljenje bubrega, bronhalna astma, alergija na aspirin ili ibuprofen primijenjen peroralno, djeca mlađa od 12 godina; Interakcije: acetilsalicilatna kiselina, nesteroidni protuupalni lijekovi, antihipertonic
104	M02AA13	ibuprofenum	za kožu	∅	50 ml otopine / 2500 mg	liječenje bolnih i upalnih stanja mišićno-koštanog sustava, uključujući bolove u leđima, reumatske bolove, mišićne bolove, uganuća, iščašenja, neuralgije, simptomatsko ublažavanje boli kod blažih oblika artritisa	∅	odrasli i djeca starija od 12 godina, djeca mlađa od 12 godina po preporuci liječnika	2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na ibuprofen ili neki od ostalih sastojaka lijeka, alergija na nesteroidne protuupalne lijekove ili acetilsalicilatnu kiselinu, oštećena ili upaljena koža, oboljeli od astme, alergijskog rinitisa ili urtikarije a prethodno su imali alergiju na aspirin, ibuprofen ili drugi nesteroidni protuupalni lijek; Oprez: čir na želucu, oboljenje bubrega, bronhalna astma, alergija na aspirin ili ibuprofen primijenjen peroralno, djeca mlađa od 12 godina; Interakcije: antihipertenzivi, antikoagulansi, acetilsalicilatna kiselina, nesteroidni protuupalni lijekovi, antihipertonic
105	M02AA15	diclofenacum	za kožu	40 mg	25 g otopine / 1000 mg	simptomatsko ublažavanje blage do umjereno teške boli nakon akutne ozljede zglobova i okolnih struktura bez oštećenja kože	120 mg	odrasli i djeca starija od 15 godina	7-8 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost na diklofenak, acetilsalicil. kiselinu i druge nesteroidne protuupalne lijekove, bolesnici sa ili bez astme, kod kojih aspirin i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi izazivaju astmatične napadaje, urtikariju ili akutni rinitis; posljednje tromjesečje trudnoće; Oprez: fotosenzitivnost, ne upotrebljavati s okluzivnim zavojem, na otvorene rane i oboljelu kožu, povećana učestalost sistem. nuspojava uz istovremenu primjenu sa peroralnim NSAID te kod primjene duže od 4 tjedna na površini većoj 0,6 m, kod bolesnika sa bronhalnom astmom ili alergijskom bolešću moguć bronhospazam

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
106	M02AA15	diclofenacum	za kožu	∅	60 g / 600 mg	ublažavanje boli i smetnje otekline kod stanja koja zahvaćaju zglobove, mišiće, tetive i ligamente: nagnječenja, uganuća i iščašenja, izvanzglobni reumatizam, degenerativni reumatizam	∅	odrasli i djeca starija od 14 godina	14 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost na diklofenak, acetilsalicil. kiselinu i druge nesteroidne protuupalne lijekove, bolesnici sa ili bez astme, kod kojih aspirin i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi izazivaju astmatične napadaje, urtikariju ili akutni rinitis; posljednje tromjesečje trudnoće; Oprez: fotosenzitivnost, ne upotrebljavati s okluzivnim zavojem, na otvorene rane i oboljelu kožu, povećana učestalost sistem. nuspojava uz istovremenu primjenu sa peroralnim NSAID te kod primjene duže od 4 tjedna na površini većoj 0,6 m, kod bolesnika sa bronhalnom astmom ili alergijskom bolešću moguć bronhospazam
107	M02AA15	diclofenacum	za kožu	∅	60 g / 600 mg	ublažavanje bolova i upale kod blažih oblika reumatskih bolesti (upalne, degenerativne, izvanzglobni reumatizam) te drugih bolnih znakova (športske i druge ozljede mekih tkiva zbog nezgoda kao što su istegnuća, uganuća i nagnječine kada nije ozlijeđena koža)	∅	odrasli i djeca starija od 12 godina	7 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost na diklofenak, acetilsalicil. kiselinu i druge nesteroidne protuupalne lijekove, bolesnici sa ili bez astme, kod kojih aspirin i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi izazivaju astmatične napadaje, urtikariju ili akutni rinitis; posljednje tromjesečje trudnoće; Oprez: fotosenzitivnost, ne upotrebljavati sa okluzivnim zavojem, na otvorene rane i oboljelu kožu, povećana učestalost sistem. nuspojava uz istovremenu primjenu sa peroralnim NSAID te kod primjene duže od 4 tjedna na površini većoj 0,6 m, kod bolesnika s bronhalnom astmom ili alergijskom bolešću moguć bronhospazam
108	M02AA15	diclofenacum	za kožu	∅	100 g / 1160 mg	olakšanje boli i smanjenje upale i otekline kod velikog broja bolnih stanja koji utječu na zglobove i mišiće	16 g	odrasli i djeca starija od 12 godina	7 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost na diklofenak, acetilsalicil. kiselinu i druge nesteroidne protuupalne lijekove, bolesnici sa ili bez astme, kod kojih aspirin i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi izazivaju astmatične napadaje, urtikariju ili akutni rinitis; posljednje tromjesečje trudnoće; Oprez: fotosenzitivnost, ne upotrebljavati s okluzivnim zavojem, na otvorene rane i oboljelu kožu, povećana učestalost sistem. nuspojava uz istovremenu primjenu sa peroralnim NSAID te kod primjene duže od 4 tjedna na površini većoj 0,6 m, kod bolesnika sa bronhalnom astmom ili alergijskom bolešću moguć bronhospazam

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
109	N02BA01	acidum acetylsalicylicum	kroz usta	300 mg	20 tableta / 6000 mg	uklanjanje srednje jake boli (glavobolja, zubobolja, bol zbog upale živca, ishijalgija, reumatska bol, mišićna bol, bol nakon operacije, povrede ili opekлина, menstrualna bol), za snižavanje povišene tjelesne temperature, za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s anginom pectoris, za smanjenje rizika od moždanog udara u bolesnika s tranzitornim ishemijskim atacima, sekundarna prevencija srčanog udara, sekundarna prevencija moždanog udara, prevencija tromboembolije, za smanjenje rizika od srčanog udara u bolesnika s jednim ili više rizičnih faktora za nastanak kardiovaskularnih bolesti	300 mg	odrasli i djeca starija od 16 godina, djeca mlađa od 16 godina po preporuci liječnika	Ø	Kontraindikacije: primjena kod djece, alergija na acetilsalicilatnu kiselinu ili na pomoćne tvar, alergija na drugi nesteroidni protuupalni lijek, gastritis, želučani i duodenalni ulkus, pojačana sklonost krvarenju, giht, zadnje tromjesečje trudnoće, terapija metotreksatom u dozi 15 mg/tjedan ili većoj; Oprez: problemi s jetrom i bubrezima, bronhalna astma, trudnice i dojilje; Interakcije: antacidi, antikoagulansi, urikozurici, drugi nesteroidni protuupalni lijekovi i steroidi, oralni hipoglikemici iz skupine sulfonilureje, metotreksat, valproična kiselina, ciklosporin, takrolimus, antihipertenzivni lijekovi (diuretici, ACE-inhibitori), izbjegavati alkohol, prekinuti terapiju 5 dana prije operacijskog zahvata, ne preporuča se djeci mlađoj od 16 godina, trudnice po preporuci liječnika, dojiljama se ne preporuča
110	N02BA01	acidum acetylsalicylicum	kroz usta	1000 mg	20 tableta / 10000 mg	ublažavanje bolova, snižavanje povišene tjelesne temperature, protuupalno djelovanje	3000 mg	odrasli i djeca starija od 16 godina, djeca mlađa od 16 godina po preporuci liječnika	3 dana	Kontraindikacije: primjena kod djece, alergija na acetilsalicilatnu kiselinu ili na pomoćne tvar, alergija na salicilate i drugi nesteroidni protuupalni lijek, želučani i duodenalni ulkus, sklonost krvarenju, zatajenje jetre ili bubrega, giht, zadnje tromjesečje trudnoće, teško zatajenje srca koje nije stabilizirano, terapija metotreksatom u dozi 15 mg/tjedan ili većoj; Oprez: problemi s jetrom i bubrezima, oboljeli od alergije, astme, peludne groznice, nosnih polipa, kroničnih bolesti dišnog sustava, želučani vrijed, vrijed na dvanaesniku ili dosadašnje krvarenje u probavnom sustavu, planirani kirurški zahvat (uključujući i vađenje zuba), giht, djeca mlađa od 16 godina, trudnice i dojilje; Interakcije: antacidi, antikoagulansi, antidiabetici, digoksin, probenecid, benzbromaron, lijekovi s kortizonom, drugi nesteroidni protuupalni lijekovi i steroidi, oralni hipoglikemici iz skupine sulfonilureje, metotreksat, valproična kiselina, ciklosporin, takrolimus, antihipertenzivni lijekovi (diuretici, ACE-inhibitori), izbjegavati alkohol, trudnice po preporuci liječnika, dojiljama se ne preporuča

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
111	N02BE01	paracetamol	kroz usta	600 mg	50 g praška / 6000 mg	uklanjanje umjereno do srednje teških bolova različitog uzroka (glavobolja, zubobolja, bol nakon operacija ili ozljeda, bolne menstruacije, križobolja, bol uslijed artritisa), snižavanje povišene tjelesne temperature	40-50 kg: 1800 mg; 51-65 kg: 2400 mg	odrasli i djeca starija od 14 godina	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, ozbiljna bolest jetre ili bubrega; Oprez: kod istovremene primjene s: antikoagulansima, antiepilepticima, lijekovima za liječenje HIV infekcija, zidovudinom, probenicidom, salicilamidima, kolestiraminom, oralnim kontraceptivima, disulfiramom, antibioticima (kloramfenikol, rifampicin, izonijazid, kinolonski antibiotici), ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom
112	N02BE01	paracetamol	rektalno	15 mg/kg	10 čepića / 1500 mg	za ublažavanje boli i/ili snižavanje povišene tjelesne temperature u stanjima kao što su glavobolja, gripozna stanja, zubobolja, bolovi u mišićima	60 mg/kg/dan	djeca tjelesne težine od 8 kg do 12 kg (tj. oko 6-24 mjeseca starosti)	protiv temperature 3 dana, protiv bolova 5 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, bolesti jetre i bubrega; Oprez: kod umjerenih jetrenih ili bubrežnih bolesti primjena lijeka pod liječničkim nadzorom, kod istovremene primjene s: antikoagulansima, antiepilepticima, barbituratima, rifampicinom; ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom
113	N02BE01	paracetamol	kroz usta	djeca: 13-20 kg (2-7 god) 250 mg, 21-25 kg (6-10 god) 250 mg, 26-40 kg (8-13 god) 500 mg, 41-50 kg (12-15 god) 500 mg; odrasli i djeca teža od 50 kg (15 god) 1000 mg	16 šumećih tableta / 8000 mg	za ublažavanje boli i/ili snižavanje povišene tjelesne temperature u stanjima kao što su glavobolja, gripozna stanja, zubobolja, bolovi u mišićima te bolne menstruacije	djeca: 13-20 kg (2-7 god) 1000 mg, djeca 21-25 kg (6-10 god) 1500 mg, djeca 26-40 kg (8-13 god) 2000 mg, djeca 41-50 kg (12-15 god) 3000 mg; odrasli i djeca teža od 50 kg (15 god) 4000 mg	odrasli i djeca tjelesne težine veće od 13 kg (tj. oko 2 godine starosti), trudnice i dojilje	protiv temperature 3 dana, protiv bolova 5 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol ili pomoćne tvari u lijeku, teška bolest jetre; Oprez: kod ozbiljnih jetrenih ili bubrežnih bolesti primjena lijeka nakon savjetovanja s liječnikom kao i kod istovremene primjene s: antikoagulansima, antiepilepticima, barbituratima, rifampicinom; ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom
114	N02BE01	paracetamol	rektalno	15 mg/kg	10 čepića / 800 mg	za ublažavanje boli i/ili snižavanje povišene tjelesne temperature u stanjima kao što su glavobolja, gripozna stanja, zubobolja, bolovi u mišićima	60 mg/kg/dan	samo djeca tjelesne težine od 4 kg do 6 kg (tj. oko 1-4 mjeseca starosti)	protiv temperature 3 dana, protiv bolova 5 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, teške bolesti jetre, nedavno preboljena upala anusa ili upala debelog crijeva ili krvarenje iz debelog crijeva; Oprez: kod ozbiljnih jetrenih ili bubrežnih bolesti primjena lijeka nakon savjetovanja s liječnikom kao i kod istovremene primjene s: antikoagulansima, antiepilepticima, barbituratima, rifampicinom; ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
115	N02BE01	paracetamol	kroz usta	odrasli i djeca starija od 12 godina 1000 mg; djeca 6-12 god 500 mg	12 tableta / 6000 mg	za ublažavanje blagih do umjerenih bolova te snižavanje povišene tjelesne temperature u stanjima kao što su glavobolja, prehlada, gripa, zubobolja, bolovi u zglobovima i menstrualni bolovi	odrasli i djeca starija od 12 godina 4000 mg; djeca 6-12 god 2000 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol ili pomoćne tvari u lijeku, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, teže smetnje u radu jetre i bubrega, konzumacija alkohola; Oprez: kod smanjenog rada jetre i bubrega primjena lijeka nakon savjetovanja s liječnikom, kod istovremene primjene s: metoklopramidom i domperidonom, kolestiraminom, antikoagulansima, antiepilepticima, barbituratima, rifampicinom, kloramfenikolom, zidovudinom, amitriptilinom, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom
116	N02BE01	paracetamol	kroz usta	novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca 40 mg; dojenčad od 3 mjeseca do 1 godine 120 mg, djeca 1-5 godina 240 mg, djeca 6-12 godina 480 mg	100 ml oralne suspenzije / 2400 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature, ublažavanje blage do umjerene akutne boli (glavobolja, zubobolja), boli nakon ozljeda, medicinskih ili stomatoloških zahvata	novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca 160 mg; dojenčad od 3 mjeseca do 1 godine 480 mg, djeca 1-5 godina 960 mg, djeca 6-12 godina 1920 mg	novorođenčad, dojenčad i djeca do 12 godina	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol ili pomoćne tvari u lijeku, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, teže smetnje u radu jetre i bubrega, konzumacija alkohola; Oprez: kod smanjenog rada jetre i bubrega primjena lijeka nakon savjetovanja s liječnikom, kod istovremene primjene s: metoklopramidom i domperidonom, kolestiraminom, antikoagulansima, antiepilepticima, barbituratima, rifampicinom, kloramfenikolom, zidovudinom, amitriptilinom, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom
117	N02BE01	paracetamol	kroz usta	odrasli i djeca starija od 12 godina 1000 mg; djeca 6-12 god 500 mg	20 tableta / 10000 mg	uklanjanje umjereno do srednje teških bolova različitog uzroka (glavobolja, zubobolja, bol nakon operacija ili ozljeda, bolne menstruacije, križobolja, bol uslijed artritisa), snižavanje povišene tjelesne temperature	odrasli i djeca starija od 12 godina 4000 mg; djeca 6-12 god 2000 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	protiv temperature 3 dana, protiv bolova 10 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, ozbiljna bolest jetre ili bubrega; Oprez: kod istovremene primjene s: antikoagulansima, antiepilepticima, fenotiazinima, metoklopramidima, domperidonom, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom
118	N02BE01	paracetamol	kroz usta	djeca 2-3 mjeseca: 10 mg/kg tjel. težine; 3 mjeseca-1 god: 120 mg, 1-5 god: 240 mg, 6-12 god: 480 mg	100 ml sirupa / 2400 mg	uklanjanje umjereno do srednje teških bolova različitog uzroka (glavobolja, zubobolja, bol nakon operacija ili ozljeda, bolne menstruacije, križobolja, bol uslijed artritisa), snižavanje povišene tjelesne temperature.	djeca 2-3 mjeseca: 120 mg; 3 mjeseca-1 god: 480 mg, djeca 1-5 god: 1 g, djeca 6-12 god: 2g	djeca od 2 mjeseca do 12 godina	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, ozbiljna bolest jetre ili bubrega; Oprez: kod istovremene primjene s: antikoagulansima, antiepilepticima, fenotiazinima, metoklopramidima, domperidonom, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, djeca 2-3 mjeseca samo po preporuci liječnika

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
119	N02BE01	paracetamol	kroz usta	odrasli i djeca starija od 12 godina: 1 g; djeca 6-12 godina: 500 mg	20 tableta / 10000 mg	uklanjanje blagih do umjerenih bolova (glavobolja, zubobolja, bolne menstruacije), bolova kod ozljeda, nakon liječničkih i zubarskih zahvata, reumatskih bolova (osteoartrza ili bolovi u donjem predjelu leđa), bolovi u mišićima i zglobovima kod prehlade i gripe, snižavanje povišene tjelesne temperature	odrasli i djeca starija od 12 godina: 4 g; djeca 6-12 godina: 500 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina, trudnice i dojilje po preporuci liječnika	protiv temperature 3 dana, protiv bolova 10 dana, djeca 5 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, ozbiljna bolest jetre ili bubrega; Oprez: kod istovremene primjene s: antikoagulansima, antiepilepticima, lijekovi za liječenje HIV infekcija, zidovudinom, probenicidom, salicilamidima, kolestiraminom, oralnim kontraceptivima, disulfiramom, antibioticima (kloramfenikol, rifampicin, izonijazid, kinolonski antibiotici), varfarinom, većom količinom alkohola, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom
120	N02BE01	paracetamol	kroz usta	odrasli i djeca starija od 12 godina: 1 g; djeca 10-12 godina (teža od 33 kg): 500 mg	12 raspadljivih tableta / 6000 mg	uklanjanje blagih do umjerenih bolova (glavobolja, zubobolja, bolne menstruacije), bolova kod ozljeda, nakon liječničkih i zubarskih zahvata, reumatskih bolova (osteoartrza ili bolovi u donjem predjelu leđa), bolovi u mišićima i zglobovima kod prehlade i gripe, snižavanje povišene tjelesne temperature	odrasli i djeca starija od 12 godina: 4 g; djeca 10-12 godina (teža od 33 kg): 2 g	odrasli i djeca starija od 10 godina (teža od 33 kg), trudnice i dojilje po preporuci liječnika	protiv temperature 3 dana, protiv bolova 10 dana, djeca 5 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, ozbiljna bolest jetre ili bubrega; Oprez: kod istovremene primjene s: antikoagulansima, antiepilepticima, lijekovi za liječenje HIV infekcija, probenicidom, kolestiraminom, aktivni ugljen, propantelinom, antibioticima (kloramfenikol), varfarinom, metoklopramidom, domperidonom, većom količinom alkohola, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom
121	N02BE01	paracetamol	kroz usta	1 g	8 šumećih tableta / 8000 mg	ublažavanje boli različitog podrijetla: glavobolje, zubobolje, gripoznih stanja, boli u području nekog živca, upale živca, upalnog oštećenja perifernih živaca, ishijalgije, mišićnog reumatizma, bolovi kod artroza, boli nakon operacija i ozljeda, bolnih menstruacija; snižavanje povišene tjelesne temperature	4 g	odrasli uključujući trudnice i dojilje i djeca starija od 15 godina (teža od 50 kg)	protiv temperature 3 dana, protiv bolova 5 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, ozbiljna bolest jetre, mlađi od 15 godina; Oprez: teške bolesti bubrega, alkohol, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom
122	N02BE01	paracetamol	rektalno	djeca 6-9 godina (do 25 kg): 250 mg; djeca 9-12 godina (teže od 25 kg): 500 mg	10 čepića / 2500 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature, ublažavanje zubobolje, glavobolja, bolovi uslijed nicanja zubi, bolovi nakon operacije i ozljeda, bolovi u mišićima i zglobovima	1 g	djeca 6-12 godina	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, ozbiljna bolest jetre i bubrega, Oprez: alkohol, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, istovremena primjena s antikoagulansima, barbituratima i drugim antiepilepticima

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
123	N02BE01	paracetamolom	kroz usta	djeca 6-12 godina: 500 mg; odrasli i djeca starija od 12 godina: 1 g	10 tableta / 5000 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature, ublažavanje zubobolje, glavobolja (uključujući migrensku i tenzijsku), bolovi u leđima, neuralgija, reumatskih i mišićnih bolova, blažeg oblika artritisa, menstrualni bolovi i grlobolja	djeca 6-12 godina: 2 g; odrasli i djeca starija od 12 godina: 4 g	odrasli (uključujući trudnice i dojilje) i djeca starija od 6 godina	djeca 3 dana, odrasli 10 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, djeca mlađa od 6 godina; jetre i bubrega, Oprez: bolest jetre i bubrega, ne preporuča se istovremena konzumacija alkohola, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, istovremena primjena s antikoagulansima, antiepilepticima, kolestiraminom, metoklopramidom, domperidonom, većom količinom alkohola, barbituratima, rifampicin, pripravci s gospinom travom
124	N02BE01	paracetamolom	rektalno	novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (teška do 5 kg) 60 mg; dojenčad 3 mjeseca do 1 godine (teška 5-10 kg) 120 mg, djeca 1-5 godina (teška 10-20 kg) 240 mg	10 čepića / 1200 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature, ublažavanje zubobolje, glavobolja, grlobolje, bolovi uslijed nicanja zubi, bolovi nakon operacije i ozljeda, bolovi u mišićima i zglobovima	novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (teška do 5 kg) 240 mg; dojenčad 3 mjeseca do 1 godine (teška 5-10 kg) 480 mg, djeca 1-5 godina (teška 10-20 kg) 960 mg	novorođenčad od 3 mjeseca i djeca do 5 godina (novorođenčad mlađa od 3 mjeseca po preporuci liječnika)	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, Oprez: bolest jetre i bubrega, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, istovremena primjena s antikoagulansima, barbituratima i drugim antiepilepticima, rifampicinom
125	N02BE01	paracetamolom	kroz usta	novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (teška do 5 kg) 60 mg; dojenčad 3 mjeseca do 1 godine (teška 5-10 kg) 120 mg, djeca 1-6 godina (teška 10-20 kg) 240 mg, djeca 6-12 godina (teška 20-40 kg) 480 mg	100 ml sirupa / 2400 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature, ublažavanje zubobolje, glavobolja, grlobolje, bolovi uslijed nicanja zubi, bolovi nakon operacije i ozljeda, bolovi u mišićima i zglobovima	novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (teška do 5 kg) 240 mg; dojenčad 3 mjeseca do 1 godine (teška 5-10 kg) 480 mg, djeca 1-6 godina (teška 10-20 kg) 960 mg, djeca 6-12 godina (teška 20-40 kg) 1920 mg	novorođenčad od 3 mjeseca i djeca do 12 godina (novorođenčad mlađa od 3 mjeseca po preporuci liječnika)	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, Oprez: bolest jetre i bubrega, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, istovremena primjena s metoklopramidom, domperidonom, kolestiraminom, antikoagulansima, barbituratima i drugim antiepilepticima, rifampicinom
126	N02BE01	paracetamolom	kroz usta	djeca od 5 do 12 godina: 300 mg; odrasli i djeca starija od 12 godina: 900 mg	20 kapsula / 6000 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature, ublažavanje zubobolje, glavobolja (uključujući migrensku i tenzijsku), bolovi u leđima, neuralgija, reumatskih i mišićnih bolova, blažeg oblika artritisa, menstrualni bolovi i grlobolja	djeca od 5 do 12 godina: 1200 mg; odrasli i djeca starija od 12 godina: 3600 mg	odrasli (uključujući trudnice i dojilje) i djeca starija od 5 godina	djeca 3 dana, odrasli 10 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, djeca mlađa od 5 godina; Oprez: bolest jetre i bubrega, ne preporuča se istovremena konzumacija alkohola, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, istovremena primjena s antikoagulansima, antiepilepticima, kolestiraminom, metoklopramidom, domperidonom, većom količinom alkohola, barbituratima, rifampicin, pripravci s gospinom travom

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
127	N02BE01	paracetamolom	kroz usta	djeca od 6 do 12 godina: 500 mg; odrasli i djeca starija od 12 godina: 1 g	16 tableta / 8000 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature, ublažavanje zubobolje, glavobolja (uključujući migrensku i tenzijsku), bolovi u leđima, neuralgija, reumatski i mišićni bolovi, blaži oblik artritisa, menstrualni bolovi, grlobolja i bolovi uzrokovane prehladom i gripom	djeca od 6 do 12 godina: 2 g; odrasli i djeca starija od 12 godina: 4 g	odrasli i djeca starija od 6 godina	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, djeca mlađa od 6 godina, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom; Oprez: bolest jetre i bubrega, ne preporuča se istovremena konzumacija alkohola, istovremena primjena s antikoagulansima, kolestiraminom, metoklopramidom, domperidonom, većom količinom alkohola, barbituratima, zidovudinom, triciklički antidepresivi
128	N02BE01	paracetamolom	kroz usta	novorođenčad 2-3 mjeseca 60 mg; dojenčad od 3 mjeseca do 1 godine 120 mg, djeca 1-6 godina 240 mg, djeca 6-12 godina 480 mg	100 ml / 2400 mg	uklanja bol kod rasta zubi, zubobolje, grlobolje, snižavanje povišene tjelesne temperature	novorođenčad 2-3 mjeseca 240 mg; dojenčad od 3 mjeseca do 1 godine 480 mg, djeca 1-6 godina 960 mg, djeca 6-12 godina 1920 mg	novorođenčad od 3 mjeseca i djeca do 12 godina	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, Oprez: oboljenje jetre i bubrega ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, istovremena primjena s metoklopramidom, domperidonom, kolestiraminom, antikoagulansima, barbituratima i zidovudinom
129	N02BE01	paracetamolom	kroz usta	djeca od 6-12 godina: 500 mg; odrasli i djeca starija od 12 godina: 1 g	12 tableta / 6000 mg	uklanjanje boli kod glavobolje (uključujući migrenu i glavobolju zbog napetosti), bol u leđima, reumatske i mišićne boli, neuralgije, zubobolja, menstrualna bol, grlobolja te bolove uzrokovane prehladom i gripom, bol kod blagog artritisa, snižava povišenu tjelesnu temperaturu	djeca od 6-12 godina: 2 g; odrasli i djeca starija od 12 godina: 4 g	odrasli (uključujući dojilje) i djeca starija od 6 godina	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom, djeca mlađa od 6 god; Oprez: oboljenje jetre i bubrega, oboljeli od blagog artritisa, istovremena primjena s metoklopramidom, domperidonom, kolestiraminom, antikoagulansima, antiepilepticima, barbituratima, rifampicinom
130	N02BE01	paracetamolom	kroz usta	novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (teška do 5 kg) 60 mg; dojenčad 3 mjeseca do 1 godine (teška 5-10 kg) 120 mg, djeca 1-6 godina (teška 10-20 kg) 240 mg, djeca 6-12 godina (teška 20-40 kg) 480 mg	150 ml sirupa / 3600 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature, ublažavanje zubobolje, glavobolja, grlobolje, bolovi uslijed nicanja zubi, bolovi nakon operacije i ozljeda, bolovi u mišićima i zglobovima	novorođenčad i dojenčad do 3 mjeseca (teška do 5 kg) 240 mg; dojenčad 3 mjeseca do 1 godine (teška 5-10 kg) 480 mg, djeca 1-6 godina (teška 10-20 kg) 960 mg, djeca 6-12 godina (teška 20-40 kg) 1920 mg	novorođenčad, dojenčad i djeca do 12 godina	3 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom; Oprez: oboljenje jetre i bubrega, istovremena primjena s metoklopramidom, domperidonom, kolestiraminom, antikoagulansima

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
131	N02BE01	paracetamolum	kroz usta	1 g	10 tableta / 5000 mg	snižavanje povišene tjelesne temperature, blago protiv upalno djelovanje, ublažavanje zubobolje, glavobolja, bolovi kod upale živca, ishijalgija, bolovi nakon operacije i ozljeda, bolovi u mišićima, bolne menstruacije	4 g	odrasli i djeca starija od 12 godina	10 dana	Kontraindikacije: preosjetljivost (alergija) na paracetamol, akutna upala jetre, aktivna kronična bolest jetre, genetski nedostatak enzima glukoza 6 fosfat dehidrogenaze, ne smiju se istovremeno koristiti drugi lijekovi s paracetamolom; Oprez: oboljenje jetre i bubrega, trudnoća i dojlje, konzumiranje alkohola, istovremena primjena s antacidima, antikolinergicima, narkotičnim analgeticima, metoklopramidom, zidovudinom, kloramfenikolom, probenicidom, tricikličkim antidepresivima, barbituratima, kolestiraminom, varfarinom
132	N06AX	Hyperici herbae extractum siccum	kroz usta	250 mg	60 kapsula / 15000 mg (kao suhi ekstrakt) iz Hypericum perforatum L., herba (zelen gospine trave) (3-6 : 1) što odgovara 0,5 mg ukupnog hipericina; ekstrakcijsko otapalo: 60% etanol m/m	za liječenje blagih depresivnih epizoda, ublažava stanje potištenosti, osjećaj tuge, melankolije i tjeskobe, nervoze, razdražljivosti, malodušnosti i bezvoljnosti (nezainteresiranost za događaje i osobe iz svakodnevnog života) te popratne simptome kao što su nesanica, plačljivost, umor, pojačan ili smanjen apetit	500 mg	odrasli (stariji od 18 god)	4 tjedna, nakon toga se savjetovati s liječnikom	Kontraindikacije: uzimanje nekog od sljedećih lijekova: ciklosporin, takrolimus, digoksin, inhibitore HIV proteaze - amprenavir, indinavir (lijekovi koji se koriste u liječenju HIV infekcije odnosno AIDS-a), citostatike - npr. Irinotekan; Oprez: moguća fotoosjetljivost (ne preporuča se izlaganje sunčevom svjetlu ili umjetnim izvorima UV-zračenja), primjenu lijeka prekinuti min. 10 dana prije kirurškog zahvata zbog moguće interakcije, istovremena primjena kumarinskih antikoagulansa, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
133	N06DX02	Ginkgonis extractum siccum normatum	kroz usta	40 mg	60 kapsula / 2400 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (35-45 : 1), što odgovara najmanje 9,6 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi i najmanje 2,4 mg terpenskih laktona; prvo ekstrakcijsko otapalo: aceton 60% m/m	kod poremećaja prokrvljenosti i funkcije mozga koji su povezani s dobi, a koji se manifestiraju kao: smanjenje intelektualnih sposobnosti i pamćenja, vertigo, zvonjenje u ušima, nevoljkost/indispozicija i osjećaj straha, glavobolja i poremećaji spavanja te kod poremećaja prokrvljenosti ekstremiteta	120 mg	odrasli	30 dana	Kontraindikacije: trudnoća i dojenje; Oprez: prije kirurškog zahvata, kod uzimanja lijekova za sprječavanje zgrušavanja krvi (npr. kumarinski antikoagulansi, acetiilsalicilatna kiselina, drugi nesteroidni protuupalni lijekovi) antiepileptici; ne preporuča se uzimanje zajedno s alkoholom

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
134	N06DX02	Ginkgonis extractum siccum raffinatatum et quantificatum	kroz usta	80 mg	60 kapsula / 4800 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafiniran i kvantificiran) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (35-67 : 1), što odgovara 17,6-21,6 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi, 2,24-2,72 mg ginkgolida A, B i C i 2,08-2,56 mg bilobalida; prvo ekstrakcijsko otapalo: aceton 60 % m/m	kod poremećaja prokrvljenosti i funkcije mozga, a koji se manifestiraju kao: slabljenje intelektualnih sposobnosti i pamćenja, vrtoglavica, šum u ušima, neraspoloženje i osjećaj straha, glavobolja i poremećaji spavanja te kod početnog poremećaja prokrvljenosti udova	240 mg	odrasli	30 dana	Kontraindikacije: alergija na ekstrakt ginka ili pomoćne tvari lijeka; Oprez: kod planiranog kirurškog zahvata, kod uzimanja lijekova za sprječavanje zgrušavanja krvi te kod povećane sklonosti krvarenju savjetovati se s liječnikom; ne preporuča se trudnicama i dojiljama zbog nedostatnih podataka o neškodljivosti primjene
135	N06DX02	ginkgonis extractum siccum raffinatatum et quantificatum	kroz usta	40 mg	90 tableta / 3600 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, pročišćeni) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (40-50 : 1), što odgovara 8,8-10,8 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi, 1,12-1,36 mg ginkgolida A, B i C i 1,04-1,28 mg bilobalida; ekstrakcijsko otapalo: etanol 50% V/V	za ublažavanje tegoba zbog nedovoljne prokrvljenosti mozga (npr. vrtoglavica, šum u ušima, glavobolja, oslabljeno pamćenje, poremećaj koncentracije, nesanic, neraspoloženje, osjećaj straha), kod loše cirkulacije u rukama i nogama koja se očituje gubitkom osjeta, trncima, grčevima, obamrlošću te osjećajem hladnoće i pečenja - za ublažavanje simptoma nedovoljne cirkulacije u vratnoj kralježnici (npr. oslabljen sluh), kod hemoroida i varikoznih vena gdje je uočen pozitivni učinak ginka na elasticitet vena	120 mg	nije namijenjen za primjenu u djece, ne preporučuje se primjena u trudnica i dojilja	dulje vrijeme, min. 6-8 tjedana	Oprez: kod planiranog kirurškog zahvata, kod uzimanja lijekova za sprječavanje zgrušavanja krvi, kod povećane sklonosti krvarenju

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
136	N06DX02	ginko bilobae folii extractum siccum	kroz usta	120 mg	60 kapsula / 7200 mg ekstrakta (kao suhi ekstrat) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (35-45 : 1), što odgovara najmanje 28,8 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi i najmanje 7,2 mg terpenskih laktona; prvo ekstrakcijsko otapalo aceton 60 % m/m	kod poremećaja prokrvljenosti i funkcije mozga koji se manifestiraju kao: smanjenje intelektualnih sposobnosti i pamćenja, vertigo, zvonjenje u ušima, nevoljkost/indispozicija, glavobolja i poremećaji spavanja te kod poremećaja prokrvljenosti ekstremiteta	240 mg	ne preporuča se primjena kod djece	min. 3 mjeseca	Kontraindikacije: trudnoća i dojenje; Oprez: prije kirurškog zahvata, kod uzimanja lijekova za sprječavanje zgrušavanja krvi ili acetilsalicilatne kiseline; ne preporuča se uzimanje zajedno s alkoholom
137	N06DX02	ginko bilobae folii extractum siccum	kroz usta	120 mg	20 kapsula / 2400 mg ekstrakta (kao suhi ekstrat) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (35-45 : 1), što odgovara najmanje 28,8 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi i najmanje 7,2 mg terpenskih laktona; prvo ekstrakcijsko otapalo aceton 60 % m/m	kod poremećaja prokrvljenosti i funkcije mozga koji se manifestiraju kao: smanjenje intelektualnih sposobnosti i pamćenja, vertigo, zvonjenje u ušima, nevoljkost/indispozicija, glavobolja i poremećaji spavanja te kod poremećaja prokrvljenosti ekstremiteta	240 mg	ne preporuča se primjena kod djece	min. 3 mjeseca	Kontraindikacije: trudnoća i dojenje; Oprez: prije kirurškog zahvata, kod uzimanja lijekova za sprječavanje zgrušavanja krvi ili acetilsalicilatne kiseline; ne preporuča se uzimanje zajedno s alkoholom
138	N07BA01	nicotini resinas	ljekovita guma za žvakanje	2 mg	105 guma za žvakanje / 210 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	48 mg	odrasli, stariji od 18 godina	min 3 mjeseca, max 12 mjeseci	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar; Oprez: teška bolest srca, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojiljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom, flekainidom i pentazocinom

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
139	N07BA01	nicotini resinas	ljekovita guma za žvakanje	4 mg	105 guma za žvakanje / 420 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	96 mg	odrasli, stariji od 18 godina	min 3 mjeseca, max 12 mjeseci	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar; Oprez: teška bolest srca, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom
140	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	10 mg	7 transdermalnih flastera / 110,6 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	10 mg	odrasli, stariji od 18 godina	6 tjedana	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar, rasprostranjena kronična bolest kože; Oprez: teška bolest srca, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom, flekainidom i pentazocinom
141	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	15 mg	7 transdermalnih flastera / 165,2 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	15 mg	odrasli, stariji od 18 godina	8 tjedana	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar, rasprostranjena kronična bolest kože; Oprez: teška bolest srca, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom, flekainidom i pentazocinom
142	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	25 mg	7 transdermalnih flastera / 275,8 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	25 mg	odrasli, stariji od 18 godina	12 tjedana	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar, rasprostranjena kronična bolest kože; Oprez: teška bolest srca, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom, flekainidom i pentazocinom

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
143	N07BA01	nicotinum	sublingvalno	4 mg	30 tableta / 60 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	60 mg	odrasli, stariji od 18 godina	6 mjeseci	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar; Opaz: teška kardiovaskularna bolest, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojiljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom, flekainidom i pentazocinom
144	N07BA01	nicotinum	sublingvalno	4 mg	30 tableta / 120 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	60 mg	odrasli, stariji od 18 godina	6 mjeseci	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar; Opaz: teškakardiovaskularna bolest, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojiljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom, flekainidom i pentazocinom
145	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	10 mg	7 transdermalnih flastera / 116,2 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	10 mg	odrasli, stariji od 18 godina	2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar, rasprostranjena kronična bolest kože; Opaz: teška bolest srca, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojiljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom, flekainidom i pentazocinom

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
146	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	15 mg	7 transdermalnih flastera / 174,3 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	15 mg	odrasli, stariji od 18 godina	2 mjeseca	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar, rasprostranjena kronična bolest kože; Oprez: teška bolest srca, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom, flekainidom i pentazocinom
147	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	5 mg	7 transdermalnih flastera / 58,1 mg	ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja, sprječava povratak pušenju	5 mg	odrasli, stariji od 18 godina	2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, teška srčana bolest (npr. nestabilna angina pectoris, teška srčana aritmija), nedavno (u zadnja 3 mjeseca) preboljeli srčani ili moždani udar, rasprostranjena kronična bolest kože; Oprez: teška bolest srca, neliječen visoki krvni tlak, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), vrijed želuca, osobe mlađe od 18 godina i trudnice po preporuci liječnika, ne preporuča se dojljama; istovremena primjena s teofilinom, takrinom, klozapinom, ropinirolom, flekainidom i pentazocinom
148	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	14 mg	7 transdermalnih flastera / 546 mg	zamjenska nikotinska terapija-pomoć u prestanku pušenja	14 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, povremeni pušači, osobe mlađe od 12 godina, hospitalizacija zbog srčanog ili moždanog udara; Oprez: angioedem, urtikarija, alergijski ekcem ili dermatitis, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), ne preporuča se trudnicama i dojljama
149	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	21 mg	7 transdermalnih flastera / 798 mg	zamjenska nikotinska terapija-pomoć u prestanku pušenja	21 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	6 tjedana	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, povremeni pušači, osobe mlađe od 12 godina, hospitalizacija zbog srčanog ili moždanog udara; Oprez: angioedem, urtikarija, alergijski ekcem ili dermatitis, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), ne preporuča se trudnicama i dojljama

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
150	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	7 mg	7 transdermalnih flastera / 252 mg	zamjenska nikotinska terapija-pomoć u prestanku pušenja	7 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, povremeni pušači, osobe mlađe od 12 godina, hospitalizacija zbog srčanog ili moždanog udara; Oprez: angioedem, urtikarija, alergijski ekcem ili dermatitis, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), ne preporuča se trudnicama i dojiljama
151	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	14 mg	7 transdermalnih flastera / 546 mg	ublažavanje simptoma apstinencije od nikotina	14 mg	odrasli-stariji od 18 godina, djeca od 12 do 17 godina po savjetu liječnika	6 tjedana	Kontraindikacije: alergija na flaster, nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, povremeni pušači, osobe mlađe od 12 godina, bolesnici koji su nedavno preboljeli srčani ili moždani udar, ili pate od nestabilne i pogoršavajuće angine pektoris, Prinzmetalove angine, snažne srčane aritmije; Oprez: osobe stare 12-17 godina, kod srčanih problema, problema sa cirkulacijom, uključujući srčano zatajenje, stabilnu anginu pektoris i visoki tlak, urtikarija, alergijski ekcem ili dermatitis, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), istovremena primjena s kofeinom, teofilinom, imipraminom, pentazocinom, fenacetinom, fenilbutazonom, takrinom, klomipraminom, inzulinom, izoprenalinom, salbutamolom, prazosinom, propranololom, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
152	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	21 mg	7 transdermalnih flastera / 798 mg	ublažavanje simptoma apstinencije od nikotina	21 mg	odrasli-stariji od 18 godina, djeca od 12-17 godina po savjetu liječnika	6 tjedana	Kontraindikacije: alergija na flaster, nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, povremeni pušači, osobe mlađe od 12 godina, bolesnici koji su nedavno preboljeli srčani ili moždani udar, ili pate od nestabilne i pogoršavajuće angine pektoris, Prinzmetalove angine, snažne srčane aritmije; Oprez: osobe stare 12-17 godina, kod srčanih problema, problema sa cirkulacijom, uključujući srčano zatajenje, stabilnu anginu pektoris i visoki tlak, urtikarija, alergijski ekcem ili dermatitis, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), istovremena primjena s kofeinom, teofilinom, imipraminom, pentazocinom, fenacetinom, fenilbutazonom, takrinom, klomipraminom, inzulinom, izoprenalinom, salbutamolom, prazosinom, propranololom, ne preporuča se trudnicama i dojiljama

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
153	N07BA01	nicotinum	kroz kožu	7 mg	7 transdermalnih flastera / 252 mg	ublažavanje simptoma apstinencije od nikotina	7 mg	odrasli-stariji od 18 godina, djeca od 12 do 17 godina po savjetu liječnika	2 tjedna	Kontraindikacije: alergija na flaster, nikotin ili na neku pomoćnu tvar, nepušači, povremeni pušači, osobe mlađe od 12 godina, bolesnici koji su nedavno preboljeli srčani ili moždani udar ili pate od nestabilne i pogoršavajuće angine pektoris, Prinzmetalove angine, snažne srčane aritmije; Oprez: osobe stare 12-17 godina, kod srčanih problema, problema sa cirkulacijom, uključujući srčano zatajenje, stabilnu anginu pektoris i visoki tlak, urtikarija, alergijski ekcem ili dermatitis, umjerena ili teška bolest jetre, teška bolest bubrega, šećerna bolest, problemi sa štitnjačom, problemi sa srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), istovremena primjena s kofeinom, teofilinom, imipraminom, pentazocinom, fenacetinom, fenilbutazonom, takrinom, klomipraminom, inzulinom, izoprenalinom, salbutamolom, prazosinom, propranololom, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
154	R01AA05	oxymetazolinum	za nos	0,045 mg	10 ml otopine / 5 mg	upala sluznice nosa uzrokovana prehladom (akutni rinitis), peludna hunjavica (alergijski rinitis) i napadaj neinfektivnog vazomotornog rinitisa, za poboljšanje otjecanja sekreta kod upala paranazalnih sinusa te upala slušne cijevi povezano s rinitisom, za smanjenje oticanja sluznice u dijagnostičke svrhe	0,135 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	7 dana	Kontraindikacije: alergija na oksimetazolin ili druge sastojke lijeka, suha upala sluznice nosa (rinitis sicca), djeca mlađa od 6 godina, nakon kirurških zahvata koji se obavljaju kroz nosnu šupljinu; Oprez: teška kardiovaskularna bolest (koronarna bolest srca, hipertenzija), glaukom uskog kuta, povećanje prostate (hipertrofija prostate), poremećaj stvaranja hema (porfirija), šećerna bolest, povećanje aktivnosti štitnjače (hipertireoza), tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitoma), trudnice i dojilje po savjetu liječnika; Interakcije: MAO inhibitori-terapija, lijekovi koji povisuju tlak
155	R01AA05	oxymetazolinum	za nos	0,08 mg	10 ml otopine / 5 mg	nosni dekongestiv kod upale nosne sluznice uzrokovane prehladom (akutni rinitis), peludne hunjavice (alergijski rinitis), upale nosnih šupljina i došupljina (nazalnih i paranazalnih sinusa), upale srednjeg uha (otitis media)	0,24 mg	odrasli i djeca starija od 7 godina	5-7 dana	Kontraindikacije: alergija na oksimetazolin ili druge sastojke lijeka, suha upala sluznice nosa (rinitis sicca), djeca mlađa od 6 godina; Oprez: kardiovaskularna bolest (koronarna bolest srca, hipertenzija, srčano zatajanje i dr.), poremećaje srčanog ritma, glaukom uskog kuta, povećanje prostate (hipertrofija prostate), poremećaj stvaranja hema (porfirija), šećerna bolest, kronična upala nosne sluznice, povećanje aktivnosti štitnjače (hipertireoza), trudnice i dojilje po savjetu liječnika; Interakcije: MAO inhibitori-terapija ili prekid u liječenju kraći od 2 tjedna, atomoksetin

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
156	R01AA05	oxymetazolinum	za nos	0,1 mg	10 ml otopine / 5 mg	nosni dekongestiv kod upale nosne sluznice uzrokovane prehladom (akutni rinitis), peludne hunjavice (alergijski rinitis), upale nosnih šupljina i došupljina (nazalnih i paranasalnih sinusa), upale srednjeg uha (otitis media)	0,3 mg	odrasli i djeca starija od 7 godina	5-7 dana	Kontraindikacije: alergija na oksimetazolin ili druge sastojke lijeka, suha upala sluznice nosa s krastama (atrofični rinitis); Oprez: kardiovaskularna bolest (koronarna bolest srca, hipertenzija, srčano zatajenje i dr.), poremećaje srčanog ritma, glaukom uskog kuta, povećanje prostate (hipertrofija prostate), poremećaj stvaranja hema (porfirija), šećerna bolest, kronična upala nosne sluznice, povećanje aktivnosti štitnjače (hipertireoza), trudnice i dojilje po savjetu liječnika; Interakcije: MAO inhibitori-terapija ili prekid u liječenju kraći od 2 tjedna, atomoksetin
157	R01AA05	oxymetazolinum	za nos	0,04 mg	10 ml otopine / 2,5 mg	nosni dekongestiv kod upale nosne sluznice uzrokovane prehladom (akutni rinitis), peludne hunjavice (alergijski rinitis), upale nosnih šupljina i došupljina (nazalnih i paranasalnih sinusa), upale srednjeg uha (otitis media)	0,12 mg	djeca 2-7 godina starosti	5-7 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 2 godine, alergija na oksimetazolin ili druge sastojke lijeka, suha upala sluznice nosa s krastama (atrofični rinitis); Oprez: kronično srčano zatajenje, povišeni krvni tlak, poremećaje srčanog ritma, glaukom uskog kuta, poremećaj stvaranja hema (porfirija), šećerna bolest, kronična upala nosne sluznice, povećanje aktivnosti štitnjače (hipertireoza); Interakcije: MAO inhibitori-terapija ili prekid u liječenju kraći od 2 tjedna, atomoksetin
158	R01AA05	oxymetazolinum	za nos	0,05 mg	10 ml otopine / 2,5 mg	nosni dekongestiv kod upale nosne sluznice uzrokovane prehladom (akutni rinitis), peludne hunjavice (alergijski rinitis), upale nosnih šupljina i došupljina (nazalnih i paranasalnih sinusa), upale srednjeg uha (otitis media)	0,15 mg	djeca 2-7 godina starosti	5-7 dana	Kontraindikacije: alergija na oksimetazolin ili druge sastojke lijeka, suha upala sluznice nosa s krastama (atrofični rinitis); Oprez: kronično srčano zatajenje, povišeni krvni tlak, poremećaje srčanog ritma, glaukom uskog kuta, poremećaj stvaranja hema (porfirija), šećerna bolest, kronična upala nosne sluznice, povećanje aktivnosti štitnjače (hipertireoza); Interakcije: MAO inhibitori-terapija ili prekid u liječenju kraći od 2 tjedna, atomoksetin
159	R01AA07	xylometazolinum	za nos	4 "ušpricaja"	10 ml otopine / 5 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	12 "ušpricaja"	djeca od 2 do 12 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka, suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca mlađa od 2 godine; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povišiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak- posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili trcikličkih antidepresiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
160	R01AA07	xylometazolinum	za nos	4 "ušpricaja"	10 ml otopine / 10 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	12 "ušpricaja"	odrasli i djeca starija od 12 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka, suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca mlađa od 2 godine; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povisiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak- posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili tricikličkih antidepressiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
161	R01AA07	xylometazolinum	za nos	0,1 mg	10 ml otopine / 5 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	0,3 mg	djeca od 2-12 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka (sadrži benzalkonijev klorid), suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca mlađa od 2 godine; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povisiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak- posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili tricikličkih antidepressiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
162	R01AA07	xylometazolinum	za nos	0,2 mg	10 ml otopine / 10 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	0,6 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka (sadrži benzalkonijev klorid), suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca mlađa od 2 godine; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povisiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak- posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili tricikličkih antidepressiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
163	R01AA07	xylometazolinum	za nos	0,1 mg	10 ml otopine / 5 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod akutne prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	0,3 mg	djeca od 2 do 6 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka (sadrži benzalkonijev klorid), suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca i dojenčad do 2 godine; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povisiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak-posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor srži nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili tricikličkih antidepresiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
164	R01AA07	xylometazolinum	za nos	2 "ušpricaja"	10 ml otopine / 5 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod akutne prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	6 "ušpricaja"	djeca od 2 do 6 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka (sadrži benzalkonijev klorid), suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca i dojenčad do 2 godine; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povisiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak-posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor srži nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili tricikličkih antidepresiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
165	R01AA07	xylometazolinum	za nos	0,2 mg	10 ml otopine / 10 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod akutne prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	0,6 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka (sadrži benzalkonijev klorid), suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca i dojenčad do 6 godina; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povisiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak-posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor srži nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili tricikličkih antidepresiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
166	R01AA07	xylometazolinum	za nos	2 "ušpricaja"	10 ml otopine / 10 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod akutne prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	6 "ušpricaja"	odrasli i djeca starija od 6 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka (sadrži benzalkonijev klorid), suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca i dojenčad do 6 godina; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povisiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak-posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor srži nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili tricikličkih antidepresiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
167	R01AA07	xylometazolinum	za nos	2 "ušpricaja"	10 ml otopine / 5 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod akutne prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	6 "ušpricaja"	djeca od 2-6 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka (sadrži benzalkonijev klorid), suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca i dojenčad do 2 godine; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povisiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak-posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor srži nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili tricikličkih antidepresiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
168	R01AA07	xylometazolinum	za nos	2 "ušpricaja"	10 ml otopine / 10 mg	smanjenje otoka sluznice nosa i ublažavanje simptoma kod akutne prehlade, vazomotorni i alergijski rinitis, olakšanje sekrecije iz nosa kod upale sinusa i kod katara srednjeg uha, povezanog s prehladom	6 "ušpricaja"	odrasli i djeca starija od 6 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na ksilometazolin ili druge sastojke lijeka (sadrži benzalkonijev klorid), suha upala sluznice nosa (rhinitis sicca), trans-sfenoidalna operacija hipofize ili operacija s izloženom durom mater, djeca i dojenčad do 6 godina; Oprez: bolesnici koji se liječe MAO inhibitorima ili lijekovima koji mogu povisiti krvni tlak, povećani intraokularni tlak-posebno kod glaukoma uskog kuta, koronarna bolest srca, povišeni krvni tlak, tumor srži nadbubrežne žlijezde, pojačan rad štitnjače, šećerna bolest, dugotrajna primjena može dovesti do atrofije sluznice nosa, istodobna primjena MAO inhibitora ili tricikličkih antidepresiva može uzrokovati povišenje krvnog tlaka, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
169	R01AA08	naphazolinum	za nos	djeca 5-14 godina: 0,2 mg djeca 3-5 godina: 0,1 mg	10 ml otopine / 5 mg	simptomatsko liječenje svih vrsta upale nosne sluznice, sinusitisa, upale srednjeg uha, zaustavljanje krvarenja iz nosa i priprema za preglede ili kirurške zahvate u nosnoj šupljini (dodatak topikalnim anestheticima)	djeca 5-14 godina: 0,8 mg; djeca 3-5 godina: 0,4 mg	djeca od 3-14 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na nafazolin nitrat ili neku od pomoćnih tvari, glaukom zatvorenog kuta; Oprez: djeca mlađa od 1 godine, stariji bolesnici, povišeni krvni tlak, zatajenje srca, poremećaj srčanog ritma, dijabetes, pojačan rad štitnjače, hipertrofija prostate, utječe na doping testove; Interakcije: antihipertenzivi, antidepresivi

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
170	R01AA08	naphazolinum	za nos	0,4 mg	10 ml otopine / 10 mg	simptomatsko liječenje svih vrsta upale nosne sluznice, sinusitisa, upale srednjeg uha, zaustavljanje krvarenja iz nosa i priprema za preglede ili kirurške zahvate u nosnoj šupljini (dodatak topikalnim anestheticima)	2,4 mg	odrasli i djeca starija od 14 godina	5 dana	Kontraindikacije: alergija na nafazolin nitrat ili neku od pomoćnih tvari, glaukom zatvorenog kuta; Oprez: djeca mlađa od 1 godine, stariji bolesnici, povišeni krvni tlak, zatajenje srca, poremećaj srčanog ritma, dijabetes, pojačan rad štitnjače, hipertrofija prostate, utječe na doping testove; Interakcije: antihipertenzivi, antidepresivi
171	R01AA08	naphazolinum	za nos	0,05 mg	10 ml otopine / 5 mg	simptomatsko liječenje rinitisa i sinusitisa	0,2 mg	djeca od 6-12 godina	3-5 dana	Kontraindikacije: alergija na nafazolin nitrat ili neku od pomoćnih tvari, glaukom zatvorenog kuta, suhi rinitis, djeca mlađa od 6 godina; Oprez: stariji bolesnici, povišeni krvni tlak, bolesti srca, dijabetes, pojačan rad štitnjače, trudnoće i dojlje; Interakcije: MAO inhibitori, tricklčki antidepresivi
172	R01AA08	naphazolinum	za nos	0,3 mg	10 ml otopine / 10 mg	simptomatsko liječenje rinitisa i sinusitisa	1,8 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	3-5 dana	Kontraindikacije: alergija na nafazolin nitrat ili neku od pomoćnih tvari, glaukom zatvorenog kuta, suhi rinitis, djeca mlađa od 6 godina; Oprez: stariji bolesnici, povišeni krvni tlak, bolesti srca, dijabetes, pojačan rad štitnjače, trudnoće i dojlje; Interakcije: MAO inhibitori, tricklčki antidepresivi
173	R02AA06	cetylpyridinium	za usta i ždrijelo	1,2 mg	18 pastila / 21,6 mg	blage infekcije usne šupljine i ždrijela (faringitis, laringitis, početak angine), upala desni i sluznice usne šupljine (stomatitis, gingivitis), simptomi prehlade i gripe (bol, suhoća i grebanje u ždrijelu, promuklost i loš zadah)	9,6 mg	odrasli i djeca starija od 4 godine	3 dana	Oprez: otvorene rane u usnoj šupljini, dijabetičari visoke temperature, ne preporuča se trudnicama i dojiljama, ne uzimati zajedno s mlijekom
174	R02AA06	cetylpyridinium	za usta i ždrijelo	1,2 mg	18 pastila / 21,6 mg	blage infekcije usne šupljine i ždrijela (faringitis, laringitis, početak angine), upala desni i sluznice usne šupljine (stomatitis, gingivitis), simptomi prehlade i gripe (bol, suhoća i grebanje u ždrijelu, promuklost i loš zadah)	9,6 mg	odrasli i djeca starija od 4 godine	3 dana	Oprez: otvorene rane u usnoj šupljini, dijabetičari visoke temperature, ne preporuča se trudnicama i dojiljama, ne uzimati zajedno s mlijekom
175	R02AA06	cetylpyridinium	za usta i ždrijelo	1,2 mg	18 pastila / 21,6 mg	blage infekcije usne šupljine i ždrijela (faringitis, laringitis, početak angine), upala desni i sluznice usne šupljine (stomatitis, gingivitis), simptomi prehlade i gripe (bol, suhoća i grebanje u ždrijelu, promuklost i loš zadah)	9,6 mg	odrasli i djeca starija od 4 godine	3 dana	Oprez: otvorene rane u usnoj šupljini, dijabetičari visoke temperature, ne preporuča se trudnicama i dojiljama, ne uzimati zajedno s mlijekom

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
176	R02AA15	povidonum iodinum	za usta i ždrijelo	∅	100 ml otopine / 1 g	sprječavanje i liječenje infekcija usta i ždrijela: bakterijskih, virusnih i gljivičnih (gingivitis, stomatitis, afte, površinski abscesi ili abscesi herpesa), sprječavanje infekcija prije ili nakon operacije zuba, uklanjanje neugodnog mirisa iz usta	∅	odrasli i djeca starija od 7 godina	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na povidon jodirani ili jodide, hipertiroidizam, dermatitis herpetiformis-Duhring, prije i nakon radioterapije; Oprez: pacijenti s litijском terapijom, pacijenti sa zatajenjem bubrega i jetre, bolestima štitnjače, djeca mlađa od 7 godina- potrebna kontrola rada štitnjače, prekid u liječenju 1-2 tjedna prije tiroidnih ispitivanja, trudnice i dojilje po preporuci liječnika (moguće promjene u funkciji štitnjače novorođenčadi); Interakcije: klorheksidin, srebro-sulfadiazin, lužine, živa, preparati litija
177	R05CA	Extractum Thymi fluidum	kroz usta	odrasli: 1 g; djeca 6-12 god: 0,5 g; djeca 1-5 god: 0,25 g	150 ml / 14,4 g	olakšavanje iskašljavanja	odrasli: 6 g; djeca 6-12 god: 3,5 g; djeca 1-5 god: 1,75 g	odrasli i djeca starija od 1 godine	7 dana	Kontraindikacija: alkoholičari, djeca mlađa od 1 godine, trudnice i dojilje
178	R05CA	Hederae folii extractum siccum (suhi ekstrakt lista bršljana)	kroz usta	65 mg	10 šumećih tableta / 650 mg suhog ekstrakta lista bršljana (5-7,5: 1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 30% (w/w)	ublažavanje tegoba kroničnih inflamatornih bolesti bronha, kod akutne upale respiratornog trakta popraćene kašljem	130 mg	odrasli i djeca starija od 4 godina	7 dana +2-3 dana	Sadrži natrij 151,33/tableti, trudnice i dojilje nakon savjetovanja s liječnikom
179	R05CA	Hederae folii extractum siccum (suhi ekstrakt lista bršljana)	kroz usta	35 mg suhog ekstrakta	21 vrećica / 735 mg suhog ekstrakta lista bršljana (5-7,5:1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 30% (w/w)	ublažavanje tegoba kroničnih inflamatornih bolesti bronha, kod akutne upale respiratornog trakta popraćene kašljem	105 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	7 dana +2-3 dana	Trudnicama i dojiljama se ne preporuča
180	R05CA	Hederae folii extractum siccum (suhi ekstrakt lista bršljana)	kroz usta	24,5 mg suhog ekstrakta	100 ml / 700 mg suhog ekstrakta lista bršljana (5-7,5:1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 30% (w/w)	ublažavanje tegoba kroničnih inflamatornih bolesti bronha, kod akutne upale respiratornog trakta popraćene kašljem	73,5 mg	odrasli i djeca starija od 1 godine	7 dana +2-3 dana	Trudnice i dojilje nakon savjetovanja s liječnikom
181	R05CA	hederae folii extractum spissum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 10 god: 0,04 g; djeca od 4 do 10 god: 0,03 g; djeca od 2 do 4 god: 0,02 g	50 ml / 2 g ekstrakta (kao tekući ekstrakt) iz Hedera helix L., folium (bršljanov list) (2,2-2,9 : 1); ekstrakcijsko otapalo: smjesa etanola 50% V/V i propilenglikola u omjeru 98 : 2 m/m	za liječenje obična prehlade dišnih putova te za ublažavanje simptoma kroničnih upalnih bolesti bronha	odrasli i djeca starija od 10 god: 0,12 g; djeca od 4 do 10 god: 0,09 g; djeca od 2 do 4 god: 0,06 g	odrasli i djeca starija od 2 godine	maksimalno nekoliko dana	Kontraindikacije: dojenčad i djeca mlađa od 2 godine (potencijalna opasnost od laringospazma), ako postoji nedostatak argininosukcionat-sinteze (metabolički poremećaj ciklusa ureje), kod bolesnika koji boluju od bronhalne astme ili drugih bolesti dišnog sustava koje prati izrazita preosjetljivost dišnih putova- udisanje mentola, ulja paprene metvice i eukaliptusovog ulja može prouzročiti ostanak bez daha ili napadaj astme, trudnice i dojilje

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
182	R05CA	hederae folii extractum spissum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 10 god: 0,04 g; djeca od 4 do 10 god: 0,02 g; djeca od 1 do 4 god: 0,02 g; djeca do 1 god: 0,02 g	100 ml / 0,8 g ekstrakta (kao tekući ekstrakt) iz Hedera helix L., folium (bršljanov list) (2,2-2,9 : 1); ekstrakcijsko otapalo: smjesa etanola 50% V/V i propilenglikola u omjeru 98 : 2 m/m	za liječenje obične prehlade dišnih putova te za ublažavanje simptoma kroničnih upalnih bolesti bronha	odrasli i djeca starija od 10 god: 0,12 g; djeca od 4 do 10 god: 0,08 g; djeca od 1 do 4 god: 0,06 g; djeca do 1 god: 0,02 g	sve dobne skupine uključujući i dojenčad	nekoliko dana	Kontraindikacije: ako postoji nedostatak argininosukcinat-sinteze (metabolički poremećaj ciklusa ureje), trudnice i dojilje
183	R05CA	hederae heliis folii extractum sicum	rektalno	80 mg	10 čepića / 800 mg suhog ekstrakta iz Hedera helix L., folium (bršljanov list) (5-7,5 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % (m/m)	ublažavanje tegoba kroničnih inflamatornih bolesti bronha, kod akutne upale respiratornog trakta popraćene kašljem	240 mg	sve dobne skupine uključujući dojenčad	7 dana +2-3 dana	Trudnice i dojilje nakon savjetovanja s liječnikom
184	R05CB	lichenis islandici extractum aquosum fluidum	kroz usta	odrasli: 2 velike žlice; djeca od 7 godina: 2 kavske žlice; djeca do 7 godina: 1 kavska žlica	220 ml sirupa / 11 g	ublažavanje kašlja	odrasli: 8 velikih žlica; djeca od 7 godina: 8 kavskih žlica; djeca do 7 godina: 4 kavske žlice	odrasli i djeca starija od 7 godine	nije navedeno	Kontraindikacije: %; Oprez: trudnice i dojilje po preporuci liječnika; Interakcije: antibiotici (dozu sirupa uzeti 2 sata nakon uzimanja lijeka)
185	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	odrasli i djeca iznad 6 godina: 200 mg; djeca od 2 do 6 godina: 100 mg	20 vrećica / 4000 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	odrasli i djeca iznad 6 godina: 600 mg; djeca od 2 do 6 godina: 400 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 2 godine, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, cefalosporina, penicilina, kolistina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika
186	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	odrasli i djeca iznad 6 godina: 200 mg; djeca od 2 do 6 godina: 100 mg	50 šumećih tableta / 10 000 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	odrasli i djeca iznad 6 godina: 600 mg; djeca od 2 - 6 godina: 400 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 2 godine, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, penicilina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
187	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 14 godina 200 mg; djeca u dobi od 6 do 14 godina 100 mg; djeca u dobi od 2 do 6 godina 100 mg; djeca u dobi od 1 do 2 godine 50 mg	60 g granula / 600 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	odrasli i djeca starija od 14 godina 600 mg; djeca u dobi od 6 do 14 godina 400 mg; djeca u dobi od 2 do 6 godina 300 mg; djeca u dobi od 1 do 2 godine 150 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 2 godine, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin, ne preporučuje se primjena u bolesnika sa zatajenjem jetre ili bubrega; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, penicilina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika; u djece mlađe od 2 godine, acetilcistein se može primjenjivati samo pod nadzorom liječnika
188	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 14 godina 200 mg; djeca u dobi od 6 do 14 godina 100 mg; djeca u dobi od 2 do 6 godina 100 mg; djeca u dobi od 1 do 2 godine 50 mg	60 g granula / 1200 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	odrasli i djeca starija od 14 godina 600 mg; djeca u dobi od 6 do 14 godina 400 mg; djeca u dobi od 2 do 6 godina 300 mg; djeca u dobi od 1 do 2 godine 150 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 2 godine, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin, ne preporučuje se primjena u bolesnika sa zatajenjem jetre ili bubrega; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, penicilina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika; u djece mlađe od 2 godine acetilcistein se može primjenjivati samo pod nadzorom liječnika
189	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 14 godina: 200 mg; djeca od 6 - 14 godina: 200 mg; djeca od 2 - 6 godina: 100 mg; djeca mlađa od 2 godina: 50 mg	150 g granula / 3000 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	odrasli i djeca starija od 14 godina: 600 mg; djeca od 6 - 14 godina: 600 mg; djeca od 2 - 6 godina: 400 mg; djeca mlađa od 2 godina: 150 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 2 godine, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, cefalosporina, penicilina, kolistina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika; u djece mlađe od 2 godine može se primjenjivati samo pod nadzorom liječnika
190	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 14 godina: 200 mg; djeca od 6 - 14 godina: 200 mg; djeca od 2 - 6 godina: 100 mg; djeca mlađa od 2 godina: 50 mg	20 šumećih tableta / 2000 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	odrasli i djeca starija od 14 godina: 600 mg; djeca od 6 - 14 godina: 600 mg; djeca od 2 - 6 godina: 400 mg; djeca mlađa od 2 godina: 150 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 2 godine, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, penicilina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika; u djece mlađe od 2 godine može se primjenjivati samo pod nadzorom liječnika

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
191	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 14 godina: 200 mg; djeca od 6 - 14 godina: 200 mg; djeca od 2 - 6 godina: 100 mg; djeca mlađa od 2 godina: 50 mg	25 šumećih tableta / 2500 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	odrasli i djeca starija od 14 godina: 600 mg; djeca od 6 - 14 godina: 600 mg; djeca od 2 - 6 godina: 400 mg; djeca mlađa od 2 godina: 150 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 2 godine, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, penicilina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika; u djece mlađe od 2 godine može se primjenjivati samo pod nadzorom liječnika
192	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	odrasli i djeca starija od 14 godina: 200 mg; djeca od 6 - 14 godina: 200 mg; djeca od 2 - 6 godina: 100 mg; djeca mlađa od 2 godina: 50 mg	200 ml otopine / 4000 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	odrasli i djeca starija od 14 godina: 600 mg; djeca od 6 - 14 godina: 400 mg; djeca od 2 - 6 godina: 300 mg; djeca mlađa od 2 godina: 150 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	4-5 dana	Kontraindikacije: alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, penicilina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika; u djece mlađe od 2 godine može se primjenjivati samo pod nadzorom liječnika
193	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	300 mg	10 šumećih tableta / 6000 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	600 mg	odrasli i djeca starija od 14 godina	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 14 godina, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, penicilina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika
194	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	300 mg	20 šumećih tableta / 12 000 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	600 mg	odrasli i djeca starija od 14 godina	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 14 godina, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, penicilina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika
195	R05CB01	acetylcysteinum	kroz usta	300 mg	40 šumećih tableta / 24 000 mg	za liječenje akutnih i kroničnih bolesti dišnog sustava s obilnim stvaranjem guste sluzi i otežanim iskašljavanjem	600 mg	odrasli i djeca starija od 14 godina	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 14 godina, alergija na acetilcistein ili druge sastojke lijeka; Nuspojave: Stevens-Johnsonov sindrom, Lyellov sindrom; Oprez: bronhalna astma, akutni ili preboljeni želučani ili crijevni čirevi, bolesnici s razvijenom netolerancijom na histamin; Interakcije: antitusici, antibiotici iz skupine aminoglikozida, penicilina, tetraciklina (terapiju uzeti najmanje 2 sata nakon Fluimukana), trudnice i dojilje po preporuci liječnika

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
196	R05CB02	bromhexinum	kroz usta u dišne puteve	kroz usta 8 mg; u dišne puteve 16 mg	40 ml / 80 mg	sekretolitik (razrjeđuje sluz) i sekretomotorik (pospešuje izlučivanje sluzi iz dišnih organa) u akutnim i kroničnim bolestima bronha i pluća s abnormalnim izlučivanjem i prijenosom sluzi.	kroz usta 24 mg; u dišne puteve 16	sve dobne skupine	14 dana	Kontraindikacije: čir na želucu, starije osobe s manjkom snage za dostatno iskašljavanje
197	R05CB02	bromhexinum	kroz usta	16 mg	200 ml / 160 mg	razrjeđuje sluz i olakšava iskašljavanje	48 mg	odrasli i djeca iznad 1 godine	14 dana	Kontraindikacije: čir na želucu, starije osobe s manjkom snage za dostatno iskašljavanje
198	R05CB02	bromhexinum	kroz usta	16 mg	20 tableta / 160 mg	sekretolitik (razrjeđuje sluz) i sekretomotorik (pospešuje izlučivanje sluzi iz dišnih organa) u akutnim i kroničnim bolestima bronha i pluća s abnormalnim izlučivanjem i prijenosom sluzi	48 mg	odrasli i djeca starija od 5 godina	14 dana	Kontraindikacije: čir na želucu, starije osobe s manjkom snage za dostatno iskašljavanje
199	R05CB02	bromhexinum	kroz usta	8 mg	16 tableta / 128 mg	razrjeđuje sluz i olakšava iskašljavanje	24 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	7 dana	Kontraindikacije: čir na želucu, starije osobe s manjkom snage za dostatno iskašljavanje
200	R05CB02	bromhexinum	kroz usta	16 mg	20 tableta / 320 mg	olakšava iskašljavanje, razrjeđuje gustu sluz kod upale dušnika i bronha, upale pluća, kronične opstruktivne bolesti pluća, bronhiektazije	48 mg	odrasli i djeca starija od 10 godina	6 dana	Oprez kod čira na želucu i dvanaesniku te kod oslabljene funkcije jetre
201	R05CB02	bromhexinum	kroz usta	4 mg	30 ml / 60 mg	olakšava iskašljavanje, razrjeđuje gustu sluz kod upale dušnika i bronha, upale pluća, kronične opstruktivne bolesti pluća, bronhiektazije	12 mg	djeca do 10 godina	6 dana	Oprez kod čira na želucu i dvanaesniku te kod oslabljene funkcije jetre
202	R05CB02	bromhexinum	kroz usta	8 mg	200 ml / 160 mg	olakšava iskašljavanje, razrjeđuje gustu sluz kod upale dušnika i bronha, upale pluća, kronične opstruktivne bolesti pluća, bronhiektazije	24 mg	odrasli i djeca starija od 1 godine	6 dana	Oprez kod čira na želucu i dvanaesniku te kod oslabljene funkcije jetre
203	R05CB02	bromhexinum	kroz usta	16 mg	20 tableta / 160 mg	olakšava iskašljavanje, razrjeđuje gustu sluz kod upale dušnika i bronha, upale pluća, kronične opstruktivne bolesti pluća, bronhiektazije	48 mg	odrasli i djeca starija od 10 godina	6 dana	Oprez kod čira na želucu i dvanaesniku te kod oslabljene funkcije jetre
204	R05CB06	ambroxolum	za grlo i ždrijelo	10 mg	25 ml otopine / 1250 mg	liječenje akutnih i kroničnih bolesti pluća i dišnih puteva u kojima dolazi do poremećaja transporta i/ili eliminacije sluzavog sekreta iz dišnih puteva i dušnika.	120 mg	odrasli i djeca iznad 12 godina	7 - 14 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 12 godina; 1. tromjesec trudnoće; dojlje; maligni cilijarni sindrom; antitusici, problemi s bubrezima i jetrom; ne istovremeno s antitusicima

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
205	R05CB06	ambroxolum	kroz usta	30 mg	20 tableta / 600 mg	razrjeđuje sluz kod bolesti dišnog sustava	120 mg	odrasli i djeca iznad 6 godina	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 12 godina; 1. tromjeseč trudnoće; dojilje; maligni cilijarni sindrom; antitusici, peptički ulkus, problemi sa bubrežima i jetrom; ne istovremeno s antitusicima
206	R05CB06	ambroxolum	kroz usta	30 mg	20 tableta / 600 mg	otapanje sluzi kod akutnih i kroničnih bolesti pluća i bronha	120 mg	odrasli i djeca iznad 6 godina	4-5 dana	djeca mlađa od 6 godina; antitusici; bolesti jetre i bubrega
207	R05CB06	ambroxolum	kroz usta	75 mg	10 kapsula / 750 mg	otapanje sluzi kod akutnih i kroničnih bolesti pluća i bronha	75 mg	odrasli i djeca iznad 12 godina	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 12 godina; trudnice; dojilje; maligni cilijarni sindrom; antitusici, problemi s bubrežima i jetrom; ne istovremeno s antitusicima
208	R05CB06	ambroxolum	kroz usta	30 mg	20 pastila / 300 mg	otapanje sluzi kod akutnih i kroničnih bolesti pluća i bronha	120 mg	odrasli i djeca iznad 6 godina	4-5 dana	Kontraindikacije: djeca mlađa od 12 godina; trudnice; dojilje; maligni cilijarni sindrom; antitusici, problemi s bubrežima i jetrom; ne istovremeno s antitusicima
209	R05CP05	pelargonii sidoidis tinctura	kroz usta	odrasli i djeca starija od 12 godina 30 kapi=1,23 g; djeca 6-12 god 20 kapi=0,82 g; djeca 1-6 god 10 kapi=0,41 g	20 ml / 16,50 g tinkture iz Pelargonium sidoides DC., radix (pelargonijin korijen) (1 : 8-10; ekstrakcijsko otapalo: etanol 15 % V/V)	ublažavanje simptoma bronhitisa (upale bronha)	odrasli i djeca starija od 12 godina 90 kapi=3,69 g; djeca 6-12 god 60 kapi=1,64 g; djeca 1-6 god 30 kapi=0,82 g	odrasli i djeca starija od 6 godina, djeca od 1-6 godina uz nadzor liječnika	5 dana	Kontraindikacije: alergija na bilo koji sastojak lijeka, povećana sklonost krvarenju, tijekom primjene lijekova protiv zgrušavanja krvi, teške bolesti jetre i bubrega jer u takvim slučajevima nema dovoljno podataka o primjeni lijeka, trudnice i dojilje, djeca do 1 godine starosti; Oprez: sadrži alkohol i glicerol; Interakcije: lijekovi protiv zgrušavanja krvi
210	R05DA09	dextromethorphanum	kroz usta	10 mg	150 ml / 150 mg	za kratkotrajno liječenje suhog, neproduktivnog kašlja uzrokovanog prehladom, gripom, febrilnim katarom ili inhalacijom nadražajnih tvari	40 mg	djeca u dobi od 6-12 godina	5 dana	Kontraindikacija: djeca mlađa od 6 godina, istovremeno s MAO inhibitorima, SSRI inhibitorima, depresorima središnjeg živčanog sustava, uz veću količinu alkohola, dugotrajni ili kronični kašalj (bolesnici s emfizemom, astmom, pušači), produktivni kašalj; oprez u djece s alergijskom sklonosti (atopijom) te u sediranih, oslabjelih i bolesnika koji su dugotrajno vezani za krevet i ležeći položaj
211	R05DA09	dextromethorphanum	kroz usta	15 mg	150 ml / 450 mg	za kratkotrajno liječenje suhog, neproduktivnog kašlja uzrokovanog prehladom, gripom, febrilnim katarom ili inhalacijom nadražajnih tvari	60 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	7 dana	Kontraindikacija: djeca mlađa od 6 godina, istovremeno s MAO inhibitorima, SSRI inhibitorima, depresorima središnjeg živčanog sustava, uz veću količinu alkohola, dugotrajni ili kronični kašalj (bolesnici s emfizemom, astmom, pušači), produktivni kašalj; oprez u djece s alergijskom sklonosti (atopijom) te u sediranih, oslabjelih i bolesnika koji su dugotrajno vezani za krevet i ležeći položaj
212	R05DB13	butamiratum	kroz usta	24 mg	200 ml / 160 mg	liječenje nadražajnog i neproduktivnog kašlja te za prevenciju i smirivanje kašlja prije i nakon bronhoskopije i kirurških zahvata	72 mg	sve dobne skupine	3 dana kod djece mlađe od 12 god. 5 dana kod odraslih i djece iznad 12 god.	Kontraindikacije: trudnoća i dojenje

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
213	R06AA02	dimenhydrinatum	kroz usta	50 mg	5 tableta / 250 mg	prevencija i liječenje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice vezane za bolest putovanja te drugog uzorka (osim u slučajevima uzimanja antineoplastičnih lijekova)	400 mg	odrasli i djeca starija od 5 godina	nije navedeno	Kontraindikacije: epilepsija, akutni kožni poremećaj (eksudativni i bulozni), prvo tromjesečje trudnoće, djeca mlađa od 5 godina, istovremena primjena sa lijekovima za liječenje kardiovaskularnih bolesti, depresorima središnjeg živčanog sustava, alkoholom; Oprez: u bolesnika sa suženjem pilorusa, povećanom prostatom, glaukomom uskog kuta, pojačanom aktivnošću štitnjače, poremećajima cirkulacije, povišenim krvnim tlakom i astmom, utječe na psihofizičke sposobnosti upravljanja vozilima i rada na strojevima
214	R06AA02	dimenhydrinatum	kroz usta	50 mg	3 tablete / 150 mg	prevencija i liječenje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice vezane za bolest putovanja te drugog uzorka (osim u slučajevima uzimanja antineoplastičnih lijekova)	400 mg	odrasli i djeca starija od 5 godina	nije navedeno	Kontraindikacije: epilepsija, akutni kožni poremećaj (eksudativni i bulozni), prvo tromjesečje trudnoće, djeca mlađa od 5 godina, istovremena primjena sa lijekovima za liječenje kardiovaskularnih bolesti, depresorima središnjeg živčanog sustava, alkoholom; Oprez: u bolesnika sa suženjem pilorusa, povećanom prostatom, glaukomom uskog kuta, pojačanom aktivnošću štitnjače, poremećajima cirkulacije, povišenim krvnim tlakom i astmom, utječe na psihofizičke sposobnosti upravljanja vozilima i rada na strojevima
215	R06AA02	dimenhydrinatum	kroz usta	50 mg	10 tableta / 500 mg	prevencija i liječenje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice vezane za bolest putovanja te drugog uzorka (osim u slučajevima uzimanja antineoplastičnih lijekova)	400 mg	odrasli i djeca starija od 5 godina	nije navedeno	Kontraindikacije: epilepsija, akutni kožni poremećaj (eksudativni i bulozni), prvo tromjesečje trudnoće, djeca mlađa od 5 godina, istovremena primjena sa lijekovima za liječenje kardiovaskularnih bolesti, depresorima središnjeg živčanog sustava, alkoholom; Oprez: u bolesnika sa suženjem pilorusa, povećanom prostatom, glaukomom uskog kuta, pojačanom aktivnošću štitnjače, poremećajima cirkulacije, povišenim krvnim tlakom i astmom, utječe na psihofizičke sposobnosti upravljanja vozilima i rada na strojevima
216	R06AA02	dimenhydrinatum	kroz usta	50 mg	5 tableta / 250 mg	prevencija i liječenje mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice vezane za bolest putovanja te drugog uzorka (osim u slučajevima uzimanja antineoplastičnih lijekova)	400 mg	odrasli i djeca starija od 5 godina	nije navedeno	Kontraindikacije: epilepsija, akutni kožni poremećaj (eksudativni i bulozni), prvo tromjesečje trudnoće, djeca mlađa od 5 godina, istovremena primjena sa lijekovima za liječenje kardiovaskularnih bolesti, depresorima središnjeg živčanog sustava, alkoholom; Oprez: u bolesnika sa suženjem pilorusa, povećanom prostatom, glaukomom uskog kuta, pojačanom aktivnošću štitnjače, poremećajima cirkulacije, povišenim krvnim tlakom i astmom, utječe na psihofizičke sposobnosti upravljanja vozilima i rada na strojevima

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
217	R06AE07	cetirizinum	kroz usta	10 mg	10 tableta / 100 mg	sezonskog i cjelogodišnjeg alergijskog rinitisa i pridruženog alergijskog konjunktivitisa (npr. iscjedak iz nosa, začepljen nos, kihanje, suzenje, upaljene i crvene oči i sl.) te liječenje znakova kronične urtikarije (koprivnjače) nepoznatog uzroka (npr. svrbež, crvenilo, otekline i sl.)	10 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	po uputstvu liječnika	Kontraindikacija: alergija na cetirizindiklorid ili pomoćne tvari u lijeku, teško oštećenje funkcije bubrega, djeca mlađa od 6 godina; Oprez: važna oralna higijena kod dugotrajnije terapije (povećana opasnost od nastanka karijesa zbog suhoće usta), potrebna prilagodba doze kod bubrežnih ili jetrenih bolesti, alkohol, lijekovi koji koče rad centralnog živčanog sistema, sadrži laktozu
218	R06AE07	cetirizinum	kroz usta	10 mg	10 filmom obloženih tableta / 100 mg	simptomatsko liječenje cjelogodišnjeg rinitisa (hunjavice), sezonskog alergijskog rinitisa (alergijske hunjavice) i kronične koprivnjače (idiopatske urtikarije)	10 mg	odrasli i djeca starija od 6 godina	7-10 dana	Kontraindikacije: alergija na cetirizin ili pomoćne tvari u sastavu; Oprez: konzumacija alkohola, ne preporuča se trudnicama i dojiljama
219	R06AX13	loratadinum	kroz usta	10 mg	7 tableta / 70 mg	alergijski rinitis sezonski (peludna groznica) ili tijekom cijele godine, alergijske reakcije kože	10 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	2 tjedna	Kontraindikacija: alergija na loratadin ili na pomoćne sastojke lijeka; Oprez: bolesnici s poremećenom funkcijom jetre-potrebna prilagodba doze, trudnice i dojilje po savjetu liječnika, ima utjecaj na upravljanje motornim strojevima i vozilima
220	R06AX13	loratadinum	kroz usta	10 mg	10 tableta / 100 mg	alergijski rinitis sezonski (peludna groznica) ili tijekom cijele godine, alergijske reakcije kože	10 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	2 tjedna	Kontraindikacija: alergija na loratadin ili na pomoćne sastojke lijeka; Oprez: bolesnici s poremećenom funkcijom jetre-potrebna prilagodba doze, trudnice i dojilje po savjetu liječnika, ima utjecaj na upravljanje motornim strojevima i vozilima
221	R06AX13	loratadinum	kroz usta	10 mg	14 tableta / 140 mg	alergijski rinitis sezonski (peludna groznica) ili tijekom cijele godine, alergijske reakcije kože	10 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	2 tjedna	Kontraindikacija: alergija na loratadin ili na pomoćne sastojke lijeka; Oprez: bolesnici s poremećenom funkcijom jetre-potrebna prilagodba doze, trudnice i dojilje po savjetu liječnika, ima utjecaj na upravljanje motornim strojevima i vozilima
222	R06AX13	loratadinum	kroz usta	10 mg	10 tableta / 100 mg	ublažavanje simptoma alergijskog rinitisa i urtikarije	10 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	nije navedeno	Kontraindikacija: alergija na loratadin ili na pomoćne sastojke lijeka; Trudnicama i dojiljama se ne preporuča, Oprez: bolesnici s poremećenom funkcijom jetre-potrebna prilagodba doze, trudnice i dojilje po savjetu liječnika, ima utjecaj na upravljanje motornim strojevima i vozilima
223	R06AX13	loratadinum	kroz usta	10 mg	14 raspadljivih tableta / 140 mg	ublažavanje simptoma alergijskog rinitisa (kihanje, začepljen nos, iscjedak iz nosa, otečeno nepce, otečene, crvene ili suzne oči) i znakova pridruženih kroničnoj urtikariji nepoznatog uzroka (oteklina i osip)	10 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	10 dana	Kontraindikacija: alergija na loratadin ili na pomoćne sastojke lijeka; Trudnicama i dojiljama se ne preporuča, Oprez: bolesnici s poremećenom funkcijom jetre-potrebna prilagodba doze, trudnice i dojilje po savjetu liječnika, ima utjecaj na upravljanje motornim strojevima i vozilima

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
224	R06AX13	loratadinum	kroz usta	10 mg	7 raspadljivih tableta za usta / 70 mg	ublažavanje simptoma alergijskog rinitisa (kihanje, začepljen nos, iscjedak iz nosa, otečeno nepce, otečene, crvene ili suzne oči) i znakova pridruženih kroničnoj urtikariji nepoznatog uzroka (oteklina i osip)	10 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	10 dana	Kontraindikacija: alergija na loratadin ili na pomoćne sastojke lijeka; Trudnicama i dojiljama se ne preporuča, Oprez: bolesnici s poremećenom funkcijom jetre-potrebna prilagodba doze, trudnice i dojilje po savjetu liječnika, ima utjecaj na upravljanje motornim strojevima i vozilima
225	R06AX26	fexofenadinum	kroz usta	120 mg	10 tableta / 1200 mg	za ublažavanje simptoma povezanih s peludnom groznicom (sezonski alergijski rinitis) kao što su kihanje, osjećaj svrbeža očiju, crvenilo i suzenje očiju	120 mg	odrasli i djeca starija od 12 godina	5 dana	Oprez: osobe koje imaju problema s jetrom i bubrezima, srčanu bolest, osobe starije dobi; trudnice ako je neophodno, dojiljama se ne preporuča
226	S01GA01	naphazolinum	kapi za oko, otopina	0,05 mg	10 ml / 5 mg	ublažavanje simptoma nadraženosti oka uzrokovanih prašinom, vjetrom, smogom, plivanjem, dugotrajnim gledanjem televizije, prehladom i slično	0,25 mg	odrasli i djeca starija od 7 godina	4 dana	Kontraindikacije: alergija na nafazolin nitrat ili neku od pomoćnih tvari, glaukom zatvorenog kuta; Oprez: trudnice i dojilje, nošenje mekih kontaktnih leća, ozljeda ili infekcija oka, povišeni krvni tlak, bolesti srca, dijabetes, pojačan rad štitnjače, trudnice i dojilje; Interakcije: MAO inhibitori, triciklički antidepressivi
227	S01GA02	tetryzolinum	u oko	0,05 mg	15 ml otopine / 7,5 mg	simptomimetik kod nadražaja i crvenila oka	0,15 mg	odrasli i djeca starija od 2 godine	48 sati	Kontraindikacije: alergija na tetrazolinklorid ili neki drugi sastojak, bolesnici s glaukomom uskog kuta, djeca mlađa od 2 godine, teško oboljenje srca i krvnih žila (koronarna bolest srca, povišen krvni tlak), tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom), pojačan rad štitnjače-hipertireoza, šećerna bolest, inhibitori MAO; Oprez: primjena u djece, kao i primjena većih doza je dozvoljena samo pod medicinskim nadzorom, suha upala nosa (rhinitis sicca), upala rožnice i spojnice oka (keratokonjuktivitis), glaukom, tvrde kontaktne leće staviti 15 min nakon ukapavanja; Interakcije: inhibitori MAO, triciklički antidepressivi; trudnice i dojilje po preporuci liječnika, rijetko ima utjecaj na upravljanje vozilima i strojevima
228	S01GX08	ketotifenum	u oko	0,0125	5 ml / 1,725 mg	liječenje očnih tegoba izazvanih peludnom alergijom, poput crvenila, svrbeža i pojačanog suzenja	0,025 mg	odrasli i djeca starija od 3 godine	nekoliko dana	Trudnice i dojilje po savjetu liječnika, ne nanositi na kontaktne leće te leće ponovo staviti nakon min. 15 min.
229	S01GX08	ketotifenum	u oko	0,0125	8 ml / 2,76 mg	liječenje očnih tegoba izazvanih peludnom alergijom, poput crvenila, svrbeža i pojačanog suzenja	0,025 mg	odrasli i djeca starija od 3 godine	nekoliko dana	Trudnice i dojilje po savjetu liječnika, ne nanositi na kontaktne leće te leće ponovo staviti nakon min. 15 min.
230	S01XA20	hypromellosum	u oko	0,5 mg	15 ml / 75 mg	kod poremećaja suhog oka ili osjećaja iritacije uzrokovane nedostatkom suza u oku, lubrikantno sredstvo kod umjetnih očiju	1,5 mg	nije navedeno	nije navedeno	Oprez: trudnoća i planiranje trudnoće, dojenje, alergija,

RB	ATK	Naziv djelatne tvari (INN, ostalo)	Put primjene	Maksimalna pojedinačna doza	Najveća veličina pakovanja	Indikacije	Najveća dnevna doza	Dob primjene	Trajanje primjene	Napomena
231		Caucalis platycarpos L., herba	kroz usta	5 g	14 vrećica / 70 g Caucalis platycarpos L., herba (podlaničina zelen)	kod čestih infekcija, potporna terapija u bolesnika s oslabljenim imunološkim sustavom	10 g	odrasli; primjena kod djece po savjetu sa liječnikom	7 dana	Kontraindikacija: imunosupresivna terapija; trudnice i dojilje po preporuci liječnika
232		racementolum	za kožu	∅	100 g / 2000 mg	ublažavanje bolova mišića, tetiva i zglobova	∅	odrasli i djeca starija od 5 godina	nije navedeno	Kontraindikacije: alergija na bilo koji sastojak lijeka, djeca mlađa od 5 godina, oštećena ili upaljena koža, trudnice i dojilje po savjetu liječnika; Oprez: ne prekrivati kožu oblozima, flasterima ili zavojima