

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Abirateron Zentiva 500 mg filmom obložene tablete abirateronacetat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Abirateron Zentiva i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Abirateron Zentiva
3. Kako uzimati Abirateron Zentiva
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Abirateron Zentiva
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Abirateron Zentiva i za što se koristi

Abirateron Zentiva sadrži lijek koji se zove abirateronacetat. Koristi se za liječenje karcinoma prostate u odraslih muškaraca koji se proširio u druge dijelove tijela. Abirateron Zentiva zaustavlja stvaranje testosterona u organizmu, što može usporiti rast karcinoma prostate.

Kada se Abirateron Zentiva propisuje u ranom stadiju bolesti pri kojem još odgovara na hormonsko liječenje, koristi se uz liječenje koje snižava testosteron (liječenje deprivacijom androgena).

Kad uzimate ovaj lijek, liječnik će Vam propisati i drugi lijek koji se zove prednizon ili prednizolon kako bi se smanjila vjerojatnost za razvoj visokog krvnog tlaka, nakupljanje vode u tijelu (zadržavanje tekućine) ili sniženje razine kalija u krvi.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Abirateron Zentiva

Nemojte uzimati Abirateron Zentiva:

- ako ste alergični na abirateronacetat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako ste žena, a posebice ako ste trudni. Abirateron Zentiva je namijenjen za primjenu isključivo kod muških bolesnika.
- ako imate teško oštećenje jetre.
- u kombinaciji s Ra-223 (koji se koristi za liječenje raka prostate).

Nemojte uzimati ovaj lijek ako se nešto od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, porazgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek:

- ako imate tegoba s jetrom

- ako Vam je rečeno da imate povišen krvni tlak ili zatajivanje srca ili nisku razinu kalija u krvi (niska razina kalija u krvi, može povisiti rizik od problema sa srčanim ritmom)
- ako ste imali drugih tegoba sa srcem ili krvnim žilama
- ako imate nepravilan ili ubrzan rad srca
- ako Vam nedostaje zraka
- ako Vam se povećala težina u kratkom vremenskom periodu
- ako Vam otiču stopala, gležnjevi ili noge
- ako ste ikada u prošlosti, za liječenje karcinoma prostate, uzeli lijek poznat pod imenom ketokonazol
- o potrebi uzimanja ovog lijeka s prednizonom ili prednizolonom
- o mogućim nuspojavama kostiju
- ako imate povišen šećer u krvi.

Recite svom liječniku ako Vam je rečeno da imate bilo koju bolest srca ili krvnih žila, uključujući probleme sa srčanim ritmom (aritmija), ili ako se liječite lijekovima za ova stanja.

Recite svom liječniku ako imate pojavu žute boje kože ili očiju, tamnog urina, ili teške mučnine ili povraćanja, budući da oni mogu biti znakovi ili simptomi problema s jetrom. Rijetko, može se pojaviti zatajenje funkcije jetre (nazvano akutno zatajenje jetre) koje može dovesti do smrti.

Može se javiti pad broja crvenih krvnih stanica, smanjen spolni nagon (libido), mišićna slabost i/ili bol u mišićima.

Abirateron Zentiva se ne smije primjenjivati u kombinaciji s Ra-223 radi mogućeg porasta rizika od loma kostiju ili smrti.

Ako planirate uzeti Ra-223 nakon liječenja s lijekom Abirateron Zentiva i prednizonom/prednizolonom, morate pričekati 5 dana prije započinjanja liječenja s Ra-223.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, porazgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete ovaj lijek.

Krvne pretrage

Abirateron Zentiva može djelovati na jetru, a da ne izazove nikakve simptome. Dok uzimate ovaj lijek, liječnik će periodično zatražiti da obavite krvne pretrage kako bi se uočili učinci na jetru.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata. Ako dijete ili adolescent slučajno progutaju lijek Abirateron Zentiva, odmah se javite u bolnicu i ponesite ovu uputu o lijeku sa sobom kako bi ju pokazali liječniku u hitnoj službi.

Drugi lijekovi i Abirateron Zentiva

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To je važno jer Abirateron Zentiva može pojačati djelovanje brojnih lijekova uključujući djelovanje lijekova za srce, za smirenje, nekih lijekova za šećernu bolest, biljnih lijekova (npr. gospina trava) te drugih lijekova. Liječnik će možda htjeti promijeniti dozu tih lijekova. Osim toga, neki lijekovi mogu pojačati ili smanjiti djelovanje lijeka Abirateron Zentiva. To može dovesti do nuspojava ili do toga da Abirateron Zentiva ne djeluje kako bi trebao.

Liječenje androgenom deprivacijom može povisiti rizik od razvoja problema sa srčanim ritmom. Recite svom liječniku ako primate lijekove

- koji se koriste za liječenje problema sa srčanim ritmom (npr. kinidin, prokainamid, amiodaron i sotalol);
- za koje je poznato da povisuju rizik od nastanka problema sa srčanim ritmom [npr. metadon (koristi se za ublažavanje boli i kao dio detoksikacije kod ovisnosti o drogi), moksifloksacin (antibiotik), antipsihotici (koriste se za ozbiljna mentalna oboljenja)].

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih iznad.

Abirateron Zentiva s hranom

Ovaj lijek se ne smije uzimati s hranom (pogledajte dio 3, "Kako uzimati ovaj lijek").

Uzimanje lijeka Abirateron Zentiva s hranom može izazvati nuspojave.

Trudnoća i dojenje

Abirateron Zentiva nije namijenjen za primjenu u žena.

Žene koje su trudne ili koje bi mogle biti trudne trebaju nositi rukavice ako moraju dodirnuti ili rukovati lijekom Abirateron Zentiva.

Ovaj lijek može naštetići nerođenom djetetu ako ga uzimaju trudnice.

Ako imate spolni odnos sa ženom koja može zatrudnjiti, koristite kondom i još jednu učinkovitu metodu kontrole začeća.

Ako imate spolni odnos s trudnicom, koristite kondom kako biste zaštitili nerođeno dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će ovaj lijek utjecati na Vašu sposobnost vožnje i korištenja alata i strojeva.

Abirateron Zentiva sadrži laktuzu i natrij

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži 24 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u svakoj dozi od dvije tablete od 500 mg. To odgovara 1 % preporučenog maksimalnog dnevног unosa soli za odraslu osobu.

3. Kako uzimati Abirateron Zentiva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Preporučena doza je 1000 mg (dvije tablete od 500 mg) jednom na dan.

Kako uzimati ovaj lijek

Ovaj lijek uzmite kroz usta.

Nemojte uzimati lijek Abirateron Zentiva s hranom. Uzimanje lijeka Abirateron Zentiva s hranom može rezultirati većom apsorpcijom lijeka u tijelo od potrebne, što bi moglo dovesti do nuspojava.

Uzmite tablete lijeka Abirateron Zentiva u jednoj dozi jedanput na dan na prazan želudac. Abirateron Zentiva se mora uzimati najmanje dva sata nakon jela, a hrana se ne smije jesti barem jedan sat nakon uzimanja lijeka Abirateron Zentiva (pogledajte dio 2: "Abirateron Zentiva s hranom").

Tablete proguštajte cijele s vodom.

Tablete nemojte lomiti.

Abirateron Zentiva se uzima s lijekom koji se zove prednizon ili prednizolon. Prednizon ili prednizolon uzmite točno onako kako Vam je rekao liječnik.

Morate uzimati prednizon ili prednizolon svakog dana dok uzimate lijek Abirateron Zentiva. Količina prednizona ili prednizolona koju uzimate možda će se morati promijeniti ako nastupi neko hitno medicinsko stanje. Liječnik će Vam reći ako budete trebali promijeniti količinu prednizona ili prednizolona koju uzimate. Nemojte prestati uzimati prednizon ili prednizolon osim ako Vam to ne kaže liječnik.

Liječnik Vam može propisati i druge lijekove dok uzimate lijek Abirateron Zentiva te prednizon ili prednizolon.

Ako uzmete više lijeka Abirateron Zentiva nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka nego što ste trebali, odmah porazgovarajte s liječnikom ili otidite u bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Abirateron Zentiva

Ako zaboravite uzeti lijek Abirateron Zentiva ili prednizon ili prednizolon, uzmite uobičajenu dozu sljedećeg dana.

Ako zaboravite uzeti lijek Abirateron Zentiva ili prednizon ili prednizolon dulje od jednog dana, bez odlaganja se javite liječniku.

Ako prestanete uzimati lijek Abirateron Zentiva

Nemojte prestati uzimati lijek Abirateron Zentiva, niti prednizon ili prednizolon ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati lijek Abirateron Zentiva i odmah se javite liječniku ako primijetite neki od sljedećih simptoma:

- slabost u mišićima, trzaje mišića ili lupanje srca (palpitacije). To mogu biti znakovi niske razine kalija u krvi.

Ostale nuspojave uključuju:

Vrlo često (mogu se javiti se u više od 1 na 10 osoba):

- nakupljanje vode u nogama ili stopalima
- niska razina kalija u krvi
- povišene vrijednosti testova jetrene funkcije
- visoki krvni tlak
- infekcije mokraćnih puteva
- proljev

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

- visoke razine masnoća u krvi
- bol u prsnom košu
- nepravilni otkucaji srca (treperenje srčanih pretklijetki), zatajenje srca, ubrzano kucanje srca
- teške infekcije koje se nazivaju sepsa
- prijelomi kostiju
- probavne tegobe
- krv u mokraći
- osip

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

- tegobe s nadbubrežnim žlijezdama (povezane s problemima s razinom soli i vode)
- poremećaj srčanog ritma (aritmija)
- slabost u mišićima i/ili bolovi u mišićima

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

- iritacija pluća (još se naziva alergijski alveolitis)
- zatajenje funkcije jetre (također nazvano akutno zatajenje jetre)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- srčani udar, promjene u EKG-u - elektrokardiogramu (produljenje QT intervala) i
- ozbiljne alergijske reakcije koje uzrokuju poteškoće pri gutanju ili disanju, natečeno lice, usne, jezik ili grlo, ili osip koji svrbi

U muškaraca koji se liječe od karcinoma prostate može doći do gubitka koštane mase. Abirateron Zentiva u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom može povećati gubitak koštane mase.

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Abirateron Zentiva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, HDPE bočici i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Abirateron Zentiva sadrži

- Djelatna tvar je abirateronacetat.
- Svaka filmom obložena tableta sadrži 500 mg abirateronacetata.
- Drugi sastojci su laktosa hidrat, mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, hipromeloza, natrijev laurilsulfat, bezvodni koloidni silicijev dioksid i magnezijev stearat (jezgra tablete); poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), makrogol, talk, crveni željezov oksid (E172) i crni željezov oksid (E172) (ovojnica tablete).

Kako Abirateron Zentiva izgleda i sadržaj pakiranja

Abirateron Zentiva 500 mg su ljubičaste filmom obložene tablete ovalnog oblika, približne dužine 19 mm i širine 11 mm, s utisnutom oznakom "A7TN" na jednoj strani i "500" na drugoj strani.

Svako blister pakiranje sadrži 56, 56x1, 60 ili 60x1 filmom obloženih tableta.

Svako pakiranje s bočicom sadrži jednu bočicu sa 60 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130, Prag 10, 102 37

Češka

Proizvođač

Synthon Hispania, S.L.

c/ Castelló, 1, Sant Boi de Llobregat

08830 Barcelona

Španjolska

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nizozemska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Zentiva d.o.o.

Av. V. Holjevca 40

10000 Zagreb

Hrvatska

+385 1 6641 830

PV-Croatia@zentiva.com

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Nizozemska

Abiraterone Zentiva 500 mg, filmomhulde tabletten

Bugarska:

Абиратерон Зентива 500 mg филмирали таблетки

Mađarska:

Abirateron Zentiva 500 mg filmtabletta

Poljska:

Abirateron Zentiva

Rumunjska:

Abirateronă Zentiva 500 mg comprimate filmate

Hrvatska:

Abirateron Zentiva 500 mg filmom obložene tablete

Island:

Abiraterone Zentiva

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2024.