Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice 1000 mg/200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju
amoksicilin/klavulanska kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego primite lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice
3. Kako primjenjivati lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice i za što se koristi

Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice je antibiotik koji djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Sadrži dva različita lijeka koji se zovu amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada skupini lijekova koje nazivamo penicilini i njihovo djelovanje ponekad može biti zaustavljeno (postanu neaktivni). Drugi djelatna komponenta lijeka (klavulanska kiselina) sprječava da se tako nešto dogodi.

Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice se koristi u odraslih, adolescenata i djece za liječenje sljedećih infekcija:
- teških infekcija uha, nosa i grla
- infekcija dišnih puteva
- infekcija mokraćnih puteva
- infekcija kože i mekog tkiva, uključujući infekcije zuba
- infekcija kostiju i zglobova
- infekcija u trbuhu
- infekcija spolnih organa u žena.

Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice se koristi u odraslih za sprječavanje infekcija nakon većih kirurških zahvata.

2. Što morate znati prije nego primite lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice

Ne smijete primiti lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice
- ako ste alergični (preosjetljivi) na amoksicilin, klavulansku kiselinu ili bilo koji dugi penicilinski antibiotik
- ako ste ikad imali tešku alergijsku reakciju na bilo koji drugi antibiotik. To može uključivati kožni osip ili oticanje lica ili grla.
- ako ste ikad imali problema s jetrom ili žuticu (žutilo kože) tijekom uzimanja antibiotika.

➔ Nemojte uzimati lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas.
Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primite

HALMED
13 - 07 - 2026
ODOBRENO

lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego dobijete lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice ako:
- imate vrućicu s otečenim limfnim čvorovima
- se liječite zbog problema s jetrom ili bubrezima
- ne mokrite redovito.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na vas, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primite lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice.

U određenim slučajevima Vaš liječnik će istražiti koji tip bakterija uzrokuje vašu infekciju. Ovisno o rezultatima može Vam propisati drugu dozu amoksicilina/klavulanske kiseline ili drugi lijek.

Stanja na koja treba obratiti pažnju
Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice može pogoršati neka stanja ili uzrokovati ozbiljne nuspojave. To uključuje alergijske reakcije, konvulzije (napadaje) i upalu debelog crijeva. Kako bi smanjili rizik bilo kakvih problema, obratite pažnju na određene simptome tijekom uzimanja lijeka Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice. Pogledati „*Stanja na koja treba obratiti pažnju*“ **u dijelu 4**.

Pretrage krvi i urina
Ako obavljate neke krvne pretrage (kao što je broj crvenih krvnih stanica ili testovi funkcionalnosti jetre - jetrene probe) ili pretrage urina (npr. na glukozu), obavijestite liječnika ili medicinsku sestru da uzimate lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice. To je zbog toga što Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice može utjecati na rezultate ovih vrsta pretraga.

Drugi lijekovi i Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice
Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate/primjenjujete, nedavno ste uzeli/primijenili ili biste mogli uzeti/primijeniti bilo koje druge lijekove.

Ako uzimate alopurinol (lijek za liječenje gihta) uz lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice, veća je vjerojatnost da ćete imati kožnu alergijsku reakciju.

Probenecid (koristi se za liječenje gihta), istodobna primjena probenecida može smanjiti izlučivanje amoksicilina te se stoga ne preporučuje.

Ako se uz Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice uzimaju lijekovi za sprječavanje zgrušavanja krvi (poput varfarina), možda će biti potrebno provesti dodatne krvne pretrage.

Metotreksat (koristi se za liječenje raka i teške psorijaze), penicilini mogu smanjiti izlučivanje metotreksata, što može pojačati nuspojave.

Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice može utjecati na djelovanje mofetilmikofenolata (lijeka koji se koristi za sprječavanje odbacivanja transplantiranih organa).

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima
Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice može imati nuspojave, a simptomi Vas mogu učiniti nesposobnima za vožnju.
Nemojte voziti ni upravljati strojevima ako se ne osjećate dobro.

Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice sadrži natrij i kalij
Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice sadrži 62,9 mg (2,7 mmol) natrija (glavni sastojak

HALMED
13 - 07 - 2026
ODOBRENO

kuhinjske soli) u svakoj bočici. To odgovara 3,14 % preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.
Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice sadrži 39,3 mg (1,0 mmol) kalija po bočici. O tome treba voditi računa u bolesnika sa smanjenom funkcijom bubrega ili bolesnika na prehrani s ograničenjem unosa kalija. Može uzrokovati bol na mjestu primjene injekcije.

3. Kako primjenjivati lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice

Nikada nećete sami sebi primijeniti ovaj lijek, već će Vam ga dati liječnik ili medicinska sestra kao injekciju ili infuziju.

Preporučene doze su:

Odrasli, adolescenti i djeca teška 40 kg i više

Standardna doza	1000 mg/200 mg svakih 8 sati.
Za sprječavanje infekcija tijekom i nakon operacije u odraslih	1000 mg/200 mg prije operacije kada dobijete anestetik. Doza se može razlikovati ovisno o vrsti operacije koju imate. Liječnik može ponoviti dozu ukoliko operacija traje dulje od jednog sata.

Djeca i adolescenti lakši od 40 kg
Sve doze temelje se na tjelesnoj težini djeteta u kilogramima.

Adolescenti i djeca stara 3 mjeseca i starija:	25 mg/5 mg po kilogramu tjelesne težine svakih 8 sati.
Djeca mlađa od 3 mjeseca ili lakša od 4 kg:	25 mg/5 mg po kilogramu tjelesne težine svakih 12 sati.

Bolesnici s problemima bubrega ili jetre
- Ako imate problema s bubrezima, možete dobiti različitu dozu. Liječnik Vam može promijeniti dozu ili propisati drugi lijek.
- Ako imate problema s jetrom, liječnik će Vas pažljivo pratiti i može zahtijevati češće redovite pretrage jetre.

Kako će Vam primijeniti lijek Amoksicilin/klavulanska kiselinaAntibiotice
- Lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice će Vam se primijeniti kao injekcija u venu ili kao intravenska infuzija.
- Pobrinite se da pijete dovoljno tekućine dok uzimate lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice.
- Obično nećete dobivati lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice dulje od 2 tjedna bez liječničke kontrole terapije.

Ako primite više lijeka Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice nego što je preporučeno
Nije vjerojatno da ćete dobiti preveliku dozu, ali ako mislite da je to slučaj, odmah o tome obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Simptomi mogu biti nadraženi želudac (mučnina, povraćanje ili proljev) ili konvulzije.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

HALMED
13 - 07 - 2026
ODOBRENO

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Pri primjeni ovog lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave.

Stanja na koja treba obratiti pažnju
Alergijske reakcije:
- kožni osip
- upala krvnih žila (vaskulitis) koja može biti vidljiva kao crvene ili purpurne uzdignute točkice na koži, ali mogu zahvatiti i ostale dijelove tijela
- vrućica, bolovi u zglobovima, natečene žlijezde u vratu, pazuhu ili preponama
- oticanje, ponekad lica ili grla (angioedem), koje uzrokuje poteškoće u disanju
- kolaps
- bol u prsnom košu u sklopu alergijskih reakcija, koja može biti simptom srčanog udara izazvanog alergijom (Kounisov sindrom).

Odmah se obratite liječniku ako razvijete bilo koji od ovih simptoma. **Prestanite uzimati lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice.**

Upala debelog crijeva
Upala debelog crijeva uzrok je vodenastog proljeva, uobičajeno praćenog krvlju i sluzi, boli u trbuhu i/ili vrućicom.

Akutna upala gušterače (akutni pankreatitis)
Ako imate jaku i dugotrajnu bol u području trbuha, to bi mogao biti znak akutne upale gušterače.

Sindrom enterokolitisa izazvanog lijekom (engl. *drug-induced enterocolitis syndrome,* **DIES):**
DIES je prijavljen prvenstveno u djece liječene amoksicilinom/klavulanskom kiselinom. Radi se o vrsti alergijske reakcije čiji je glavni simptom ponavljajuće povraćanje (1 – 4 sata nakon primjene lijeka). Dodatni simptomi mogu uključivati bol u trbuhu, letargiju, proljev i nizak krvni tlak.

➔ **Obratite se svom liječniku što je prije moguće** za savjet ako razvijete bilo koji od ovih simptoma.

Česte nuspojave
Mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba
- gljivična infekcija rodnice, usne šupljine ili kožnih nabora (*candida*)
- proljev

Manje česte nuspojave
Mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba
- kožni osip, svrbež
- uzdignuti osip koji svrbi (koprivnjača)
- mučnina, posebice ako uzimate visoke doze
  Ako se ovo odnosi na Vas, uzmite lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice prije obroka.
- povraćanje
- probavne tegobe
- omaglica
- glavobolja.

Manje česte nuspojave koje se mogu pojaviti u krvnim pretragama:
- povišene vrijednosti nekih tvari (enzima) koje proizvodi Vaša jetra.

Rijetke nuspojave
Mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba
- kožni osip koji može imati mjehuriće i izgleda kao male mete (središnja tamna točka okružena svjetlijom površinom i s tamnim prstenom oko ruba – multiformni eritem).

HALMED
13 - 07 - 2026
ODOBRENO

Ako uočite neki od navedenih simptoma, hitno se obratite liječniku.
- oticanje i crvenilo duž vene koja je izrazito osjetljiva na dodir

Rijetke nuspojave koje se mogu pojaviti u krvnim pretragama:
- smanjen broj stanica koje su uključene u zgrušavanje krvi
- smanjen broj bijelih krvnih stanica

Nepoznata učestalost
Učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.
- alergijske reakcije (vidjeti gore)
- upala debelog crijeva (vidjeti gore)
- upala membrana koja okružuju mozak i leđnu moždinu (aseptični meningitis)
- Ozbiljne kožne reakcije:
  - široko rasprostranjeni osip s mjehurićima i ljuštećom kožom, posebice oko usta, nosa, očiju i spolovila (*Stevens-Johnsonov sindrom*), kao i teži oblik koji uzrokuje obilno ljuštenje kože (više od 30 % površine kože – *toksična epidermalna nekroliza*)
  - široko rasprostranjeni crveni kožni osip s malim gnojnim mjehurićima (*bulozni eksfolijativni dermatitis*)
  - crveni, ljuskasti osip s potkožnim izbočinama i mjehurićima (*egzantematozna pustuloza*)
  - simptomi nalik gripi s osipom, vrućicom, natečenim žlijezdama te odstupanjem u rezultatima krvnih pretraga (uključujući povećani broj bijelih krvnih stanica (*eozinofilija*) i jetrenih enzima) (*Reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima* (DRESS))
  - crveni osip koji se obično javlja na obje strane stražnjice, gornjem dijelu unutarnje strane bedara, pod pazuhom i vratu (simetrični intertriginozni i fleksuralni egzantem povezan s lijekovima (SDRIFE)).

➔ **Odmah se obratite liječniku ako razvijete bilo koji od ovih simptoma.**

- upala jetre (hepatitis)
- žutica uzrokovana porastom vrijednosti bilirubina u krvi (tvar koju proizvodi jetra), koji može uzrokovati da vaša koža i bjeloočnice poprime žutu boju
- upala kanalića u bubrezima
- produženo vrijeme zgrušavanje krvi
- konvulzije (u ljudi koji uzimaju visoke doze lijeka Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice ili imaju problema s bubrezima)
- osip praćen mjehurićima koji mogu biti raspoređeni kružno s krastom u sredini ili nanizani jedan do drugoga (linearna IgA bolest)

Nuspojave koje se mogu pojaviti u krvnim pretragama ili pretragama urina:
- ozbiljno smanjenje broja bijelih krvnih stanica
- nizak broj crvenih krvnih stanica (*hemolitička anemija*)
- kristali u mokraći koji mogu dovesti do akutnog oštećenja bubrega.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti i izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Čuvati u originalnom pakiranju.
Za uvjete čuvanja nakon rekonstitucije i razrjeđivanja lijeka vidjeti: „*Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima*”.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dosega djece.

Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti

HALMED
13 - 07 - 2026
ODOBRENO

navedenog na naljepnici na bočici i na kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice se ne smije primijeniti ako primijetite promjenu boje jer to može biti znak razgradnje. Nakon rekonstitucije, može doći do privremene promjene boje u ružičastu. Rekonstituirana otopina obično je bezbojna do žute boje.
Nemojte primjenjivati otopine drugačije boje!

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice sadrži
- Djelatne tvari su: 1000 mg amoksicilina (u obliku amoksicilinnatrija) i 200 mg klavulanske kiseline (u obliku kalijevog klavulanata) po bočici.
- Drugi sastojci: ovaj lijek ne sadrži druge sastojke.

Kako Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice izgleda i sadržaj pakiranja
Puni naziv lijeka je: Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice 1000 mg/200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju
Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice je bijeli do gotovo bijeli sterilni prašak.
1, 10, 25 ili 50 bezbojnih bočica od stakla tipa III, zatvorenih ružičastim ili sivim bromobutilnim gumenim čepom, aluminijskom kapicom i crvenim PP „flip-off” diskom, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
Antibiotice SA
Valea Lupului 1
707410 Iasi
Rumunjska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Medicopharmacia d.o.o.
Ulica Pere Budmanija 5
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 55 84 604

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Hrvatska:	Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice 1000 mg/200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju
Mađarska:	Xivulan 1000 mg/200 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
Češka:	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ARDEZ
Njemačka:	Amoxicillin/Clavulansäure Antibiotice 1000 mg/200 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung
Italija:	Amoxicillina e Acido Clavulanico Antibiotice
Latvija:	Amoxicillin/clavulanic acid Antibiotice 1000 mg/200 mg pulveris injekciju/ infūziju šķīduma pagatavošanai
Litva:	Amoxicillin/Clavulanic acid Antibiotice 1000 mg/200 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui
Poljska:	Amoxicillin + clavulanic acid Antibiotice
Slovačka:	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ARDEZ
Slovenija:	Amoksicilin/klavulanska kislina Antibiotice 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

HALMED
13 - 07 - 2026
ODOBRENO

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Način i mjesto izdavanja lijeka.
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova je uputa zadnji put revidirana u srpnju 2026.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Za dodatne informacije pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka.

Način primjene
Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice se može primijeniti bilo sporom intravenskom injekcijom u trajanju od 3 do 4 minute izravno u venu ili kroz postavljeni venski put odnosno infuzijom u trajanju od 30 do 40 minuta. Lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice nije prikladan za intramuskularnu primjenu.

Inkompatibilnosti
Ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u uputi o lijeku.
Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice se ne smije miješati s krvnim pripravcima, drugim proteinskim tekućinama npr. proteinskim hidrolizatima ni s intravenskim lipidnim emulzijama. Ako se propisuje istodobno s aminoglikozidom, antibiotici se ne smiju miješati u istoj štrcaljki, spremniku za intravensku tekućinu niti infuzijskom setu zbog gubitka djelotvornosti aminoglikozida u tim uvjetima.

Lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice se ne smije miješati s otopinama koje sadrže glukozu, dekstran ili bikarbonat.

Rekonstitucija
Samo za jednokratnu primjenu. Baciti svu neiskorištenu otopinu.
Rekonstitucija/razrjeđivanje mora se provoditi u aseptičnim uvjetima. Otopinu je potrebno vizualno pregledati na postojanje čestica i promjenu boje prije same primjene.
Otopinu se smije primijeniti samo ako je bistra i ako ne sadržava čestice.

Sav neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Priprema otopina za intravensku injekciju
Voda za injekcije (Ph. Eur.) je uobičajeno otapalo. Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice 1000 mg/200 mg otapa se u 20 ml otapala. 20 ml otapala i 1000 mg/200 mg sterilne smjese (što odgovara 1000 mg amoksicilina i 200 mg klavulanske kiseline) daje ukupan volumen od 20,9 ml otopine koncentracije 47,85/9,57 mg/ml.
Tijekom rekonstitucije, može doći do privremene promjene boje u ružičastu. Rekonstituirana otopina obično je bezbojna do žute boje.
Lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice koji se daje kao bolusna injekcija mora se primijeniti unutar 20 minuta nakon rekonstitucije.

Priprema otopina za intravensku infuziju
Lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice treba rekonstituirati na način opisan u dijelu *Priprema otopina za intravensku injekciju*.
Rekonstituiranu otopinu treba se bez odgode dodati u 100 ml infuzijske tekućine pomoću mini vrećice ili „in-line" birete.

Stabilnost rekonstituiranih i razrijeđenih otopina

Rekonstituirana otopina (za intravensku injekciju ili za infuziju, prije razrjeđivanja)
Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost rekonstituiranog lijeka tijekom primjene na 25 °C u

HALMED
13 - 07 - 2026
ODOBRENO

trajanju od 20 minuta. Rekonstituirana otopina (1 bočica s 20 ml vode za injekcije) mora se primijeniti ili dalje razrijediti odmah ili unutar 20 minuta.

Nakon razrjeđivanja:
Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost tijekom primjene prikazana je u tablici u nastavku.

S mikrobiološkog stajališta, osim ako način otvaranja/rekonstitucije/razrjeđivanja ne isključuje rizik od mikrobiološke kontaminacije, rekonstituirana i razrijeđena otopina (1 rekonstituirana bočica u volumenu od najmanje 100 ml otopine za infuziju) treba se primijeniti odmah.
Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja tijekom i prije same primjene odgovornost su korisnika.

Intravenska injekcija	Razdoblje stabilnosti na 25 °C
voda za injekcije (Ph. Eur.)	2 sata
otopina natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9 %)	2 sata
složena otopina natrijevog klorida za injekciju (Ringerova otopina)	2 sata
složena otopina natrijevog laktata za intravensku infuziju (otopina Ringerovog laktat, Hartmannova otopina)	2 sata
0,3 %-tni kalijev klorid i 0,9 %-tni natrijev klorid za intravensku infuziju	2 sata

Otopina za intravensku infuziju	razdoblje stabilnosti na 5 °C
voda za injekcije (Ph. Eur.)	8 sati
natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) za intravensku infuziju	8 sati

Stabilnost otopina Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice ovisi o koncentraciji. U slučaju potrebe za primjenom koncentriranijih otopina, razdoblje stabilnosti treba prilagoditi na odgovarajući način.

Lijek Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice je manje stabilan u infuzijskim otopinama koje sadrže glukozu, dekstran ili bikarbonat. Stoga se rekonstituirana otopina lijeka Amoksicilin/klavulanska kiselina Antibiotice ne smije dodavati takvim infuzijama.

HALMED
13 - 07 - 2026
ODOBRENO