Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Apogo Pen 10 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici
apomorfinklorid

Za primjenu u odraslih

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Apogo Pen i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Apogo Pen
3. Kako primjenjivati Apogo Pen
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Apogo Pen
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Apogo Pen i za što se koristi

Apogo Pen sadrži otopinu apomorfina za injekciju. Injicira se u područje ispod kože (supkutano). Djelatna tvar u lijeku Apogo Pen je apomorfinklorid. Jedan mililitar otopine ima 10 mg apomorfina.

Apomorfinklorid pripada skupini lijekova koji se nazivaju agonistima dopamina. Apogo Pen se koristi u liječenju Parkinsonove bolesti. Apomorfin pomaže kako bi se smanjila količina vremena koju bolesnici koji su prethodno primali lijek levodopu za Parkinsonovu bolest i/ili druge agoniste dopamina, provode u takozvanom „off“ ili nepokretnom stanju. Vaš liječnik ili medicinska sestra pomoći će Vam prepoznati situacije u kojima ćete koristiti ovaj lijek.

Usprkos imenu, apomorfin ne sadrži morfij.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Apogo Pen

Prije nego primijenite Apogo Pen, Vaš liječnik napravit će pretragu EKG (elektrokardiogram) i upitat će Vas koje još ostale lijekove uzimate. Pretraga EKG biti će ponovljena u prvim danima Vašeg liječenja kao i u bilo kojem trenutku liječenja ako liječnik zaključi da je tako potrebno. Vaš liječnik/ca također će Vas upitati o drugim bolestima koje imate, osobito o bolestima srca. Neka od pitanja ili pretraga možda će se ponavljati pri svakoj posjeti liječniku. Ako osjetite simptome koji mogu dolaziti od srca npr., palpitacije (nepravilan rad, „lupanje“ srca), gubitak svijesti ili osjećaj da ste gotovo izgubili svijest, to morate odmah javiti svom liječniku. Također, ako dobijete proljev ili počnete uzimati bilo koji drugi lijek, to morate javiti svom liječniku.

Nemojte primjenjivati Apogo Pen:
- Ako ste mlađi od 18 godina
- Ako imate poteškoća s disanjem
- Ako imate demenciju ili Alzheimerovu bolest
- Ako bolujete od duševne bolesti sa simptomima poput halucinacija, deluzija, nesređenih misli,

HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

ili gubitka veze sa stvarnošću
- Ako imate problema s jetrom
- Ako imate tešku diskineziju (nevoljne pokrete) ili tešku distoniju (nemogućnost pokretanja) usprkos uzimanju levodope
- Ako ste alergični (preosjetljivi) na apomorfin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- Ako Vi ili netko iz Vaše obitelji ima promjene u elektrokardiogramu (EKG) poznate kao „sindrom produljenja QT segmenta.
- Ako uzimate ondanzetron (lijek za liječenje mučnine i povraćanja)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Apogo Pen:
- ako imate problema s bubrezima
- ako imate problema s plućima
- ako imate problema sa srcem
- ako imate sniženi krvni tlak ili osjećate nesvjesticu i omaglicu kada stojite
- ako uzimate bilo koji lijek za liječenje povišenog krvnog tlaka
- ako Vam je mučno ili patite od mučnina
- ako Vaša Parkinsonova bolest uzrokuje određene duševne (psihičke) poremećaje kao što su halucinacije i smetenost
- ako ste starija ili vrlo slaba osoba.

Obratite se svom liječniku ako Vi ili Vaša obitelj/njegovatelj uočite da razvijate nagone ili žudnju za ponašanjem koje je neuobičajeno za Vas ili se ne možete oduprijeti impulsu, nagonu ili iskušenju za obavljanje određenih aktivnosti koje bi mogle naškoditi Vama ili drugima. Ta se ponašanja nazivaju poremećajima kontrole impulsa i mogu uključivati ovisničko kockanje, prekomjerno jedenje ili trošenje, abnormalno visok seksualni nagon ili porast seksualnih misli ili osjećaja. Vaš će liječnik možda morati prilagoditi dozu ili prekinuti liječenje.

U nekih bolesnika dolazi do razvoja simptoma nalik ovisnosti koji dovode do žudnje za velikim dozama lijeka Apogo Pen i drugih lijekova koji se primjenjuju za liječenje Parkinsonove bolesti.

Ako se bilo koja od gore navedenih situacija odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru.

Djeca i adolescenti
Apogo Pen se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata u dobi ispod 18 godina.

Drugi lijekovi i Apogo Pen
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Provjerite s vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što primijenite ovaj lijek:
- Ako koristite lijekove koji utječu na način kako kuca Vaše srce. Ovo uključuje lijekove za probleme srčanog ritma (kao što su kinidin ili amiodaron), za depresiju (uključujući tricikličke antidepresive poput amitriptilina i imipramina) i za bakterijske infekcije („makrolidni“ antibiotici kao što su eritromicin, azitromicin i klaritromicin) i domperidon.
- Ako uzimate ondanzetron (lijek za liječenje mučnine i povraćanja), jer to može dovesti do jakog pada krvnog tlaka i gubitka svijesti.

Ako primjenjujete ovaj lijek s drugim lijekovima, učinak tih lijekova može biti promijenjen. Ovo je osobito važno za:
- Lijekove poput klozapina koji se koriste u liječenju nekih duševnih poremećaja
- Lijekove za snižavanje krvnog tlaka
- Druge lijekove za Parkinsonovu bolest

HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

Vaš liječnik će Vas obavijestiti trebate li prilagoditi dozu apomorfina ili bilo kojeg drugog lijeka.

Ako uzimate levodopu (još jedan lijek za liječenje Parkinsonove bolesti) uz apomorfin, Vaš liječnik Vam mora redovito kontrolirati krv.

Apogo Pen s hranom i pićem
Hrana i piće nemaju utjecaja na način djelovanja ovog lijeka.

Trudnoća i dojenje
Apogo Pen se ne smije uzimati tijekom trudnoće osim ako je izričito neophodno. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije nego primijenite Apogo Pen ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete.

Nije poznato izlučuje li se Apogo Pen u majčino mlijeko. Upitajte svog liječnika za savjet ako dojite ili namjeravate dojiti. Vaš liječnik će Vam objasniti morate li nastaviti/prekinuti dojenje ili nastaviti/prekinuti uzimanje ovog lijeka.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima
Apogo Pen može uzrokovati pospanost i izraženu potrebu za spavanjem. Nemojte voziti ni upotrebljavati alate ili strojeve ako ovaj lijek na Vas tako djeluje.

Apogo Pen sadži natrijev metabisulfit
Apogo Pen sadrži natrijev metabisulfit koji rijetko može uzrokovati tešku alergijsku reakciju sa simptomima kao što su osip ili svrbež kože, otežano disanje, oticanje vjeđa, lica ili usana, oticanje ili crvenilo jezika. Ako se pojave ove nuspojave, odmah se obratite odjelu za hitnu pomoć najbliže bolnice.

Apogo Pen sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po 10 ml, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati Apogo Pen

Prije no što uzmete Apogo Pen, Vaš liječnik će se uvjeriti da podnosite ovaj lijek i antiemetik (lijek protiv povraćanja) koji ćete morati uzimati istodobno.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Domperidon se mora uzeti najmanje 2 dana prije početka liječenja lijekom Apogo Pen kako Vam ne bi bilo zlo.

Nemojte primjenjivati Apogo Pen ako:
- je otopina promijenila boju u zelenu.
- je otopina mutna ili u njoj možete vidjeti čestice.

Gdje injicirati Apogo Pen:
- Injicirajte Apogo Pen u područje ispod kože (supkutano), onako kako su Vam pokazali liječnik ili medicinska sestra.
- Nemojte injicirati Apogo u venu.

Koliko lijeka primijeniti
Količina lijeka Apogo Pen koju morate primijeniti kao i učestalost primjene ovisit će o Vašim osobnim potrebama. Vaš liječnik će raspraviti ovo s Vama i reći Vam koliko lijeka trebate primjenjivati. Količina lijeka koja će za Vas biti najbolja odredit će se za vrijeme Vaše posjete specijalističkoj klinici.

HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

- Uobičajena dnevna doza je između 3 mg i 30 mg
- Možda će Vam biti potrebno i do 100 mg na dan
- Uobičajeno će Vam biti potrebno između 1 i 10 injekcija na dan
- Svaka pojedinačna injekcija ne smije biti veća od 10 mg.

Prije primjene lijeka Apogo Pen proučite sliku u nastavku i svoju brizgalicu kako biste se upoznali sa svojim lijekom.

Upute za primjenu

1) Regulator doze

7) Strelica koja pokazuje odabranu dozu

8) Brojevi koji označavaju dozu po injekciji (1-10 mg)

9) Podjela (u mg) na ulošku koja pokazuje ukupnu količinu apomorfina u brizgalici


4) Membrana

10) Igla*

6) Štitnik igle*

3) Vanjski omotač brizgalice

2) Igla u zatvorenoj jedinici* koja sadrži
10) iglu,
6) štitnik igle,
5) zaštitni konus



* Ovo pakiranje NE sadrži igle za uporabu s Vašom brizgalicom.
Koristite igle za brizgalicu koje nisu dulje od 12,7 mm (½") i nisu tanje od 30G. Igle za brizgalicu koje se preporučuju za uporabu s inzulinskim brizgalicama kompatibilne su s brizgalicom Apogo Pen.

HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

Kako koristiti Apogo Pen


Pažljivo pročitajte ove upute

VAŽNO: Nemojte povlačiti regulator doze s crvenom kapicom (vidjeti 1) prije nego što ste namjestili dozu (vidjeti „Odabir ispravne doze“).

Stavljanje igle

(a) Prije uporabe brizgalice Apogo Pen trebat će Vam nekoliko medicinskih maramica i jedna igla u svom zaštitnom konusu (**vidjeti 2**).

(b) Izvadite brizgalicu iz kutije i uklonite vanjski omotač (**vidjeti 3**).





(c) Obrišite membranu brizgalice (**vidjeti 4**) medicinskom maramicom.



(d) Odlijepite papir s konusa igle (**vidjeti 2**).








(e) Važno je iglu prinijeti brizgalici u ravnoj liniji, kako je prikazano gore. Time će se igla sigurno pričvrstiti. Ako se igla prinese pod kutom, može doći do curenja iz napunjene brizgalice.

(f) Navijte konus (**vidjeti 2**) u smjeru kazaljke na satu na membranu dok se ne učvrsti. Time je igla čvrsto pričvršćena.

(g) Uklonite zaštitni konus (**vidjeti 5**), ali ga nemojte baciti. U ovoj fazi nemojte uklanjati štitnik igle (**vidjeti 6**).




HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

(h) Vratite vanjski omotač brizgalice (**vidjeti 3**).

Odabir ispravne doze

(i) Pritisnite regulator doze s crvenom kapicom (**vidjeti 1**) i, držeći ga pritisnutim, okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok strelica ne pokaže dozu koju Vam je odredio liječnik (**vidjeti 7 i 8**). Prestanite pritiskati regulator s crvenom kapicom. Doza je sada namještena i ne trebate je ponovno namještati za sljedeće injekcije.





Važno: Ako pri okretanju regulatora prijeđete propisanu dozu, jednostavno nastavite pritiskati i okretati u istom smjeru dok strelica ne pokaže dozu koju Vam je odredio liječnik.
Nikada nemojte istodobno povlačiti i okretati regulator doze s crvenom kapicom.

Ako je Vaša doza 1 mg, započnite tako da ispraznite dozu od 1 mg na papirnati rupčić i bacite je. To se naziva „pripremanje“ (punjenje) i važno je jer osigurava da pri prvoj uporabi brizgalice dobijete punu dozu. Zatim namjestite dozu koja Vam je potrebna za injiciranje i injicirajte je na uobičajen način (**vidjeti „Injiciranje“).** Ako je prva potrebna doza veća od 1 mg, ne morate pripremati brizgalicu.

Injiciranje

(j) Nakon što ste namjestili dozu, nježno izvucite regulator doze s crvenom kapicom do kraja. Provjerite crvenu skalu na klipu (**vidjeti 9**) i injicirajte samo ako se crta koja je upravo vidljiva podudara s namjeravanom dozom.






(k) Medicinskom maramicom očistite područje kože na koje planirate injicirati lijek i oko njega.

(l) Uklonite vanjski omotač napunjene brizgalice (**vidjeti 3**).

(m) Uklonite štitnik igle (**vidjeti 6**).




(n) Umetnite iglu (**vidjeti 10**) u kožu kako Vam je pokazao liječnik.


HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

(o) Za injiciranje pritisnite regulator doze s crvenom kapicom (**vidjeti 1**) do kraja, po mogućnosti palcem. Kada je regulator doze s crvenom kapicom potpuno pritisnut, izbrojite do tri prije nego što izvučete iglu.



(p) Vratite zaštitni konus (**vidjeti 5**) na iskorištenu iglu i nježno ga pritisnite na mjesto. Kada je učvršćen, okrenite iglu suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste je odvili. Iglu ostavite u zaštitnom konusu i odložite je na sigurno mjesto, kao što je spremnik za oštri otpad ili prazna staklenka od kave.






Priprema za sljedeću injekciju

(q) Uklonite vanjski omotač napunjene brizgalice i provjerite ima li u ulošku dovoljno apomorfina za sljedeću injekciju. Ako ima, postavite novu iglu na isti način kao i prije.

(r) Ako nije preostalo dovoljno apomorfina za još jednu injekciju, pripremite novu napunjenu brizgalicu.

(s) Na kraju vratite vanjski omotač brizgalice.



Ako primijenite više lijeka Apogo Pen nego što ste trebali
- Obavijestite svog liječnika ili odmah kontaktirajte hitni odjel najbliže bolnice.
- Možete osjetiti usporen rad srca, tešku mučninu, pojačanu pospanost i/ili otežano disanje.

Također možete osjećati nesvjesticu ili omaglicu, osobito kad ustanete, zbog sniženog krvnog tlaka. Ako legnete i podignete noge, to može pomoći da se osjećate bolje.

Ako ste zaboravili uzeti Apogo Pen
Uzmite lijek kada Vam je sljedeći put potreban. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Apogo Pen
Nemojte prestati primjenjivati Apogo Pen bez prethodnog razgovora s Vašim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Ako doživite alergijsku reakciju **prestanite** uzimati Apogo Pen i **odmah** kontaktirajte liječnika ili odjel za hitnu pomoć najbliže bolnice. Znakovi alergijske reakcije mogu uključivati:
- osip
- teškoće pri disanju
- oticanje lica, usana, grla ili jezika

Apogo Pen ponekad može uzrokovati sljedeće:

Vrlo često: može se pojaviti u više od 1 na 10 osoba
- Kvržice pod kožom na mjestu injekcije koje su bolne, izazivaju nelagodu, a mogu biti crvene i svrbiti. Kako biste izbjegli pojavu ovih kvržica, preporučljivo je kod svakog uboda iglom promijeniti mjesto davanja injekcije.
- Halucinacije (stanje u kojem osoba vidi, čuje ili osjeća stvari kojih u naravi nema).

Često: može se pojaviti u do 1 na 10 osoba
- Osjećaj mučnine ili povraćanje, osobito na početku liječenja lijekom Apogo. Ako uzimate domperidon i dalje osjećate mučninu, ili ako ne uzimate domperidon i imate mučnine, obavijestite o tome Vašeg liječnika ili medicinsku sestru čim prije je moguće
- Osjećaj umora ili jake pospanosti
- Smetenost ili halucinacije
- Zijevanje
- Osjećaj omaglice ili ošamućenosti kod ustajanja

Manje često: može se pojaviti u do 1 na 100 osoba
- Pojačani nevoljni pokreti ili pojačano tresenje tijekom „on“ perioda
- Hemolitička anemija, stanje u kojem se crvene krvne stanice nenormalno raspadaju u krvnim žilama ili drugdje u tijelu. Ovo je manje česta nuspojava koja se može pojaviti u bolesnika koji također uzimaju i levodopu.
- Naglo padanje u san
- Osipi
- Otežano disanje
- Ulceracija na mjestu injekcije
- Smanjenje broja crvenih krvnih stanica, što može uzrokovati blijedo žutu boju kože te slabost ili nedostatak zraka
- Smanjenje broja krvnih stanica trombocita, što povećava rizik krvarenja ili pojave masnica

Rijetko: može se pojaviti u do 1 na 1000 osoba
- Alergijska reakcija
- Eozinofilija, nenormalno velika količina bijelih krvnih stanica u krvi ili tkivima

Nije poznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka
- Oticanje nogu, stopala ili prstiju
- Osoba se ne može oduprijeti impulsu, nagonu ili iskušenju za obavljanje određenih aktivnosti koje bi mogle naškoditi Vama ili drugima, a mogu uključivati:
  - Jaki impuls ka prekomjernom kockanju unatoč teškim posljedicama za osobu ili obitelj
  - Promijenjeno ili povećano seksualno zanimanje i ponašanje koje može uzrokovati značajnu zabrinutost kod Vas ili drugih, na primjer pojačani seksualni nagon
  - Nekontrolirano pojačano kupovanje ili trošenje
  - Jedenje velikih količina hrane u kratkom vremenskom periodu ili kompulzivno jedenje (jedenje više hrane no što je normalno i više no što je potrebno kako biste zadovoljili osjećaj gladi).
- Nesvjestica
- Agresija, uznemirenost
- Glavobolja

HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

Obavijestite svog liječnika ako uočite bilo koji od ovih simptoma; Vaš liječnik će s Vama raspraviti načine liječenja ili smanjenja intenziteta simptoma.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. . Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Apogo Pen

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnoj vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Nakon otvaranja i između primjena čuvati u istim uvjetima.

Ne koristiti ovaj lijek ako je otopina promijenila boju u zelenu. Smije se koristiti samo ako je otopina bistra, bezbojna i bez vidljivih čestica.

Kada započnete koristiti novu Apogo Pen brizgalicu, možete je koristiti do 48 sati. Nemojte ponovno koristiti svoju Apogo Pen brizgalicu nakon tog vremena. Upotrijebite novu.

Kako biste sigurno zbrinuli svoje brizgalice, uvijek uklonite iglu prije nego što je odbacite u spremnik za oštri otpad ili drugi odgovarajući spremnik, kao što je prazna staklenka za kavu.

Kada je Vaš spremnik za oštri otpad ili drugi spremnik pun, predajte ga svom liječniku ili ljekarniku radi sigurnog zbrinjavanja. Ako je brizgalica potpuno prazna, možete je zbrinuti u kućni otpad.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Apogo Pen sadrži

- Djelatna tvar je apomorfinklorid. 1 ml Apogo otopine sadrži 10 mg apomorfinklorida. Svaka Apogo Pen brizgalica sadrži 3 ml otopine za injekciju.
- Drugi sastojci su:
  - natrijev metabisulfit (E223)
  - kloridna kiselina (37%)
  - voda za injekcije

Pogledajte „Dio 2: Apogo Pen sadrži natrijev metabisulfit”, u vezi natrijevog metabisulfita.

Kako Apogo Pen izgleda i sadržaj pakiranja

Apogo Pen je jednokratni brizgalica-injektorski sustav za višekratno doziranje s uloškom od prozirnog stakla koji sadrži otopinu apomorfina za injekciju. Otopina je bistra, praktički bezbojna, bez mirisa i bez vidljivih čestica.

HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

Sadržaj pakiranja
Pakiranja sadrže 1, 5 ili 10 brizgalica u oblikovanoj plastičnoj podlozi, unutar vanjske kartonske kutije.

Apogo Pen je dostupan u pakiranjima koja sadrže 1, 5 ili 10 brizgalica te u višestrukim pakiranjima koja se sastoje od 5 kutija, svaka s 5 brizgalica

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Njemačka

Proizvođači
Laboratoire Aguettant
1 Rue Alexander Fleming
Lyon, 69007, Francuska

ili

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
STADA d.o.o.
Hercegovačka 14, 10000 Zagreb
Tel: +385 13764111

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Ujedinjenoj Kraljevini (Sjevernoj Irskoj) pod sljedećim nazivima:

Austrija, Njemačka:	APO-go PEN 10 mg/ml Injektionslösung
Belgija:	APO-GO®-PEN 10 mg/ml oplossing voor injectie
Bugarska:	АПО-го® ПИСАЛКА 10mg/ml Инжекционен разтвор
Cipar:	APO-go Συσκευή τύπου πένας 10 mg/ml Ενέσιμο Διάλυμα
Republika Češka:	BRITAJECT PEN
Danska:	APO-go PEN 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning
Estonija:	APO-go, 10 mg/ml süstelahus pen-süstlis
Finska:	Apogo PEN 10 mg/ml injektioneste, liuos
Grčka:	APO-go Συσκευή τύπου πένας 10 mg/ml Ενέσιμο Διάλυμα
Hrvatska:	Apogo Pen 10 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici
Latvija:	APO-go PEN 10 mg/ml šķīdums injekcijām
Litva:	Britaject 10 mg/ml injekcinis tirpalas
Luksemburg:	APO-go® PEN 10 mg/ml Solution Injectable
Nizozemska:	APO-go PEN, oplossing voor injectie 10mg/ml
Norveška:	Britaject 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Poljska:	APO-go Pen
Portugal:	Apo-go Pen 10 mg/ml Solução injetável
Rumunjska:	APO-go 10 mg/ml soluție injectabilă în pen multidoză
Slovačka:	Apogo PEN 10 mg/ml injekčný roztok
Slovenija:	APO-go 10 mg/ml raztopina za injiciranje v peresniku
Španjolska:	APO-go PEN 10 mg/ml Solución inyectable
Švedska:	APO-go PEN 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning
Irska, Malta, Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska):	APO-go Pen 10 mg/ml Solution for Injection

Način i mjesto izdavanja lijeka

HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2026.

HALMED
15 - 09 - 2026
ODOBRENO