Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Atenolol Pliva 50 mg tablete

atenolol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Atenolol Pliva i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Atenolol Pliva
3. Kako uzimati Atenolol Pliva
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Atenolol Pliva
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Atenolol Pliva i za što se koristi

Atenolol Pliva sadrži djelatnu tvar koja se zove atenolol. Atenolol pripada skupini lijekova koji se zovu beta blokatori. Oni umanjuju učinke simpatičkog sustava (dio živčanog sustava koji automatski regulira određene tjelesne funkcije) na srce i krvne žile.
Atenolol se koristi za liječenje visokoga krvnog tlaka (hipertenzije) i poremećaja srčanog ritma (aritmija) u odraslih.

2. Što morate znati prije nego što počnete uzimati Atenolol Pliva

Nemojte uzimati Atenolol Pliva:
- ako ste alergični na atenolol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- kod šoka uzrokovanog poremećajem rada srca (kardiogeni šok)
- kod zatajenja srca koje nije kontrolirano liječenjem
- kod sindroma bolesnog sinusnog čvora (uključujući sinoatrijski blok)
- kod srčanog bloka drugog ili trećeg stupnja bez ugrađenog elektrostimulatora srca (*pacemaker*)
- ako imate feokromocitom (tumor nadbubrežne žlijezde) koji se ne liječi, a koji može uzrokovati visoki krvni tlak
- ako imate više koncentracije kiseline u krvi nego što je normalno (metaboličku acidozu)
- kod značajno smanjenog broja otkucaja srca (bradikardija) < 45 otkucaja u minuti
- ako imate snižen krvni tlak (hipotenziju)
- ako bolujete od Raynaudovog fenomena i poremećaja perifernih arterija u teškim oblicima (utrnulost i bolovi najčešće na prstima ruku ili nogu zbog spazma malih arterija)
- ako bolujete od teških oblika astme i kronične opstruktivne plućne bolesti uz začepljenost (kongestiju)
- ako bolujete od Prinzmetalove angine (u čistim oblicima i kao monoterapija). Prinzmetalova angina je bol u prsima koja se javlja zbog spazma arterija srčanog mišića.
- ako u povijesti bolesti imate teške alergijske reakcije (anafilaktičke reakcije)
- ako dojite.

H A L M E D
15 - 01 - 2026
O D O B R E N O

Nemojte uzeti Atenolol Pliva ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Atenolol Pliva.
NIKADA NEMOJTE NAGLO PREKIDATI LIJEČENJE BEZ SAVJETOVANJA S LIJEČNIKOM.

Ovaj lijek se ne preporučuje uzimati s diltiazemom, verapamilom (lijekovi za srce), fingolimodom ili ozanimodom (lijekovi koji se koriste za liječenje multiple skleroze) (pogledajte „Drugi lijekovi i Atenolol Pliva").

Obavijestite liječnika u slučaju trudnoće, dojenja, šećerne bolesti, zatajenja bubrega, određenih bolesti arterija (Raynaudov sindrom).
Ako imate šećernu bolest (dijabetes).Ovaj lijek može uzrokovati ubrzanije otkucaje srca kada Vam je razina glukoze u krvi niska. Atenolol također može povećati rizik od teške hipoglikemije kada se primjenjuje s određenom vrstom antidijabetičkih lijekova koji se nazivaju sulfonilureje (npr. glikvidon, gliklazid, glibenklamid, glipizid, glimepirid ili tolbutamid).
Ako trebate ići na operaciju, obavijestite anesteziologa da uzimate ovaj lijek.
Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom prije nego uzmete ovaj lijek.

Djeca i adolescenti
Atenolol Pliva nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Atenolol Pliva
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove bez recepta.

Posebno obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
- Verapamil i diltiazem - lijekovi koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka ili boli u prsima (angina pektoris)
- Fingolimod i ozanimod - lijekovi koji se koriste za liječenje multiple skleroze (pogledajte „Upozorenja i mjere opreza“)
- Inzulin i oralni antidijabetici - lijekovi koji se koriste u liječenju šećerne bolesti, kao što su lijekovi koji se nazivaju sulfonilureje (npr. glikvidon, gliklazid, glibenklamid, glipizid, glimepirid ili tolbutamid).

Atenolol Pliva s hranom i pićem
Nije primjenjivo.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ako zatrudnite tijekom liječenja, odmah obavijestite svog liječnika. Liječnik će odlučiti možete li nastaviti liječenje ovim lijekom.
Ako se ovaj lijek uzima na kraju trudnoće, potrebno je medicinsko praćenje novorođenčeta nekoliko dana, jer se neki učinci ovog lijeka mogu javiti i kod djeteta (smanjena razina glukoze u krvi, smanjenje otkucaja srca, posebno).
Ovaj lijek prelazi u majčino mlijeko i može izazvati učinke kod novorođenčeta, stoga je kontraindiciran tijekom dojenja.
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nije vjerojatno da će uzimanje Atenolola Pliva utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Međutim, kod nekih osoba može se pojaviti vrtoglavica ili umor.

HALMED
15 - 01 - 2026
ODOBRENO

Atenolol Pliva sadrži natrij
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Atenolol Pliva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje varira ovisno o bolesti koju se liječi te se prilagođava pojedinom pacijentu. Liječnik će Vas uputiti koliko tableta trebate svaki dan uzeti te kada ih trebate uzimati.

Uobičajene doze za odrasle

Za liječenje hipertenzije (visokog krvnog tlaka)	100 mg na dan
Za liječenje aritmija (nepravilni otkucaji srca)	50 do 100 mg na dan

Način i put primjene
Kroz usta.
Tablete treba progutati cijele s vodom.
Urez nije namijenjen za lomljenje tablete.

Trajanje liječenja
U većini bolesti liječenje beta-blokatorima traje nekoliko mjeseci ili godina. Liječnik će odrediti trajanje liječenja.

Starije osobe
Ponekad će starijim osobama liječnik propisati nižu dozu lijeka, osobito ako imaju oštećenu bubrežnu funkciju.

Osobe s teškim oštećenjem funkcije bubrega
Liječnik će u slučajevima oštećenja funkcije bubrega prilagoditi dozu atenolola.

Primjena u djece
Atenolol Pliva tablete nisu namijenjene za primjenu u djece.

Ako uzmete više Atenolol Pliva tableta nego što ste trebali
Ako slučajno uzmete previše tableta, smjesta se javite svom liječniku ili otiđite u bolnicu. Sa sobom ponesite pakiranje lijeka kako bi liječnik mogao ustanoviti o kojem se lijeku radi.

Ako ste zaboravili uzeti Atenolol Pliva tablete
Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nikada ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Atenolol Pliva tablete
Nemojte prestati uzimati tablete, a da se prije toga niste posavjetovali s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah se javite liječniku ili u bolnicu ako primijetite sljedeće nuspojave (**moguće ozbiljne alergijske**

HALMED
15 - 01 - 2026
ODOBRENO

reakcije):
- osip, svrbež (posebno ako je zahvaćeno cijelo tijelo)
- oticanje lica, usana, jezika ili grla koje može otežati gutanje ili disanje (angioedem).

Ostale prijavljene nuspojave i njihova učestalost:
Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)
- usporen rad srca (bradikardija)
- hladne ruke ili stopala
- poremećaji probavnog sustava (uključujući proljev, mučninu i povraćanje)
- osjećaj umora

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)
- poremećaj spavanja
- povećane razine jetrenih enzima (transaminaza)

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)
- pojava ljubičastih mrlja na koži (purpura)
- smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija)
- snižena razina šećera u krvi (hipoglikemija)
- promjene raspoloženja
- noćne more
- osjećaj zbunjenosti
- psihoza (poremećaj percepcije stvarnosti) i halucinacije
- vrtoglavica
- glavobolja
- trnci u rukama
- suhoća očiju
- poremećaji vida
- zatajenje srca
- srčani blok (može uzrokovati omaglicu, ubrzane ili usporene otkucaje srca, umor ili malaksalost)
- nagli pad krvnog tlaka prilikom ustajanja iz ležećeg ili sjedećeg položaja (ortostatska hipotenzija) koja može biti povezana sa gubitkom svijesti (sinkopa)
- poteškoće u hodanju koje mogu biti gore kod osobe koja je već šepala
- trnci i ukočenost prstiju popraćeno toplinom i boli (Raynaudov fenomen)
- iznenadno suženje dišnih puteva (bronhospazam) u bolesnika s bronhalnom astmom ili astmatičnim tegobama
- suhoća usta
- žutica (žućkasta boja kože i bjeloočnica)
- opadanje kose
- kožne reakcije s stvaranjem plakova sličnih psorijazi
- kožni osip
- impotencija (nemogućnost postizanja erekcije)

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba)
- povećanje antinuklearnih antitijela (ANA) u krvi. ANA su autoantitijela koja napadaju staničnu jezgru, često povezana s autoimunim bolestima.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)
- sindrom sličan lupusu (bolest u kojoj imunosni sustav proizvodi antitijela koja napadaju uglavnom kožu i zglobove)

HALMED
15 - 01 - 2026
ODOBRENO

- zatvor
- depresija

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Atenolol Pliva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C, zaštićeno od vlage i svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Atenolol Pliva sadrži
- Djelatna tvar je atenolol.
- Jedna tableta Atenolol Pliva 50 mg sadrži 50 mg atenolola.
- Pomoćne tvari su: mikrokristalična celuloza; karbomeri; natrijev laurilsulfat; kalcijev hidrogenfosfat; umrežena karmelozanatrij; koloidni silicijev dioksid; talk; hidrogenirano biljno ulje; magnezijev stearat.

Kako Atenolol Pliva izgleda i sadržaj pakiranja

- Atenolol Pliva 50 mg tablete su bijele do gotovo bijele boje, jednolične ili mramorirane, okrugle s urezom na jednoj strani i oznakom PLIVA na drugoj strani, promjera 8 mm.
- Urez nije namijenjen za lomljenje tablete.

Atenolol Pliva 50 mg tablete dolaze u pakiranju od 30 (3x10) tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2026.

HALMED
15 - 01 - 2026
ODOBRENO